

**Постановление Правительства Кыргызской Республики от 4 ноября 2011 года № 704
Об утверждении Государственного каталога пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к
применению в Кыргызской Республике на 2011-2019 годы**

В соответствии с [Законом](#) Кыргызской Республики «О химизации и защите растений» Правительство Кыргызской Республики **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемый [Государственный каталог](#) пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике на 2011-2019 годы.
2. Министерству сельского хозяйства Кыргызской Республики разработать проект соответствующего Технического регламента до 1 февраля 2014 года и внести на рассмотрение Правительства Кыргызской Республики.
3. Установить, что Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике действует до утверждения Правительством Кыргызской Республики соответствующего Технического регламента.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального [опубликования](#).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

**Первый вице-премьер-министр,
исполняющий обязанности
Премьер-министра**

О. Бабанов

Утвержден
[постановлением](#) Правительства
Кыргызской Республики
от 4 ноября 2011 года № 704

**Государственный каталог
пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике**

Инсектициды и акарициды

Наименование, фирменная регистрация, номер государственной регистрации	Норма расхода препарата (л/га, кг/га, л/т, кг/т)	Культура, обрабатываемый объект	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)	Сроки вы ручн механизир рабо
«Актин», КЭ (18 г/л) «Актин» Компани «Актин» (Инт.) 12/08/08	0,3-0,6	Хлопчатник	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	14 (2)	3 (-)
	0,5	Томаты			3 (3)	
	0,5-1,5	Цветочные культуры (роза, хризантема, гвоздика)				
«Актин», КЭ (18 г/л) «Актин» Ал Эженси «Актин» Инт. «Актин» 17/03/09						
«Актин», КЭ (18 г/л) «Актин» «Достук «Актин» 17/03/09						
«Актин», КЭ (18 г/л) «Актин» Кемикал, «Актин» ЛТД»	0,3-0,4	Хлопчатник	Паутинный клещ, тли, трипсы, хлопковая совка	Опрыскивание растений в период вегетации	14 (2)	

21/12/09							
КЭ (18 г/л) лова А/С» 1/01/09							
СП (10 г/кг) интернэшнл»	0,05-0,07	Хлопчатник	Паутинный клещ	Опрыскивание растений в период вегетации	30 (1)		
	0,7		Тли, трипсы				
	0,07-0,09		Хлопковая совка				
	0,01-0,03	Томаты	Ржавчинный клещ				
	0,2	Огурцы защищенного грунта	Паутинный клещ	Расходы рабочего раствора 1000-3000 л/га	3 (1)		
			Табачный и оранжерейный трипсы	Опрыскивание растений в период вегетации			
0,06-0,07	Цветочные культуры защищенного грунта	Паутинный клещ	Трехкратное опрыскивание в период вегетации с интервалом 9 дней	5 (3)			
интерметрин							
Р, КЭ (100 г/л) «АсТеРо групп» 1/01/09	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	15 (2)	- (4)	
	0,1		Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица		20 (2)		
	0,1-0,15	Ячмень	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки			10 (4)	
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук				
КЭ (100 г/л) «Багрохим» 06/10/10	0,24-0,36	Виноград	Листовертка, листовая филлоксера		30 (2)		
	0,1	Зеленый горошек, горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля		20(1)		
фа, КЭ (100 г/л) Куенсон групп Лтд» 29/07/09	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации	- (1)	- (-)	
	0,3	Шиповник	Долгоносики	Опрыскивание в фазе начала бутонизации			10 (4)
	0,2	Алтей лекарственный	Листоед алтейный	Опрыскивание в период всходов и отрастания культур	30 (1)		
	0,5	Лаванда	Цикадка-пенница	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)		
	0,12	Пустырник пятилопастный (семенные посевы)	Цикадки		- (2)		
	0,2	Пустырник пятилопастный	Цикадки		40 (1)		
	0,1	Лиственные и хвойные породы	Комплекс вредителей	Опрыскивание. Разрешается выпас лакирующего скота через 5 дней, откормочного и молодняка - 3, сбор грибов и ягод - 10, отдых- 4 дня. Сенокошение без ограничений.	- (1)	1 (1)	
	0,2 мл/м ²	Незагруженные складские помещения, оборудования зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход - до 50 мл на 1м ² . Допуск людей и загрузка складов через сутки после обработки	- (-)		- (-)
	0,4 мл/м ²	Территория		Опрыскивание. Расход			

		зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах		- до 200 мл/м. 3г.		
	16 мл/т	Зерно семенное		Опрыскивание. Расход - до 500 мл/т зерна. Запрещается использование зерна на продовольственные фуражные цели. Допуск людей и загрузка складов через сутки после обработки		1 (1)
		Яблоня	Яблонная плодовая жорка, листовёртки	Опрыскивание в период вегетации	50 (2)	10 (4)
		Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации	45 (2)	
		Табак	Тли		14 (1)	
		Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые нестатные, саранчовые стадные (личинки младших возрастов)	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)	
	0,15		Саранчовые стадные (личинки старших возрастов и имаго)			
	0,1	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации	45 (2)	
		Табак	Тли		14 (1)	
		Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые нестатные, саранчовые стадные (личинки младших возрастов)	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)	
	0,1	Свекла сахарная	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации	45 (2)	
		Табак	Тли		14 (1)	
		Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые нестатные, саранчовые стадные (личинки младших возрастов)	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)	
	0,15		Саранчовые стадные (личинки старших возрастов и имаго)			
Э (100 г/л) «Агровит» 24/12/09	0,1-0,15	Пшеница	Клоп, вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	15 (2)	- (4)
	0,1	Ячмень	Блошки, тли, цикадки, трипсы, пяденица		20 (2)	10 (4)
КЭ (100 г/л) «Агрос» для ЛТД» 1/01/09	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук		45 (2)	
	0,15	Свекла сахарная	Подгрызающие совки		20 (2)	
		Огурцы	Белокрылки, тли, совки			
	0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка			
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации	40 (1)	
	0,24-0,36	Виноград	Листовертки, листовая филлоксеры	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	
	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки		20 (2)	- (4)
	0,15	Пастбища. Дикая	Саранчовые	Опрыскивание в	20 (1)	10 (4)

21/12/09 д, КЭ. (100 /л) «Целково охим» 21/12/09 ер, КЭ (100 /л) «ар С.А.,» 11/12/09		растительность, участки, заселенные саранчовыми		период массового отрождения личинок				
	0,2 мл/м ²	Незагруженные складские помещения, оборудования зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м ² . Допуск людей и загрузка складов через сутки после обработки.	- (-)	1 (1)		
	0,4 мл/м ²	Территория зерно- перерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах		Опрыскивание. Расход - до 200 мл/1м ²		- (-)		
	16 мл/т	Зерно семенное		Опрыскивание. Расход - до 500 мл/т зерна. Запрещается использование зерна на продовольственные цели. Допуск людей и загрузка складов через сутки после обработки		1 (1)		
00, КЭ (100 /л) нг Чаочанг Ко., ЛТД» 24/08/09 00, КЭ (100 /л) ян И-Тун Ко., ЛТД» 26/01/11	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	15 (2)	- (4)		
	0,1		Блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица					
	0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук				20 (2)	10 (4)
	0,24-0,36	Виноград	Листовертки, листовая филлоксера				30 (2)	
	0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка	20 (2)				
	0,15-0,2	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации	- (1)	- (-)		
	0,1	Свекла сахарная, кормовая	Свекловичная листовая тля, свек. Минирующая муха	Опрыскивание в период вегетации	45 (2)	10 (4)		
	0,2-0,3	Яблоня	Яблонная плодояорка, листовертка	Опрыскивание в период вегетации	50 (2)			
	0,1-0,2	Пастбища. Участки, заселенные саранчовыми	Саранча азиатская и мароккская, итальянский прус	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)			
МСВК (100 /л) Агро Б.В.» 21/12/09	0,06-0,07	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период вегетации				
	0,06-0,07	Пшеница	Вредная черепашка		15 (2)			
П (100 г/кг) «Достук нэшнл» 08/12/10	0,25	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)			
	0,1-0,15	Пшеница	Клоп вредная черепашка		15 (2)	- (4)		
			Блошки, тли, трипсы, цикадки					
	0,1	Ячмень	Пьявица		20 (2)			
	0,24-0,36	Виноград	Листовертки, листовая филлоксера		30 (2)	10 (4)		
	0,7-0,1	Картофель	Колорадский жук					
	0,2-0,3	Яблоня	Яблонная плодояорка, листовертки		50 (2)			
	0,1	Сахарная свекла	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха		45 (2)			

		Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)	
Фосфин						
ТАБ (560 /кг) «Синевет» 01/01/09	5 г/см ³	Незагруженные зернохранилища	Насекомые - вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха выше 15 ⁰ С. Экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	(-)	(-)
ТАБ (560 /кг) «Алфос» 01/01/09	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов, небольшие партии массой не более 200 т насыпью до 2,5 м и затаренные в мешки под пленкой		Фумигация при температуре зерна выше 15 ⁰ С. Экспозиция 5 суток. Дегазация не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК		
	6 г/м ³	Мука, крупа в складах или под пленкой	Вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 ⁰ С. Экспозиция 5 суток. Дегазация не менее 2 суток. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	- (-)	- (-)
		Зерноперерабатывающие и пищевые предприятия		Фумигация при температуре воздуха выше 15 ⁰ С. Экспозиция 2 суток. Допуск людей и загрузка складов после проветривания при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК		
	5г/см ³	Сухие овощи в складах или под пленкой		Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 ⁰ С. Экспозиция 5 суток. Дегазация не менее 5 суток. Реализация при остатке фосфина в продуктах не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК		

и, ТАБ (570 /кг) Щелково охим» 21/12/09	5 г/м ³	Незагруженные зернохранилища	Вредители запасов (кроме клещей)	Фумигация при температуре воздуха выше 15 ⁰ С. Экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК
	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, силосах, элеваторах массой не более 200 т насыпью до 2,5 м и затаренные в мешки под пленкой.	Вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха выше 15 ⁰ С. Экспозиция 5 суток. Девазация не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК.
	5 г/м ³	Мука, крупа в складах или под пленкой		Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 ⁰ С. Экспозиция 5 суток. Девазация не менее 2 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК.
		Сухие овощи в складах или под пленкой		Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 ⁰ С. Экспозиция 5 суток. Девазация не менее 5 суток. Реализация при остатке фосфина в продукте не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК.
н, ТАБ (560 /кг) я Дегеш енбах» 01/01/09	5г/м ³	Незагруженные зернохранилища	Насекомые вредители запасов	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 ⁰ С. Экспозиция 5 суток. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК
	9г/м ³	Зерно		Фумигация при

		продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов, небольшие партии массой не более 200 т насыпью до 2,5 м и затаренные в мешки под пленкой		температуре зерна выше 15 ⁰ С. Экспозиция 5 суток. Дегазация не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК		
прид						
с, СП (200 /кг) квим Ко., ГД» 01/01/09	0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	1 (-)
	0,15		Тли, трипсы, белокрылка			
	0,05-0,75	Зерновые	Пьявица, клоп вредная черепашка		28 (1)	- (-)
	0,15-0,175		Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	- (1)	
	0,02-0,025	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	14 (1)	3 (3)
И (200 г/кг) ай МИО Ко., ЛТД» 18/11/08	0,04-0,45	Пастбища участка заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок		
	0,025-0,03	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации		
	0,075	Зерновые	Клоп вредная черепашка		28 (1)	- (-)
	0,175		Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	- (1)	
	0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	1 (-)
м, РП (200 /кг) м Компани итед» 12/08/08	0,15		Тля, трипсы			
	0,15-0,2	Томаты, огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка		1 (1)	- (-)
	0,15	Хлопчатник	Тли, трипсы, белокрылка		30 (2)	1 (-)
	0,3		Хлопковая совка			
	0,25-0,3	Огурцы защищенного грунта	Белокрылка, тли		1 (1)	- (-)
н, СП (200 /кг) Кемикалс ГД» 1/01/09	0,02-0,025	Картофель	Колорадский жук		14 (1)	3 (3)
	0,15-0,2	Свекла сахарная	Обыкновенный свекловичный долгоносик, блошки	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)	1 (-)
	0,04-0,045	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание заселенных площадей	14 (1)	3 (3)
	0,15	Щелковица	Тутовая огневка	Опрыскивание в период вегетации	- (2)	
лан, РП (0 г/кг) он Сода Лтд» 9/09/09	0,15-0,2	Томаты и огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации. Расход 1000-3000 л/га	1 (1)	- (-)
	0,05-0,075	Зерновые	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации.	28 (1)	
	0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка		30 (2)	
	0,15		Тли			
			Трипсы, хлопковая белокрылка			
	0,04 0,045	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание заселенных площадей	14 (1)	3 (3)
П (200 г/кг)	0,025-0,03	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации.		
	0,15	Хлопчатник	Хлопковая тля,	Опрыскивание	30 (2)	- (-)

«Достук нэшнл» 08/12/10			трипсы, белокрылка	растений в период вегетации		
	0,3		Хлопковая совка			
	0,25-0,3	Огурцы открытого и защищенного грунта	Белокрылка, тля		1 (1)	
	0,02-0,025	Картофель	Колорадского жука	Опрыскивание во время вегетации	14 (1)	3 (3)
	0,1-0,125		Картофельная коровка			
	0,15-0,2	Сахарная свекла	Долгоносики, блошки		30 (1)	1 (-)
	0,5-0,075	Пшеница	Клоп вредная черепашка		28 (1)	- (-)
	0,15-0,175		Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	- (1)	
	0,04-0,045	Пастбища	Саранчовые	Опрыскивание заселенных площадей	14 (1)	3 (3)
	0,15	Шелковица	Тутовая огневка	Опрыскивание во время вегетации в ранней стадии заселения вредителем	- (2)	
ан, СП (200 /кг) и Ко, ЛТД» 26/12/07	0,5-0,75	Зерновые	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	28 (1)	- (-)
		Томаты	Белокрылка, тли, трипсы,		1 (1)	
		Картофель	Колорадский жук		14 (1)	3 (3)
П (750 г/кг) веста рейшн» 1/01/09 СП (800 /кг) ранба стриас итед» 17/03/09	0,75	Табак	Тли, трипсы	Норма расхода при опрыскивании - от 0,25 до 1 кг/га (обработка по мере необходимости); прикорневое (почвенное) внесение - внесение вместе с поливной водой после посадки культуры - 0,5-1 кг/га; обработка семян - 0,1- 0,2 кг/га	30 (2)	14 (1)
	1	Капуста	Листогрызущие гусеницы			
	0,7	Хлопчатник	Тли, трипсы			
	0,75	Яблоня	Яблонная плодоярка, листовертки			
	0,5-0,75	Горох	Гороховая тля			
П (500 г/кг) мо Кемикал ЛТд» 1/01/09	0,2-0,3	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	7 (3)
	0,7	Хмель	Люцерновый долгоносик	Опрыскивание всходов	- (1)	
	1	Рапс (семенные посевы)	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации	- (2)	- (3)
	0,3-0,5	Томаты, баклажаны	Колорадский жук		40 (2)	7 (3)
перметрин						
с, КЭ (50 /л) еми Кфт» 1/01/09 ВС (100 /л) н И-Тун кал Ко., гд.» 5/01/2011	0,2-0,3	Пшеница озимая и яровая	Клоп вредная черепашка, блошки, тли, цикадки, трипсы, пьявица	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	- (4)
	0,15-0,2	Картофель	Колорадский жук		20 (2)	10 (1)
	0,3-0,5 (при большой численности вредителя)	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	21 (1)	
	0,6	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли		20 (2)	
	0,3-0,4	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, тли	Опрыскивание в фазе бутонизации	40 (1)	
	0,48-0,72	Виноградная лоза	Листовертки, листовая филлоксера	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	
	0,2-0,3	Капуста, рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, совки, моли, белянки		20 (2)	
	0,2	Ячмень	Пьявица		25 (1)	- (4)

	0,24-0,48	Смородина	Комплекс листогрызущих и сосущих вредителей		20 (2)	10 (4)
		Крыжовник	Пилильщики, тли			
	0,32-0,48	Слива, черешня, вишня	Комплекс вредных насекомых	Опрыскивание до цветения и после цветения. Расход - от 2 до 5 л на 1 дерево (в зависимости от возраста и сорта дерева).		

лутрин

к, КЭ (25 /л) р Кроп нс АГ» /01/2009	0,25	Ячмень яровой	Хлебная пядица	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)	7 (3)
	0,2	Пшеница	Клоп вредная черепашка		30 (1)	
	0,4	Хлопчатник	Трипсы, тли			
	0,8		Хлопковая совка			
	1		Белокрылка			
	0,25	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	15 (1)	
	0,1-0,15	Пастбища, участки заселенные саранчовыми, дикая растительность,	Азиатская саранча			
	0,2-0,25		Итальянский прус, нестадные саранчовые			
	0,3-0,35		Мароккская саранча			
	0,3	Капуста	Капустная белянка, капустная моль, капустная совка		20 (1)	
	0,6		Капустная тля			
	0,3-0,5	Яблоня	Яблонная плодожорка, тли, листовертки	20 (2)		

ин

Атал, КЭ 0 г/л) «АсТеРо упп» 01/01/09	0,3	Озимая пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	- (1)	- (4)	
	0,1	Пшеница	Клоп, вредная черепашка, блошки, пьявица, тли, цикадки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)		
	0,24-0,36	Виноград	Гроздевая листовертка, клещи		30 (2)	10 (4)	
	0,4-0,6	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки, клещи, щитовки		3 (2)		
	0,6	Хлопчатник	Паутинный клещ, хлопковая совка				- (2)
	0,3-0,6	Шиповник (саженцы)	Клещи		Опрыскивание в период вегетации 0,06%-ным рабочим раствором	3 (1)	
	1,2-2,4	Томаты, огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации 0,03%-ным рабочим раствором			
	0,6-1,2		Паутинный клещ				Опрыскивание в период вегетации 0,02%-ным рабочим раствором
	0,4-0,8		Тли				
	0,07-0,1	Сахарная свекла	Луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)	10 (4)	
0,1	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)			

	2,5-10 мл/м²	Древесина хвойных и лиственных пород	Стволовые и технические вредители	Опрыскивание заготавливаемой древесины в штабелях. Доза на 1 м² поверхности дерева	- (-)	(-)	
	1,2-1,5	Розы защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,05-0,06%-ным рабочим раствором	3 (2)	3 (-)	
	1,5		Тли	Опрыскивание в период вегетации 0,05%-ным рабочим раствором			
, КЭ (100 г/л) «Европа В» 1/01/09 р, КЭ (100 г/л) Куенсон и групп» 22/08/07 р, КЭ (100 г/л) «Ян И-Тун Ко., Лтд.» 5/01/2011 КЭ (100 г/л) «Вуд Лтд.» 1/03/2011*	0,1	Пшеница	Клоп, вредная черепашка, пядица, блошка, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)	- (4)	
	0,3	Озимая пшеница	Хлебная жужелица,	Опрыскивание всходов	- (1)		
	0,24-0,36	Виноград	Гроздевая листовёртка, клещи	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	10 (4)	
	0,4-0,6	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовёртки, клещи, щитовки				
	1,2-2,4	Томаты, огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация рабочего раствора - 0,06 %. Расход рабочей жидкости - 2000-4000 л/га	3 (1)	3 (-)	
	0,6-1,2		Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация рабочего раствора - 0,03 %. Расход рабочей жидкости - 2000-4000 л/га			
	0,4-0,8		Тли	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация рабочего раствора - 0,02%. Расход рабочей жидкости -2000-4000 л/га	3 (2)		
	1,2-1,5	Розы защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,05-0,06 %-ным рабочим раствором			
	1,5		Тли	Опрыскивание в период вегетации 0,05 %-ным рабочим раствором			
	0,6	Хлопчатник	Хлопковая совка, клещи	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	10 (4)	
	0,3		Тли				
	р, КЭ (100 г/л) «Квим Ко., Лтд.» 1/01/09	0,3-0,6	Хлопчатник	Паутинный клещ, тли, трипсы, совки, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	
0,4-0,6		Яблоня	Яблонная плодожорка, щитовки, клещи, листовёртки				
0,4-0,6		Овощи	Колорадский жук, тли, долгоносики,				

			белокрылки, клещи			
	0,6-1,2	Томаты и огурцы защищенного грунта	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации. Концентрация рабочего раствора - 0,03%. Расход рабочей жидкости - 2000-4000 л/га	3 (1)	3 (-)
	0,1	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)	10 (4)
, СП (100 /кг) остук нэшнл» 08/12/10	0,4-0,6	Яблоня	Яблонные плодоярки, листовёртки, клещи, щитовки	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	
	0,24-0,36	Виноград	Гроздевая листовёртка, клещи			
	0,1	Пшеница	Клоп, вредная черепашка, блошки, пядица, тли, цикадки, трипсы		20 (1)	
	1,2-2,4	Томаты, огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации 0,06 %-ным рабочим раствором	3 (1)	3 (-)
	0,6-1,2		Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации 0,03 %-ным рабочим раствором		
	0,4-08		Тли	Опрыскивание в период вегетации 0,02 %-ным рабочим раствором		
	0,6	Томаты открытого грунта	Белокрылка	Опрыскивание период в вегетации	30 (2)	
	0,4		Ржавчинный клещ			
	0,1	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	30 (1)	10 (4)
	0,3-0,6	Хлопчатник	Белокрылка, хлопковая совка, клещи, карадина	Опрыскивание период в вегетации	30 (2)	
	0,3		Тли			
	0,3-0,45		Хлопковые трипсы			
	0,5	Щелковица	Тутовая огневка	Опрыскивание период в вегетации, в ранней стадии заселения вредителем	- (2)	
пилат						
КЭ (500 г/л) гента» 01/01/09	1,0-1,2	Хлопчатник	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	45 (1)	7 (3)
	1,5-2	Малина (питомники)			1 (2)	
	1,2-1,8	Виноград			45 (1)	
	1,5-3	Яблоня				
	0,9	Смородина				
зокс						
ри, СП (100 /кг) «Достук нэшнл» 08/12/10	0,1	Хлопчатник	Клещи	Опрыскивание растений в период вегетации	20 (2)	7 (3)
	0,3-0,6	Яблоня			30 (1)	
	0,24-0,36	Виноград				
	1,2-1,8	Цитрусовые			60 (1)	
	0,18-0,36	Смородина черная			- (1)	

н, СП (100 /кг) нг Чаочанг Ко., ЛТД» 24/08/09	0,1	(маточники) Хлопчатник			20 (2)	
	0,3-0,6	Яблоня			30 (1)	
	0,24-0,36	Виноград			60 (1)	
	0,18-0,36	Ягоды (маточники)			- (1)	
	0,3-0,6	Яблоня			30 (2)	
	0,24-0,36	Виноград			30 (1)	
	0,18-0,36	Ягодные культуры (маточники)			- (1)	
Стрин						
ал, КЭ (25 /л) ай МИО Ко., ЛТД» 18/11/08	0,25	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	- (3)
	0,2		Шведская муха		20 (1)	
	0,3		Зерновая совка		20 (2)	
КЭ (25 г/л) Кемикалс ЛТД». 01/01/09	0,5-0,7	Кукуруза (на зерно)	Хлопковая совка, кукурузный мотылек		20 (1)	7 (3)
	0,25	Ячмень яровой и озимый	Пьявица,		20 (2)	
	0,2		Шведская муха, хлебные блошка		20 (2)	
	0,25	Подсолнечник	Луговой мотылек		30 (2)	- (3)
	0,1-0,2	Картофель	Колорадский жук, картофельная моль		30 (1)	
	0,25-0,5	Свекла сахарная	Луговой мотылек		20 (2)	
	0,2	Горох	Гороховые тля		15(1)	7 (3)
	0,3	Рапс	Рапсовый цветоед, клопы, белянки, блошки, тли		30(2)	
	0,25-0,5	Томаты	Подгрызающие совки		20 (2)	
	0,15		Колорадский жук		20 (1)	- (-)
	0,3	Капуста	Белянки, капустная совка, капустная моль, тли, блошки		30 (1)	
	0,4-0,5	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые		20 (2)	
	0,5-0,1	Яблоня, груша	Плодожорки, тли, листовертки, грушевая медяница	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)	10 (3)
	0,4-0,6	Виноград	Листовертки		30(2)	
	0,3	Морковь	Морковная муха, листоблошка		30 (1)	
	0,5	Табак	Тли	Опрыскивание в весенний период	20 (2)	- (-)
		Люцерна	Клопы, тли, долгоносики, толстоножки		- (1)	
	1	Люцерна фуражная	Фитономус		20 (2)	
	0,25-0,5	Арбуз, дыня	Подгрызающие совки	Опрыскивание в период вегетации	- (1)	- (-)
	0,7	Хлопчатник	Хлопковая совка, белокрылка, подгрызающие совки		20 (2)	
	0,04-0,08	Лиственные и хвойные породы	Комплекс вредителей (личинки младших возрастов)	Опрыскивание авиацией. Разрешается выпас лактирующего скота через 5 дней, откормочного и	- (1)	- (-)

				молодняка - 3, отдых - 5 дней. Сенокошение без ограничений.		
	2 мл/м ²	Хвойные породы	Стволовые вредители	Инъекция под кору. Доза 1 м ² поверхности коры		
	0,2 мл/м ²	Незагруженные складские помещения, оборудование зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м ² . Допуск людей и загрузка складов через 2 суток после обработки.	- (-)	2 (2)
экстра, КЭ (5 г/л) «Агроп Сайенс 6Х» 13/01/05	0,05	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пядица, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	- (3)
	0,04		Злаковые мухи		20 (1)	
	0,05	Ячмень яровой	Хлебная пядица			
	0,06-0,1	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок		7 (3)
	0,03-0,06	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	
	0,05-0,1	Сахарная свекла	Луговой мотылек			
	0,05-0,08	Томаты	Подгрызающие совки		30 (1)	
	0,06	Капуста	Капустная белянка, капустная совка, капустная моль, тли		20 (2)	
	0,04-0,06	Яблоня	Плодожорки, листовертки, тли		30 (2)	
	0,12	Груша	Грушевая медяница			
	0,08-0,12	Виноград	Листовертки			
	0,06	Морковь	Морковная муха, листоблошка		20 (1)	
	0,1	Табак	Тли		15 (1)	10 (3)
		Люцерна	Клопы, тли, долгоносики, толстоножки		30 (2)	7 (3)
	0,05-0,1	Арбуз, дыня	Подгрызающие совки	Опрыскивание в весенний период	- (1)	
	0,008-0,016	Лиственные и хвойные породы	Комплекс вредителей (личинки младших возрастов)	Опрыскивание авиацией. Разрешается выпас лактирующего скота через 5 дней, откормочного и молодняка - 3, отдых - 5 дней. Сенокошение без ограничений.		
	0,04 мл/м ²	Незагруженные складские помещения, оборудование зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м ² . Допуск людей и загрузка складов через 2 суток после обработки.		2 (2)
карицидный ошок «Этрина 0,07 (0,7 г/кг) «Паритет» 16/08/11	1-3 г/1м ² , при обработке открытых станций 3-5 г	Производственные помещения, животноводческие помещения, норы грызунов и др. биотипы	Клещи, клопы, блохи, муравьи, комары, тараканы	Обработку проводят специалисты с использованием ручных или оснащенных мотором дустеров или специально сконструированного для проведения дустации автотранспорта.	- (-)	- (-)

трипс + триазофос

, КЭ (10 + 0 г/л) ай МИО Ко., ЛТД» 18/11/08	1,25	Хлопчатник	Паутиной клещ	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	7 (3)
	1		Тли, трипсы			
	1,5		Хлопковая совка, карадрина			
	0,6-0,8	Щелковица	Тутовая огневка	Опрыскивание в период вегетации. В ранней стадии заселения вредителем		

КЭ (600 г/л) «Им Кемикал с Лтд» 1/01/09 н, КЭ (600 г/л) «Кояку Ко, ТД» 9/09/09	1	Капуста	Белянки, совки, моли	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)	10 (4)
	1,5-1,8	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	- (1)	- (4)
	1,5	Ячмень	Шведская муха	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)	
	0,5		Тли		20 (2)	10 (4)
	1,8-2	Сахарная свекла	Обыкновенный свекловичный долгоносик, щитоноска, мертвоеды			
	0,8		Блошки, листовая тля			
	2	Хмель	Тли		Опрыскивание в период массового отрождения личинок	- (2)
	0,4-0,5	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые			
	2-3	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, совки, огневки, луговой мотылек, толстоножки, тли			
	0,83	Дуб	Зеленая дубовая листовертка, златогузки (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание. Разрешается выпас лактующего скота через 15 дней, откормочного и молодняка - 10, сбор грибов и ягод - 12, отдых - 5, сенокошение - 5 дней	- (1)	- (-)
л, КЭ (600 г/л) «Достук нэшнл» 17/03/09	1,5-1,8	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов	- (1)	- (4)
	1,5	Ячмень	Злаковые мухи	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)	
	0,5		Тли		20 (2)	10 (4)
	1,8-2	Сахарная свекла	Обыкновенный свекловичный долгоносик, щитоноска, мертвоеды			
	1-1,5	Табак	Подгрызающие совки			
	2-2,5	Клевер (семенные посевы)	Долгоносики, тли, клопы, совки, огневки, луговой мотылек, толстоножки		- (3)	
	1	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль	Опрыскивание в весенний период (фенофаза яблони - выдвижение бутонов - розовый бутон). Расход - 500-600 л/га	30 (1)	10 (4)
		Яблоня	Яблочный цветоед, боярышниковый краснокрылый трубноверт		20 (1)	7 (3)
	2-3	Люцерна (семенные посевы)	Долгоносики, клопы, совки, огневки, тли, луговой мотылек, толстоножки	Опрыскивание в период вегетации	- (2)	- (4)

	0,5 мл/м ²	Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м. ² Допуск людей и загрузка складов через 2 суток после обработки	- (-)	20 (4)
	1 мл/м. ²	Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах		Опрыскивание. Расход - до 200 мл/м. ²		- (-)
«Агро-Сервис», КЭ (400 г/л) «Ф.С.Е.» 21/12/09	1,0-1,2	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	10 (4)
«Агро-Сервис», КЭ (400 г/л) «Ф.С.Е.» 21/12/09	1	Рожь, ячмень	Пьявица, злаковые мухи, тли, трипсы			
		Овес	Злаковые мухи, тли			
«Агро-Сервис», КЭ (400 г/л) «Ф.С.Е.» 21/12/08	0,7-0,9	Просо	Комарики, тли	Опрыскивание до и после цветения	40 (2)	
«Агро-Сервис», КЭ (400 г/л) «Ф.С.Е.» 21/12/08	0,5-0,9	Зернобобовые	Бобовая огневка, гороховая плодоярка, тли			
		Яблоня, груша	Щитовки, ложнощитовки, клещи, листоевтки, тли, медяница, моли, плодоярки, листогрызущие гусеницы, жуки			
«Агро-Сервис», КЭ (400 г/л) «Ф.С.Е.» 21/12/08	1,1-1,9	Слива	Клещи, тли, пилильщики	Опрыскивание после цветения	40 (1)	
«Агро-Сервис», КЭ (400 г/л) «Ф.С.Е.» 21/12/08	1,1-2,8	Виноград	Клещи, червцы, листоевтки	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	
	0,5-0,9	Свекла сахарная, кормовая	Клопы, листовая тля, минирующие мухи и моли, клещи, цикадки, мертвяды, блошки		30 (2)	
«Агро-Сервис», КЭ (400 г/л) «Ф.С.Е.» 21/12/08	0,5-0,7	Свекла столовая	Паутиный клещ, тля		30 (2)	
	1	Свекла сахарная	Клещи, тли, трипсы, клопы		20 (2)	
«Агро-Сервис», КЭ (400 г/л) «Ф.С.Е.» 21/12/08	1,9-2,4	Картофель (семенные участки)	Тли		30 (2)	
	1,4-1,9	Картофельная моль	Клопы, тли, люцерновая толстоножка, клещи			
«Агро-Сервис», КЭ (400 г/л) «Ф.С.Е.» 21/12/08	0,5-0,9	Люцерна (семенные посевы)	Трипсы, тли			10-13
«Агро-Сервис», КЭ (400 г/л) «Ф.С.Е.» 21/12/08	0,8-0,9	Табак, махорка	Листоевтки, тли			10 (4)
	1,1-1,9	Конопля	Клещи, червец Комстока		Опрыскивание до и после окончания выкормки шелковичного червя. Запрещается употреблять ягоды в пищу.	30 (2)
«Агро-Сервис», КЭ (400 г/л) «Ф.С.Е.» 21/12/08	2-3	Шелковица	Листоевтки, галлицы, тли	Опрыскивание в период вегетации		
«Агро-Сервис», КЭ (400 г/л) «Ф.С.Е.» 21/12/08	1,1-1,5	Смородина (питомники, маточники)	Клещи, тли, цикадки, галлицы			
	0,6-1,1	Малина (маточники)	Клещи, тли			
«Агро-Сервис», КЭ (400 г/л) «Ф.С.Е.» 21/12/08	1,5-2,5	Хлопчатник	Стеблевая минирующая муха, тли			- (4)
«Агро-Сервис», КЭ (400 г/л) «Ф.С.Е.» 21/12/08	0,7	Люпин (семенные посевы)				

н/л) «АсТеРо упп» 03/01/09	1-2	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок в баковых смесях с пиретроидами	30 (1)	10 (4)
-------------------------------------	-----	--	------------	--	--------	--------

Фензулон						
н, СК (480 г/л) ра Европ тд» 01/12/09 К (480 г/л) ар С.А.» 11/12/09	0,015-0,02	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	7 (1)	7 (3)
		Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Итальянский прус, мароккская саранча, нестадные саранчовые	Опрыскивание против личиночной фазы сплошным методом	20 (1)	
	0,04-0,06 (в барьере)			Опрыскивание против личиночной фазы при ширине барьера 80-120 м и межбарьерного пространства 100-200 м		
	0,1	Хлопчатник	Хлопковая совка	Опрыскивание в период массовой откладки - начала отрождения гусениц	15 (2)	
		Яблоня	Яблонная плодожорка	Опрыскивание в период яйцекладки	30 (2)	
	0,06-0,1	Капуста	Капустная совка, белянки, капустная моль	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)	
	0,09-0,12	Лиственные леса	Горностаевые моли, пяденицы-шелкопряды	Опрыскивание. Запрещается сбор грибов, ягод, лек. растений в течение 4-х дней. Выпас скота и сенокошение без ограничений.	- (2)	
	0,12	Хвойные леса	Сосновая пяденица, сосновая совка			
	0,04	Неплодоносящие сады, городские зеленые насаждения, лесозащитные полосы и др. древесные насаждения	Американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации	- (1)	
ОФ-6, МС (60 г/л) ра Европ тд» 01/12/09	0,1-0,15	Пшеница яровая	Серая зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации	7 (1)	
	0,15	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	УМО в период отрождения и развития личинок сплошным методом	30 (1)	
	0,3 (норма расхода в барьере)			УМО в период отрождения личинок барьерным (ленточным) методом. Минимальная ширина барьера равна ширине захвата опрыскивателя, максимальная 90-120 м		

Ферметрин						
н, ВЭ (100 г/л) «Агро Европа ЛТД» 11/01/09	0,2-0,3	Яблоня	Плодожорки, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход 1000- 1500 л/га	25 (2)	7 (3)
	0,07 -0,1	Пшеница	Клоп вредная черепашка, тли, зерновая моль, пьявица, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход 200 - 300 л/га	20 (2)	- (3)
	0,07	Ячмень	Пьявица, трипсы		25 (2)	

	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации.	20 (2)	7 (3)
	0,24-0,36	Виноград	Гроздевая листовертка		30 (2)	
	0,1	Рапс	Рапсовый цветоед		20 (2)	- (3)
		Капуста	Листогрызущие гусеницы		25 (1)	7 (3)
	0,15	Свекла сахарная	Свекловичные блошки		20 (2)	
		Люцерна	Фитонемус		20 (1)	
	0,07-0,1	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)	
	0,3	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли	Опрыскивание в период вегетации	20 (4)	
	1-1,5 мл/10 л воды	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 5 л/100 м ²	20 (2)	
	1,5 мл/10 л воды	Яблоня	Плодожорки, листовертки	Опрыскивание в период вегетации. Расход - от 2 л (на молодое дерево), до 5 л - (на взрослое дерево).	25 (2)	
	1 мл /10 л воды	Капуста	Тли, белянки, моли	Опрыскивание в период вегетации. Расход - до 5 л/100м ² .		
	0,07-0,1	Лиственные и хвойные породы	Хвое- и листогрызущие вредители (гусеницы младших возрастов)	Опрыскивание авиацией. Разрешается выпас скота через 5 дней, откормочного и молодняка - 3, сбор грибов и ягод - 10, отдых - 4 дня. Сенокошение без ограничений.	- (1)	- (-)

оприд и, СП (700 г/кг) «Достук энэшнл» 08/12/10 рид, ВРГ 0 г/кг) Семсайенс ЛТД» 15/10/09 т, СП (700 г/кг) и Ко, ЛТД» 26/12/07 СП (700 г/л) и Ко., ЛТд.» 4/02/2011 П (700 г/кг) ай МИО Ко, ЛТД» 24/08/09 П (700 г/кг) ал Эженс дастриал	0,1	Перец	Цикадки, тля, трипсы	Протравление семян суспензией препарата (10-12 л воды /т)	60 (1)	- (-)
		Баклажан	Цикадки, тля, трипсы, белокрылка			
	0,7	Подсолнух	Цикадки, белокрылка			
	0,5-0,75	Капуста	Тля			
	0,1	Картофель	Колорадский жук, ризоктониоз, парша обыкновенная	Протравление семян суспензией препарата (25-30 л воды/т опущенных и 15-20 л воды/т механически оголенных семян)		
	5	Хлопок	Тля, трипсы			
	4-5	Сахарная свекла	Тля, а также вирусоносители - свекловичная минирующая муха, земляная блоха, свекловичный долгоносик,			

«С. Ко» 17/03/09 ид, СП (700 /кг) Агрочайна ешнл Ко., ГД» 27/07/11			свекловичная крошка, матовый мертвоед, проволочники			
	7	Кукуруза	Шведская муха, хлебная муха, кукурузный мотылек, проволочники			
	10,5	Подсолнечник	Проволочники, долгоносики			
	5	Хлопчатник	Тли, трипсы	Протравливание семян суспензией препарата (25-30 л воды/1 т опушенных и 15-20 л воды на 1 т оголенных семян)		
	0,15-0,2	Картофель	Проволочники, колорадский жук	Замачивание клубней. Расход рабочей жидкости 10 л/т		
ВРК (200 /л) агрос лс ЛТД» 1/01/09 ддор, ВК 0 г/л) ер Кроп с А.Г.» 1/01/09	0,06	Пшеница	Блошки, злаковые мухи, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	28 (1)	- (3)
	0,07		Клоп вредная черепашка			
	0,05-0,07	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя	20 (1)	1 (-)
	0,1-0,2	Картофель (семенные посевы)	Тли-переносчики вирусных заболеваний		- (3)	
		Табак	Тли, трипсы		20 (1)	
а, ВРК. 0 г/л) Куенсон ри Групп, ГД» 29/07/09	2	Томаты, огурцы, перцы защищенного грунта	Тли, трипсы, белокрылки	Опрыскивание в период вегетации в концентрации 0,05 %. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3 (1)	
	0,05-0,07	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинки. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадах не ранее 3 дней после обработки	- (1)	- (3)
	0,1-0,4	Хлопчатник	Тли, трипсы, белокрылка, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	
	0,1-0,4	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли, белокрылка, трипсы		30 (2)	
	0,06	Пшеница	Блошки, злаковые мухи, трипсы, тли		28 (1)	
г, ВРК (200 /л) квим Ко., ГД» 01/01/09	0,07		Пьявица, клоп вредная черепашка			
	0,15-0,25	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки, щитовки, тли		25 (1)	

р, ВРК (200 /л) м Компани итед» 12/08/08	0,05-0,07	Картофель	Колорадский жук		20 (1)	1 (-
	0,06-0,07	Зерновые	Клоп черепашка, злаковые мухи, трипсы, тли		28 (1)	- (3
	0,1-0,2	Табак	Тля, трипсы		20 (1)	1 (-
	0,1-0,4	Хлопчатник	Хлопковая совка, тли, белокрылка, трипсы		30 (2)	- (3
	0,05-0,07	Картофель	Колорадский жук		20 (1)	1 (-
	0,15-0,25	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки, щитовки, тли		25 (1)	- (3
	0,1-0,4	Хлопчатник	Тля, трипсы, белокрылка, хлопковая совка		30 (2)	
	0,15-1,5	Томаты, огурцы, перцы защищенного грунта	Тля, трипсы, белокрылка		3 (1)	1 (-
р, ВРК (200 /л) ай МИО Ко., ЛТД» 18/11/08	0,5-1,5	Огурцы, томаты защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га	3 (1)	
	1,25-1,5	Огурцы, защищенного грунта	Табачный трипсы, тли	Внесение в почву с водой. Расходы рабочей жидкости 3000 л/га		
	0,15-0,75		Тли			
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации при появлении вредителя. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	20 (1)	
	0,05-0,075	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинки. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га		
	1-3	Розы открытого и защищенного грунта	Тли, калифорнийский трипсы	Опрыскивание в период вегетации 0,1- 0,15 %-ным рабочим раствором	1 (2)	
	0,1-0,4	Хлопчатник	Тля, трипсы, белокрылка, хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	30 (2)	- (3
	1мл/10 л воды	Картофель	Колорадского жука	Опрыскивание в период массового появления вредителей. Расход рабочей жидкости до 10 л/100 м ²	20 (1)	1 (-
ВРК (200 /л) Фирма густ» 21/12/09	5 мл/10 л воды	Томаты, огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка, тли, трипсы			
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)	- (3
дигалотрин						
р, КЭ (50 /л) гента» 1/01/09	0,2	Пшеница	Хлебные жуки, трипсы, блошки, цикадки	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)	10 (-
	0,15		Клоп вредная черепашка, тли, пьявица		20 (2)	

КЭ (50 г/л) су Агрохем тори Ко., ГД» 22/07/08	0,15-0,2	Ячмень	Муки, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли		
	0,2	Кукуруза	Кукурузный мотылек		30 (1)
	0,4	Соя	Паутинный клещ		
КЭ (50 г/л) Ко., ЛТД» 26/12/07	0,5	Хлопчатник	Клещи, тли, хлопковая совка, белокрылка		30 (2)
	0,1	Горчица	Рапсовый цветоед		30 (1)
	0,4-0,8	Яблоня	Плодожорки, листовертки, клещи		20 (2)
КЭ (50 г/л) рбана стриас итед» 17/03/09	0,5	Земляники (маточники)	Паутинный клещ, тли, листовертки		- (2)
	0,4	Вишня (маточники)			
		Малина (маточники)			
	0,3-0,4	Смородина (маточники)			
	0,1	Картофель	Колорадский жук		20 (2)
		Капуста	Капустная совка, белянка, моль, крестоцветные блошки		30 (1)
		Томаты	Колорадский жук		
бда, КЭ (50 /л) Куенсон групп Лтд» 29/07/09	0,2-0,4	Неплодоносящие сады, городские зеленые насаждения, лесозащитные полосы	Американская белая бабочка		- (2)
	0,32-0,48	Виноград	Листовертки, клещи		30 (2)
КЭ (50 г/л) г Зуочуанг Ко., ЛТД» 26/07/07	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед		20 (2)
	0,15	Люцерна	Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, толстоножка люцерновая		30 (2)
КЭ (50 г/л) ровит» РФ 25/01/08		Свекла сахарная	Свекловичные блошки, тли, долгоносики	Опрыскивание в фазе «вилочки»	20 (1)
т, КЭ (50 /л) «Достук нэшнл» 17/03/09	0,1-0,15	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые нестадные и стадные (личинки младших возрастов)	Опрыскивание в период развития личинок.	30 (1)
	0,2-0,4		Саранчовые стадные (личинки старших возрастов и имаго)		
КЭ (50 г/л) Семсайенс ЛТД» 15/10/09					
КЭ (50 г/л) Агрочайна шнл Трайд Лтд" 14/12/10					
До, КЭ (50 /л). нскор эшнл Ко., тд» 1/01/2011					
КЭ (50 г/л) нг Нонг Фу икал Ко., тд» /05/2011					

КЭ (50 г/л) г Жуочуанг Ко., ЛТД» 21/10/09						
КЭ (50 г/л) о Кемикал ЛТД» 21/12/09	0,15-0,2	Пшеница	Листовая и злаковая тли, пьявица, трипсы, цикадки, вредная черепашка, хлебный клопик, хлебные блошки	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)	10 (0)
КЭ (50 г/л) м Компани инитед» 12/08/08	0,15	Сахарная свекла	Свекловичная мушка, свекловичный долгоносик, тля, блошки	Опрыскивание в фазе «вилочки»		
КЭ (50 г/л) остук нэшнл» 08/12/10	0,1-0,15	Рапс	Рапсовый цветоед, блошки, тли, белянка, пилильщики	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	
	0,1	Горчица	Рапсовый цветоед		30 (1)	
КЭ (50 г/л) Кемикалс ЛТД» 11/01/09	0,15-0,2	Ячмень	Муки, пьявица, цикадки, трипсы, стеблевые пилильщики, тли		20 (2)	
	0,2	Кукуруза	Кукурузный мотылек		30 (1)	
КЭ (50 г/л) интернэшнл» 11/01/09	0,15	Люцерна	Клопы, тли, долгоносики, листоблошки, толстоножка люцерновая		30 (2)	
КЭ (50 г/л) л Эженси и риал Инт. Ко». 08/12/10	0,4	Соя	Паутинный клещ		30 (1)	
	0,3-0,5	Виноградная лоза	Листовертки, красный паутинный клещ		30 (2)	
	0,5	Хмель	Паутинный клещ, тли			
	0,4-0,8	Яблоня	Листовертки, клещи, плодожорки		20 (2)	
	0,1-0,5	Плодовые питомники	Комплекс вредителей			
	0,3	Крыжовник (маточники)	Паутинный клещ, тли, пилильщики		- (2)	
	0,3-0,4	Смородина				
	0,4	Черешня, вишня				
	0,5	Малина				
		Шалфей мускатный	Долгоносики		30 (2)	
		Лаванда	Листогрызущие и сосущие вредители		30 (1)	
	0,1	Лесные насаждения	Комплекс вредителей		- (1)	- (-)
	0,2-0,4	Неплодоносящие сады и лесопосадки	Американская белая бабочка		- (2)	10 (0)
	0,4мл/м ² , 200 мл воды/м	Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов	Опрыскивание. Расход - до 50 мл/м ² . Допуск людей и загрузка складов через 3 суток после обработки	- (-)	3 (3)
	0,8 мл/м ² , 400 мл воды/м ²	Прилегающие к складам территории		Опрыскивание.		- (-)
	0,001-0,005 % ВЭ 40 мл воды/м ²	Применение в качестве дезинфекционного средства	Летающие и ползающие насекомые			
	0,1-0,15	Пастбища	Саранчовые	Опрыскивание заселенных площадей	30(1)	10 (0)
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	
	0,5	Шелковица	Тутовая огневка			
Фосфид						
ТАБ (560	5 г/м ³	Незагруженные	Вредители запасов	Фумигация при	- (-)	- (-)

	складские помещения	температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция 3-5 суток в зависимости от степени зараженности. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Содержание фосфина в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК
	Мука, крупа	Фумигация при температуре воздуха и продукта выше 15 °С. Экспозиция 3 суток. Производство концентрации на время экспозиции (ПКЭ) 25 г-ч/м ³ (гибель преимагинальных стадий до 90%). Допуск людей в склады после полного проветривания. Реализация продукции при отсутствии остатков фосфористого водорода. Время дегазации 2 суток.
	12 г/м ³	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью до 2,5 м и затаренные в мешки под брезентом или полиэтиленовой пленкой
	12 г/м ³	Надзерновое пространство
		Фумигация, экспозиция 3-5 суток, расход препарата на объем пространства, занятого зерном, в зависимости от степени зараженности. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания. Реализация через 20

				дней после обработки при остатке фосфористого водорода не выше МДУ.		
	9 г/м ³	Зерноперерабатывающие и пищевые предприятия		Фумигация при температуре воздуха выше 15 °С. Экспозиция - 2 суток. Сдача в эксплуатацию при концентрации фосфористого водорода не выше ПДК		
н, (660 г/кг и, 560 г/кг пы-ленты) я Дегеш енбах» 01/01/09	9 г/т	Зерно продовольственное, семенное, фуражное насыпью в складах, в силосах элеваторов, небольшие партии массой не более 200 т насыпью до 2,5 м и затаренные в мешки под пленкой	Насекомые-вредители запасов	Фумигация при температуре зерна выше 15°С. Экспозиция 5 суток. Дегазация не менее 10 суток. Реализация при остатке фосфина не выше МДУ. Допуск людей после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК	- (-)	- (-)
	5 г/м ³	Незагруженные зернохранилища		Фумигация при температуре воздуха выше 15°С. Экспозиция 5 суток. Допуск людей и загрузка складов после полного проветривания и при содержании фосфина в воздухе рабочей зоны не выше ПДК		

КЭ (500 /л) Агровит» 24/12/09 с, КЭ (500 /л) Алсико-пропм» 11/01/10	0,5-1,2	Зерновые	Тли, трипсы	Опрыскивание в период вегетации	20 (1)	- (4)
		Кукуруза	Тля листовая, цикадки		20 (2)	10 (4)
		Горох	Бобовая огневка, гороховая плодоярка			Опрыскивание при массовой яйцекладке
	1-1,2	Свекла сахарная	Опрыскивание в период вегетации	10 (4)		
	0,4-0,8	Лен		- (4)		
	1	Яблоня, груша		Клещи, тли, долгоносики, плодоярки, листовертки, медяница, пилильщики, щитовки, ложнощитовки	10 (4)	
		Вишня, черешня, слива				Тли, долгоносики, плодоярки, пилильщики, вишневая муха
		Неплодоносящие сады	Клещи, тли, листовертки, медяница, моли			- (4)

УМО (960 /л) «А/С» 01/01/09	1-2,6	Смородина	Тли, моли, галлицы, листовертки, пилильщики, щитовки, ложнощитовки		20 (2)		
		Крыжовник	Пилильщики, листовертки, огневки, пяденицы				
		Малина	Малинно-земляничный долгоносик, малинный жук, клещи, малинная почковая моль, тли				Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. В питомниках и маточниках без ограничений
	1-1,8	Земляника	Белокрылка, малинно-земляничный долгоносик, пилильщики, клещи	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)		
	1	Виноград	Клещи, мучнистый червец				
	0,6-1,2	Капуста	Капустная и репная белянки, капустная совка, капустная моль, мухи, тли, трипсы, белокрылка				
		Огурцы открытого грунта	Клещи, мухи, тли, трипсы, белокрылка				
		Томаты открытого грунта	Клещи, тли, белокрылка				
	0,4	Дыня, арбуз	Дынная муха, клещи, тли, бахчевая коровка				
	0,2-0,6	Люцерна (семенные посевы)	Клопы, тли, толстоножки, долгоносики, луговой мотылек, совки, огневки, галлицы		30 (2)	- (4)	
		Клевер (семенные посевы)					
		Эспарцет (семенные посевы)					
	1-1,8	Табак, махорка	Клопы, тли, трипсы		7 (2)	10-13	
	0,6-0,8	Подсолнечник	Клопы, тли		20 (2)	10 (4)	
		Горчица	Клопы, листоеды, капустная моль, пилильщики, цветоеды				
	0,6-1	Соя, арахис, кунжут, кориандр	Клещи, тли, листоеды, совки, луговой мотылек				
	0,6-1,2	Хлопчатник	Тли, клещи, трипсы, белокрылка				
	2-3	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок			
		0,5	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые, личинки младших возрастов	Опрыскивание в период массового отрождения личинок		
				Личинки 1-3 возрастов	Обработка кулиг		
				Личинки 4-5 возрастов	Обработка кулиг		
				Имаго	Обработка кулиг на земле и стай в воздухе		

ОЛ, РК (200 /л) «де Немур Шнз Сарл.» 06/10/09	0,8-1,2	Хлопчатник	Тля, трипсы, белокрылка, клещи	Опрыскивание в период вегетации	15 (4)	10 (4)
Хлопковая совка (опрыскивание в период яйцекладки -						

			начале отраждения гусениц)			
	2,5		Хлопковая совка (обработка после отрождения гусениц)			
ен						
П (200 г/кг) ожай ХХI» 01/01/09	0,5-0,9	Яблоня, груша, виноград	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)	7 (3
		Хлопчатник	Паутинный клещ			
		Табак	Клещи			
ксифен						
л, КЭ (100 /л) мо Кемикал Юроп» 01/12/09	0,5	Хлопчатник	Белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	7 (3
	0,2-0,3	Томаты, огурцы защищенного грунта	Тепличная белокрылка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га	3 (1)	2 (-
	0,5	Плодовые культуры	Щитовки	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000-2000 л/га	14 (1)	7 (3
т						
т, КЭ (570 /л) ай МИО Ко., ЛТД» 24/08/09	1,5-3	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	42 (2)	7 (3
	1,2-1,8	Виноград			60 (2)	
		Огурцы защищенного грунта	Ржавчинный клещ		45 (1)	
	3	Гвоздика, роза	Клещи		3-5 (1)	3 (-
	1	Сахарная свекла			45 (1)	
КЭ (570 г/л) ал Эженси стриал Инт. Со» 17/03/09	1,3	Соя				- (3
	1,2-1,8	Ягодные культуры			- (2)	7 (3
	1,5-2	Хлопчатник			45 (2)	
	2,5-3	Хлопчатник				
	2-4	Яблоня			42 (2)	
т, КЭ (570 /л) «Достук нэшнл» 17/03/09	6	Огурцы защищенного грунта			45 (1)	
	1,6-2,4	Виноградная лоза			60 (2)	
	2,5	Соя			45 (1)	- (3
	1,6-2,4	Вишня		Опрыскивание после сбора урожая	- (2)	
т, КЭ (300 /л) «Достук нэшнл» 08/12/10						
Э (570 г/л) ра Европ тд» 01/12/09	1,5-2	Хлопчатник	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	45 (2)	7 (3
	2	Яблоня				
		Огурцы защищенного грунта			45 (1)	
КЭ (570 /л) ра Европ тд» 01/12/09	1мл/м ²	Незагруженные зернохранилища, прискладская территория	Хлебные клещи	Опрыскивание. Расход рабочей жидкости 200 мл/м ² . Допуск людей и загрузка зерна через 3 суток после обработки.	- (-)	- (-
айт, КЭ 0 г/л) санг Нонг						

Кемикал Лтд» /05/2011						
Фос+лямбда-цигалотрин						
ин КА, КЭ -15 г/л) гента" 5/03/2011	1	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина, тли, трипсы, белокрылки, клещи	Обработка посевов в период массового отрождения личинок и имаго	20 (1)	7 (3)
	0,1-0,15	Картофель	Колорадский жук			
Фос+циперметрин						
и форте, КЭ -40 г/л) рбана стриас питед» 17/03/09	0,7-1	Хлопчатник	Паутинный клещ, хлопковая совка, американский червь, белокрылка, розовый коробочный червь, листовертка, подгрызающие совки, клопы, карадарина	Опрыскивание растений в период вегетации	30 (2)	10 (4)
	0,35-0,5		Тля, трипсы			
рин, КЭ -40 г/л) Агрочайна эшнл Ко., тд» 27/07/11	0,35-0,75	Шелковица	Тутовая огневка	Опрыскивание в период вегетации, в ранней стадии заселения вредителем	- (1)	
Фос+лямбда-цигалотрин						
ио, СК 106 г/л) гента» 5/03/2011	0,1-0,15	Зерновые культуры	Хлебные жуки, пьявица, тли, трипсы, блошки, цикадки, мухи, пилильщики, клоп вредная черепашка, совки	Опрыскивание в период вегетации	20 (1-2)	14 (4)
	0,2-0,25	Хлопчатник	Хлопковая совка, карадрина, тля, табачный трипс, белокрылка		30 (2)	
	0,1	Картофель	Колорадский жук	Обработка посевов в период массового отрождения личинок и имаго	20 (2)	
	0,2-0,25	Овощные (лук, капуста, томаты)	Вредители отряда чешуекрылых (капустная белянка, совки, моли), сосущие (тли, клещи, трипсы)		25 (1)	
	0,1-0,15	Участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Обработка посевов в период массового отрождения личинок	30 (1)	
Изурон						
СК (150 г/л) агро Б.В.» 21/12/09	0,5-1	Яблоня	Яблонная плодояорка	Опрыскивание в период вегетации	30 (3)	7 (3)
	0,5-0,7	Виноградная лоза	Гроздевая листовертка, пяденица		20 (1)	
	0,3	Капуста	Комплекс листогрызущих гусениц			
	0,04-0,3	Лиственные и хвойные породы	Звездчатый и еловый пилильщики, ольховый листоед, зимняя еловая пяденица, сосновая совка, зеленая дубовая листовертка, непарный и сосновый шелкопряды, златогуска, ткачи	Авиа- или наземное опрыскивание.	21 (1)	
	0,15	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	14 (4)
	0,2-0,4	Томаты, огурцы	Белокрылка, совки, моли,		15 (2)	

УМО. (50 г/л) Агро Б.В.» 21/12/09	0,5-1	(защищенного грунта) Яблоня	трипсы Яблонная плодоярка	Опрыскивание в период вегетации	30 (3)	7 (3)
	0,5-0,7	Виноградная лоза	Гроздевая листовертка, пяденица		20 (1)	
	0,3	Капуста	Комплекс листогрызущих гусениц			
	0,04-0,3	Лиственные и хвойные породы	Звездчатый и еловый пилильщики, ольховый листоед, зимняя еловая пяденица, сосновая совка, зеленая дубовая листовертка, непарный и сосновый шелкопряды, златогузка, ткачи	Авиа- или наземное опрыскивание.	21 (1)	
	0,15	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	14 (3)
	0,2-0,4	Томаты, огурцы (защищенного грунта)	Белокрылка, совки, моли, трипсы		15 (2)	
	0,175	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период личиночной фазы развития вредителя	- (1)	
Оксидметилметрин						
Фос, КЭ (10 г/л) Агро Б.В.» 17/03/09	0,35-0,5	Пастбища	Саранчовые	Опрыскивание заселенных площадей	30 (2)	10 (3)
	1,25	Хлопчатник	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации		
	1		Тли, трипсы			
	1,5		Хлопковая совка, карадарина			
	1,25-1,5		Белокрылка			
	0,6-0,8	Шелковица	Тутовая огневка	Опрыскивание в период вегетации в ранней стадии заселения вредителем	- (2)	
Фос-сад, КЭ (10 г/л) «Достук-нэшнл» 17/03/09	1,25	Хлопчатник	Паутинный клещ	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	30 (3)
	1		Тли, трипсы			
	1,5		Хлопковая совка, карадарина			
	1,25-1,5		Белокрылка			
	0,6-0,8	Щелковица	Тутовая огневка	Опрыскивание в период вегетации, в ранней стадии заселения вредителем	- (2)	
	1-2	Яблоня	Плодожорка, тли, трипсы, щитовки, клещи	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	
	0,8-1,5	Овощи	Тли, трипсы, клещи, совки			
Ион						
СК (550 г/л) Ф Агро Б.В.» 21/12/09	1,2	Яблоня	Клещи	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	3 (3)
	1,35	Соя				
		Хлопчатник				
Ион						
Ион, КЭ	0,6-1	Пшеница	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	7 (3)

0 г/л) итомо ал Агро роп» 01/12/09	0,8-1		Трипсы, тли, хлебные жуки				
	1		Злаковая листовертка	Обработка краевых полос шириной 50-100 м в фазе выхода в трубку	30 (1)		
	2-2,5		Зерновая совка	Опрыскивание в период вегетации			
	0,5	Ячмень	Тли				
	1	Рис					
	0,7		Комарики, имаго прибрежной мухи				
	1,6-4	Яблоня, груша	Моли, тли, плодоярки, стеклянница, щитовки, ложнощитовки		30 (2)		
	1-2,4	Вишня, слива	Сливовая плодоярка, щитовки, ложнощитовки, тли		20 (2)		
	1-1,4	Табак	Хлопковая совка, луговой мотылек, совки, карадина, жуки, тли			7-10	
	0,6-1,2	Свекла сахарная	Минирующая моль и муха, совки, клопы, листовая тля, луговой мотылек			7 (3)	
	0,6-1	Свекла столовая					
	0,8-1,8	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые		- (1)	- (3)	
	0,4 мл/м ²	Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий.	Вредители запасов		Опрыскивание. Расход - до 50 мл на 1 м ² . Допуск людей и загрузка зерна через 3 суток после обработки	- (-)	3 (3)
		Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах			Опрыскивание. Расход - до 200 мл на м ² .		- (-)
	20 мл/т	Зерно злаковых и семена бобовых культур			Опрыскивание. Расход - 500 мл на 1 т зерна. Допуск людей при концентрации препарата не выше ПДК. Использование зерна на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ		1 (1)

атрин						
д, КЭ (100 /л) мо Кемикал Юроп» 01/12/09	1-1,5	Яблоня	Плодожорки, листовертки, клещи	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)	10 (1)
	10 г/10 л воды			Опрыскивание в период вегетации, до 2 л рабочего раствора на 1 молодое дерево, до 5 л - на взрослое дерево		
	2	Хлопчатник	Хлопковая совка, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	

	1-1,5		Клещи, тли				
л							
ВДГ (800 (кг) Ф Агро В.» 21/12/09 ВДГ (800 (кг) Куенсон и групп» 22/08/07	0,01-0,02	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание растений в период вегетации	30 (2)	7 (3)	
	0,03	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период появления всходов	30 (1)		
			Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в фазе молочной спелости			
			Пьявица	Опрыскивание в период вегетации			
	0,022						
	0,02	Ячмень					
0,01	Пастбища	Саранчовые	Опрыскивание заселенных площадей				
СП (800 (кг) «Достук нейшнл»	0,01-0,02	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	30 (1)	
	0,03	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период появления всходов. Расход 200-300 л/га	30 (1)		
			Вредная черепашка (личинки младших возрастов)	Опрыскивание в фазу молочной спелости, при численности не более 1 личинки на 1 м²			
			Пьявица	Опрыскивание в период вегетации			
	0,02-0,025						
	0,02	Ячмень					
0,01	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание заселенных площадей				
КС (800 (кг) Ф Агро В.» 21/12/09	0,025	Участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития саранчовых сплошным методом	- (1)	7 (3)	
	0,02-0,025	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание растений в период вегетации	30 (2)		
	0,03	Пшеница	Хлебная жужелица	Опрыскивание в период появления всходов	30 (1)		
			Клоп вредная черепашка (личинки младших возрастов)	Опрыскивание в фазе молочной спелости при численности не более 1 экз./м.²			
			Пьявица	Опрыскивание растений в период вегетации			
	0,025						
	0,02	Ячмень					
	0,48	Свекла сахарная (семенные посевы)	Подгрызающие совки		20 (2)		
	0,4	Свекла сахарная					
	0,32	Соя	Луговой мотылек, соевая плодоярка, многоядный листоед		20 (1)		
	0,24	Люцерна	Фитонимус				
0,24-0,32	Арбуз, дыня, томаты	Подгрызающие совки	Опрыскивание в весенний период	20 (1)			
анилипрол							
КС (200 г/л) де Немур нз С.А.р.л.» 06/10/09	0,04	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации в момент отрождения личинок	14 (1)	6 (3)	
	0,15-0,3	Яблоня	Яблонная плодоярка	Опрыскивание в	21 (2)		

			и листовертки	период вегетации. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га		
Фос						
Фос, КЭ (480 г/л) «Агро-Мастер» 21/12/09 Фос, КЭ (480 г/л) «Агро-Мастер» 21/01/09	2-2,5	Свекла сахарная	Обыкновенный свекловичный долгоносик, совки, щитоноски	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	13 (4)
	1,5		Блошки		30 (1)	
	0,8		Листовая тля			
	1,5-2,0		Луговой мотылек, мертвоеды			
	2	Яблоня	Плодожорки, листовертки, моли, клещи, щитовки, тли	Опрыскивание в период вегетации	40 (2)	13 (4)
		Персик	Ложнощитовки		60 (1)	
	1,5	Картофель	Колорадский жук		30 (2)	
		Хмель	Паутинный клещ, тли			
	3		Люцерновый долгоносик	Опрыскивание всходов	- (1)	
	1,5	Люцерна	Фитономус	Опрыскивание в период вегетации	25 (1)	- (4)
	0,3-0,8 (при большой численности вредителя)	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание против личинок саранчовых всех возрастов	20 (1)	10 (4)
	0,2-0,4	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые			
Фос+циперметрин						
Фос+циперметрин, КЭ (50 г/л) «Агро-Мастер» 21/12/09 Фос+циперметрин, КЭ (50 г/л) «Агро-Мастер» 12/08/08	1,5	Яблоня	Плодожорки, тли, клещи, листовертки, моли	Опрыскивание в период вегетации	40 (2)	10 (4)
	1,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, клещи, белокрылка	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	2 (4)
	1		Тли, трипсы			
	0,35-0,5		Тли, трипсы			
	0,35-0,75	Щелковица	Тутовая огневка	Опрыскивание в период вегетации, в ранней стадии заселения вредителем	- (2)	
0,35-0,5	Пастбища	Саранчовые	Опрыскивание заселенных площадей	30 (2)		
Фос+циперметрин, КЭ (50 г/л) «Агро-Мастер» 26/12/07 Фос+циперметрин, КЭ (50 г/л) «Агро-Мастер» 29/12/08	1,5	Яблоня	Яблонные плодожорки, тли, клещи, листовертки, моли, клопы	Опрыскивание в период вегетации	40 (2)	
	1,5	Хлопчатник	Хлопковая совка, клещи, белокрылка		30 (2)	
	1		Тли, трипсы			
	0,5	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, трипсы		- (1)	- (3)

Лтд» 31/03/10						
ифос, КЭ -50 г/л) рижат риас ПВТ гд.» 09/07/10						
фос, КЭ -50 г/л) ал Эженси стриал Инт. Ко» 08/12/10						
КЭ (500+50 /л) нскор эшнл Ко., гд», 1/01/2011						
КЭ (500+50 /л) Агрочайна шнл Трайд Лтд» 14/12/10						
КЭ (500+50 /л) нг Нонг Фу икал Ко., гд» /05/2011						
КЭ (500+50 /л) Кемсайенс ЛТД» 15/10/09						
ос-Д, КЭ -50 г/л) Куенсон и групп» 25/09/08						

грин						
КЭ (250 г/л) вропа НВ» 1/01/09	0,32	Кукуруза	Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	- (3)
	0,2	Пшеница	Злаковая тля, пьявица, блошки, трипсы, клоп вредная черепашка			
КЭ (250 г/л) роп Сайенс» 3/01/09	0,16-0,32	Яблоня	Плодожорки, листовертки		25 (3)	7 (3)
	0,26-0,38	Виноградная лоза	Листовертки			
КЭ (250 г/л) рукем эшнл Ко., ГД» 24/09/07	1,2-1,6	Огурцы, томаты, перцы защищенного грунта	Белокрылка		3 (2)	2 (-)
	0,64-0,8		Тли, трипсы			
	0,32	Хлопчатник	Хлопковая совка, подгрызающие совки, белокрылка, клопы, тли		20 (2)	7 (3)
	0,2		Тли			

д, КЭ (250 /л) рижат риас ПВТ ГД» 09/07/10 А, КЭ (250 /л) Агровит» 24/12/09	0,16	Капуста	Белянки, совки, моли		25 (3)	
	0,14-0,24	Крестоцветные (семенные посевы)	Рапсовый цветоед		- (3)	- (3)
	0,16	Картофель	Колорадский жук, картофельная коровка		20 (2)	7 (3)
	0,48	Свекла сахарная (семенные участки)	Тли-переносчики вирусных заболеваний		- (4)	
	0,4	Свекла сахарная	Подгрызающие совки			
	0,32	Соя	Соевая плодожорка, многоядный листоед		20 (2)	- (3)
	0,24	Люцерна	Фитонемус			
	0,24-0,32	Арбуз, дыня, томаты	Совки подгрызающие	Опрыскивание в весенний период	20 (1)	7 (3)
	0,06	Дыня	Бахчевая коровка	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)	
	0,5	Морковь	Морковная муха, листоблошки		20 (2)	
	0,5 мл/м ²	Шампиньоны	Грибные мухи и комарики	Опрыскивание субстрата	25 (2)	
	0,2-0,4	Участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок	20 (1)	- (3)
	3 мл/м ²	Лиственные и хвойные породы	Стволовые вредители	Инъекция под кору. Доза на 1 м ² поверхности коры дерева	- (1)	- (-)
	0,05-0,1	Городские зеленые насаждения	Тополевая моль, непарный шелкопряд	Опрыскивание растений в период вегетации 0,01 % рабочим раствором препарата	7 (1)	
	0,8 мл/м ²	Незагруженные складские помещения, оборудование зерноперерабатывающих предприятий	Вредители запасов, кроме клещей	Опрыскивание. Расход до 200 мл/м ² . Допуск людей и загрузка складов через сутки после обработки	- (1)	1 (1)
	1,6 мл/м ²	Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах		Опрыскивание. Расход до 200 мл на м ²		
	24 мл/т	Зерно злаковых и семена бобовых		Опрыскивание. Расход до 500 мл на 1 т зерна. Запрещается использование зерна на продовольственные и фуражные цели		
ан, КЭ (100 /л) трейд рейшн» 1/01/09	0,5	Пшеница	Злаковая тля, пьявица, хлебные блошки, вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	- (3)
	0,8	Кукуруза	Совки			
		Хлопчатник	Хлопковая совка, подгрызающие совки, белокрылки, клопы			7 (3)
	0,5		Тли			
	0,4-0,8	Яблоня	Плодожорки, листовертки		25 (3)	
	0,64-0,96	Виноградная лоза	Листовертки			
	3,0-4,0	Огурцы, томаты, перцы защищенного грунта	Белокрылка		3 (2)	2 (-)
	1,6-2	Огурцы, томаты, перцы защищенного грунта	Тли, трипсы			

	0,4	Капуста	Белянки, совки, моли		25 (3)	7 (3)	
	0,35-0,6	Крестоцветные (семенные посевы)	Рапсовый цветоед		- (3)	- (3)	
	0,25-0,4	Картофель	Колорадский жук		20 (2)	7 (3)	
	1,2	Картофель (семенные участки)	Тли-переносчики вирусных заболеваний		- (4)		
		Свекла сахарная (семенные посевы)					
	1	Свекла сахарная	Подгрызающие совки				
	0,8	Соя	Луговой мотылек, соевая плодоярка, многоядный листоед		20 (2)	- (3)	
	0,6	Люцерна	Фитономус				
	0,6-0,8	Арбуз, дыня, томаты	Подгрызающие совки (опрыскивание в весенний период)	Опрыскивание в весенний период	20 (1)	7 (3)	
	0,15	Дыня	Бахчевая коровка	Опрыскивание в период вегетации	30 (2)		
	1,25	Морковь	Морковная муха, листоблошки		20 (2)		
	0,4-0,8	Табак	Хлопковая совка, табачный червец, табачная гусеница				
	0,2-0,4	Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок	20 (1)	- (3)	
Грин + хлорпирифос							
нал, КЭ (500 г/л) «Ай МИО Ко., ЛТД» 18/11/08 фос, КЭ (500 г/л) «Достук Энэшнл» 17/03/09	1,5	Яблоня	Плодожорки, тля, клещи, листовертки, моли	Опрыскивание в период вегетации	40 (2)	10 (4)	
	0,5	Картофель	Колорадский жук		30 (2)		
	1-1,5	Свекла сахарная, кормовая	Долгоносик, совка, крошка, щитовки, луговой мотылек, мертвоеды				
			Листовая тля				
			Блошки				
	0,5	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые		20 (1)	2 (-)	
	1	Хлопчатник	Тли, трипсы		30 (2)		
	1,5		Хлопковая совка, клещи, белокрылка				
Лерат							
льфа, КЭ (500 г/л) «Ай МИО Ко., ЛТД» 18/11/08 фос, КЭ (500 г/л) «Достук Энэшнл» 17/03/09	0,2-0,25	Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	- (4)	
	0,3		Мухи				
	0,2	Ячмень	Пьявица, мухи, блошки		20 (1)		10 (4)
	0,3	Горох (кроме зеленого горошка)	Тли				
	0,5	Хлопчатник	Белокрылка, хлопковая совка				
	0,5-1	Яблоня	Яблонная плодоярка, листовертки		45 (1)		
	0,4-0,6	Виноградная лоза	Листовертки			20 (2)	
	0,15-0,25	Картофель	Колорадский жук				
	0,2	Капуста	Белянки, совки, моли				20 (1)
	0,3	Рапс	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки		20 (2)	- (4)	
	0,2-0,3	Пастбища. Дикая растительность, участки,	Саранчовые		Опрыскивание в период массового	20 (1)	10 (4)

альфа, КЭ 0 г/л) питомо ал Агро роп» 01/12/09 альфа, КЭ 0 г/л) Кемикалс ЛТД» 29/12/08	0,05-0,07	заселенные саранчовыми Пшеница	Клоп вредная черепашка, пьявица, мухи	Опрыскивание в период вегетации	15 (1-2)	- (4)
	0,05	Ячмень	Пьявица, мухи, блошки		20 (1)	
	0,08	Горох (кроме зеленого горошка)	Тли			
	0,13-0,25	Яблоня	Яблонная плодожорка, листовертки		20 (1)	10 (4)
	0,01-0,15	Виноград	Листовертки		45 (1)	
	0,04-0,07	Картофель	Колорадский жук		20 (2)	
	0,05	Капуста	Белянки, совки, моли, ложнощитовки, тли		20 (1)	
	0,05-0,08	Рапс, горчица	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки		20 (2)	
	0,13	Хмель	Тли		40 (1)	
		Хлопчатник	Хлопковая совка, белокрылка		20 (2)	- (4)
0,08		Пастбища. Дикая растительность, участки, заселенные саранчовыми	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок	20 (1)	10 (4)

перметрин

Э (400+50 /л) рбана стриас итед» 17/03/09	1,5	Хлопчатник	Паутинный клещ, хлопковая совка, американский червь, розовый коробочный червь, листовертка	Опрыскивание в период вегетации	45 (2)	10 (4)
	0,25-0,5		Тля, трипсы, белокрылка			
	1,5	Капуста	Моль капустная		45 (1)	
	0,25-0,5		Тля, белокрылка			
	1,5	Томаты	Плодовый долгоносик		45 (2)	
	0,25-0,5		Белокрылка, трипсы			
	1,5	Перец болгарский	Плодовый долгоносик		60 (2)	
	0,25-0,5		Трипсы, тля, белокрылка			
	1,5	Баклажаны	Плодово-почковый долгоносик		45 (1)	
	0,25-0,5		Тля			
	1,5	Картофель	Плодово-почковый долгоносик		30 (2)	
	0,25-0,5		Тля, белокрылка			

циды

1	2	3	4	5	6	7
к, СП (500 кг). «Достук нэшнл» 08/12/10	0,3-0,6	Пшеница яровая и озимая	Снежная плесень, церкоспореллез, фузариозная корневая гниль, офиоболез	Опрыскивание в период вегетации. Расход - (200-400 л/га)	50 (1-2)	- (4)
	0,5-0,6		Мучнистая роса			
П (500 г/кг) / Агрокем тори Ко., ГД» 18/11/08	2	Рис	Пирикулярриоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход - (350-400 л /га)	30 (1)	
	0,3-0,6	Рожь озимая	Снежная плесень, церкоспореллез, фузариозная корневая гниль, офиоболез	Опрыскивание в период вегетации. Расход (200-400 л /га)	-(1)	
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	20 (3)	10 (4)
	0,6		Мучнистая роса,		40 (1)	

	1,5-3 г/м ²	Табак	Черная корневая гниль	Полив почвы в парниках 0,25 %-ным рабочим раствором посева семян и при появлении первых признаков болезни. Расход - (0,6-1,2 л/м ²)	-(2)	
	1,5	Виноград	Серая гниль, оидиум	Опрыскивание в период вегетации 0,1 %-ным рабочим раствором с добавлением эмульсина 0,1 %-ной концентрации. Расход - (1500 л /га)	30 (2)	
	1-2	Яблоня, груша	Мучнистая роса, парша	Опрыскивание в период вегетации 0,1 %-ным рабочим раствором. Расход - (1000-2000 л/га)		
	0,8-1	Смородина черная	Американская мучнистая роса	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая. В питомниках и маточниках без ограничений. Расход - (400-600 л /га)	-(2)	10 (-)
	1,5	Малина (питомники)	Пурпуровая пятнистость, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации 0,15 %-ным рабочим раствором. Расход - (1000 л /га)	-(4)	
	1-1,2	Капуста	Кила	Полив почвы 0,1-0,15 % рабочим раствором	-(1)	
	1-1,5	Роза	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0,1%-ным рабочим раствором	-(4)	
	0,5-0,8	Сосна (питомники и молодняки)	Снежное и обыкновенное шютте	Опрыскивание растений	-(1)	
назол						
СК (100 г/л) Ф Кроп «енс» 03/01/09	0,3	Яблоня, груша	Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход - 1000-1500 л/га	30 (4)	10 (-)
		Виноград	Оидиум			
	0,2	Смородина черная	Септориоз, антракноз или «мухосед», американская белая бабочка	Опрыскивание в период вегетации: 1-е опрыскивание профилактическое, последующее - с интервалом 18-20 дней	20 (3)	
орф+манкоцеб						
г МЦ, СП (100 г/кг) Ф Агро В...» 21/12/09	2	Картофель, томаты	Фитофтороз, макроспориоз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации 0,4-0,5 %-ной суспензией препарата: 1-е - после появления первых признаков заболевания, последующие 2 - с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 400-500 л/га	20 (3)	7 (3)
		Лук	Пероноспороз	Опрыскивание в		

ДТ» 4/02/2011		Огурцы (открытого, защищенного грунтов, семенные посевы)		период вегетации 0,4-0,5 %-ной суспензией препарата: 1-е - после появления первых признаков заболевания, последующие 2 - с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости: на открытом грунте и в семенных посевах - 500-600 л/га, на защищенном грунте - 2000-3000 л/га	15 (3)	
		Виноградная лоза	Милдью	Опрыскивание в период вегетации 0,4-0,5 %-ной суспензией препарата: 1-е - после появления первых признаков заболевания, последующие 2 - с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости 1000-1500 л/га	40 (3)	

КЭ (750 л) Ф Агро В.» 21/12/09	0,5-0,7	Яблоня	Парша, черная гниль, пятнистость листьев, бурая гниль, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации 0,05-0,2 %-ной суспензией препарата. Расход - 1500 л/га	20 (5)	7 (3)
		Груша	Парша груши, пятнистость листьев, ржавчина груши, черная пятнистость, бурая гниль			
		Персики, абрикосы	Бурая гниль, парша, курчавость листьев, ржавчина, кластероспориоз		15 (3)	
		Виноград	Ложная мучнистая роса или милдью, усыхание побегов, черная гниль, антракноз		30 (6)	

ст, КЭ (250 л) и Ко., Лтд» 26/12/07	0,15-0,2 или 2 мл/10 л воды	Яблоня,	Парша, мучнистая роса,	Опрыскивание в период вегетации 0,015-0,02 %-ным рабочим раствором	20 (4)	7 (3)
		Груша			14 (4)	
	0,4	Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз	Опрыскивание в период вегетации.	20 (2)	
	0,2	Плодовые косточковые (персик, абрикос, слива, вишня, черешня)	Кластероспориоз, курчавость листьев, парша, коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - «зеленый конус», второе - после цветения. Расход - 1000-1500 л/га	21 (2)	

СК (500 г/л) ай МИО Ко., ЛТД» 24/08/09	0,3-0,6	Пшеница, ячмень, рожь, рис	Корневые гнили, фузариоз колоса, предотвращение полегания	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)	- (7)
---	---------	----------------------------	---	---------------------------------	--------	-------

	0,5-0,6	Ячмень, пшеница, рожь	Мучнистая роса, гельминтоспориоз		30 (2)	
	0,6-0,8	Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса		20 (3)	7 (3)
	1-1,5	Пшеница, ячмень, яровые и озимые	Пыльная, твердая (каменная) головня, церкоспореллезная, фузариозная корневые гнили, снежная плесень	Протравливание семян. Расход - 10 л/т	-(1)	- (-)
го Супер С (200 г/л) «еми КФТ» 01/01/09 юл-Супер, (200 г/л) и Ко., Лтд.» 4/02/2011	1,5-2	Пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь озимая	Корневые гнили, церкоспореллез, фузариоз колоса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса, ржавчина бурая, темно-бурая пятнистость ячменя, ринхоспориоз ржи	Опрыскивание в период вегетации	20 (1-2)	- (7)
		Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз		20 (2)	7 (3)
		Подсолнечник	Фомопсис			
	1	Яблоня	Мучнистая роса, парша	Опрыскивание в период вегетации 0,1 %-ным рабочим раствором		
	0,2-0,3	Картофель (семенной)	Сухая (фузариозная) гниль, ризоктониоз	Обработка клубней перед посадкой. Расход - 3-5 л/т	- (1)	
	2,5	Виноград	Белая и серая гнили	Опрыскивание в период вегетации. Расход - 800-1200 л/га	21 (4)	
б						
45, СП (800 г/кг) «о Саенсес» 21/12/09	2-3	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации 0,2 %-ным рабочим раствором	30 (6)	7 (3)
	1,2-1,6	Картофель, томаты	Фитофтороз, макроспориоз		20 (5)	
а, СП (800 г/кг) «ай МИО» Ко, ЛТД» 24/08/09	2-2,5	Картофель (семенной)	Ризоктониоз	Обработка клубней	-(1)	- (-)
5, ВРП (800 г/кг) «л Кемикал пани» 09/07/10						
П (800 г/кг) «емсайенс ЛТД» 15/10/09						
еб, СП 800 г/л «Кемикалс ЛТД» 01/01/09						
б, СП (800						

(кг) уд ЛТД» 4/03/2011*						
б+металаксил						
П (640+80 (кг) остук нэшнл» 08/12/10 Голд, ВРП 80 г/кг) ал Эженси дастриал с. Ко» 17/03/09 ет (640+80 (кг) л Кемикал пани» 09/07/10 л МЦ, СП 80 г/кг) Целково охим» 21/12/09 СП (640 +80 (кг) Куенсон ри групп 22/08/07 зеб, СП 80 г/кг) и Ко., Лдт.» 4/02/2011* нь, СП (640 г/кг) ай МИО , Ко ЛТД» 18/11/08 сил, СП 80 г/кг) Фирма густ» 21/12/09	2,5 или 0,025/10 л воды	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - до смыкания ботвы в рядах, второе - после смыкания ботвы в рядах	20 (2)	7 (3)
		Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней. Расход - 800-1000 л/га	20 (3)	
		Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней. Расход - 300-500 л/га		
		Огурцы открытого грунта, лук (кроме лука на перо)	Пероноспороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней. Расход - 400-600 л/га	10 (3)	
б+ мефеноксам						
ил Голд I (640+40 (кг) гента» 3/01/05 Голд, ВДГ 40 г/кг)	2,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации 0,5- 0,6 %-ным рабочим раствором	14 (3)	7 (3)
		Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации	21 (4)	
		Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз		10 (4)	
		Огурцы открытого грунта	Пероноспороз		5 (3)	5 (3)
		Лук всех генераций			15 (3)	7 (3)

нжинг анг Ко., ГД» 21/10/09 П (640+40 /кг) Агрочайна шнл Трайд Лтд» 14/12/10						
б+цимоксанил						
м (640+80 /кг) л Кемикал пани» 09/07/10	1,5	Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 400 л/га	21(4)	7 (3)
		Томат открытого грунта		Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 400-600 л/га		
		Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га	30(4)	
ам ДФ, 700 г/кг) Ф СЕ» 16/04/10	1,5-2,5	Яблоня, груша	Парша плодов и листьев, ржавчина, пятнистость листьев, сажистый грибок, «мухосед», серая гниль	Опрыскивание в период вегетации: первое: зеленый конус, второе - розовый бутона, третье - конец цветения, четвертое - плод размером с грецкий орех. Расход (в зависимости от возраста деревьев) - до 1500 л/га	20 (4)	7 (3)
	2,5-3	Томаты открытого грунта	Фитофтороз, альтернариоз, пятнистость листьев, серая гниль, бурая пятнистость, антрокноз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, последующие с интервалом 10-14 дней (в зависимости от развития болезни). Расход - 300-600 л/га		
	1,5-2	Огурцы открытого грунта	Пероноспороз, антрокноз тыквенных, бурая пятнистость листьев, альтернариоз, аскохитоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое (4-5 листьев), последующие с интервалом 10-14 дней. Расход - 800 л/га	20 (3)	
	1,5-2,5	Виноград	Милдью, краснуха, черная гниль, черная пятнистость (отмирание побегов), антракноз	Опрыскивание в период вегетации: первое - видимое образование соцветия, второе - позднее цветение, третье - формирование плода, четвертое - ягода	30 (4)	

				размером с горошину. Расход - 800-1000 л/га		
		Картофель	Фитофтороз, альтернариоз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое (смыкание рядков), второе - бутонизация, третье - конец цветения, четвертое - рост ягод и клубней. Расход от 300 до 600 л/га	20 (4)	

ЮЛ

КЭ (100 г/л) «Гента» 01/01/09 КЭ (100 г/л) «Май МЮ Ко., ЛТД» 18/11/08 з, КЭ (100 г/л) «М Ко., ЛТД.» 4/02/2011*	0,125-0,15	Огурцы открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0,025 %-ным рабочим раствором. Расход рабочей жидкости 250- 400 л/га	20 (2)	7 (3)
	0,25-0,375	Огурцы защищенного грунта		Опрыскивание в период вегетации 0,025 %-ным рабочим раствором. Расход рабочей жидкости - 1000-3000 л/га	3 (3)	3 (-)
	0,2-0,4	Смородина черная	Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0,025-0,05 %-ным рабочим раствором.	20 (4)	7 (3)
	0,15-0,25	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации 0,015-0,025 %-ным рабочим раствором. Расход рабочей жидкости - 800-1000 л/га		
	0,5-1	Персик	Мучнистая роса, плодовая гниль			
	0,3-0,5	Земляника	Мучнистая роса	Опрыскивание до цветения и после сбора урожа 0,05 %-ным рабочим раствором. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	20 (2)	
	0,3-0,4	Вишня (маточники)	Коккомикоз	Опрыскивание в период вегетации 0,05% рабочим раствором. Расход рабочей жидкости - 600-1000 л/га	-(4)	
	0,2-0,4	Смородина черная (маточники)	Мучнистая роса			
	0,3-0,6	Малина (питомники)	Пурпуровая пятнистость, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации 0,05- 0,1%-ным рабочим раствором. Расход рабочей жидкости 600- 1000 л/га	-(2)	
	0,3-0,4	Яблоня	Мучнистая роса		20 (4)	
	0,75-1	Розы открытого и защищенного грунта, горшечные цветочные	Мучнистая роса, ржавчина	Опрыскивание в период вегетации 0,05- 1 %-ным рабочим раствором. Расход рабочей жидкости 1000-3000 л/га	3 (3)	3 (-)

назол КЭ (250 г/л) «Аган-Агачерес-ГД», 1/01/09 КЭ (250 г/л) «А. Ко, ЛТД» 26/12/07 КЭ (250 г/л) «А. Кемикал-ЛТД» 21/12/09 КЭ (250 г/л) «А. Туркем-Энэшнл-ЛТД» 24/09/07 КЭ (250 г/л) «А. Ал-Эженсидастриал-А. Ко» 17/03/09 КЭ (250 г/л) «А. Семсайенс-ЛТД» 15/10/09 КЭ (250 г/л) «А. Агрос-ЛТД» 01/01/09	0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина, септориоз, мучнистая роса, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации	30 (1-2)	- (3)
		Ячмень яровой и озимый	Ржавчина, мучнистая роса, сетчатая пятнистость			
		Рожь озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, септориоз, ринхоспориоз, церкоспореллез, мучнистая роса			
		Овес	Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость			
	1,5	Смородина черная (питомники, маточники)	Американская мучнистая роса, антракноз, септориоз	Опрыскивание в период вегетации 0,15 %-ным рабочим раствором	-(1)	7 (3)
	0,4-0,5		Американская мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0,05 %-ным рабочим раствором		
мин+тебуконазол+триадиминол						
фул, КЭ (250+43 г/л) «А. Куенсон-А. И групп» 25/09/08	0,6	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, гельминтоспориоз, мучнистая роса, фузариоз колоса, ломкость стеблей	Опрыскивание в период вегетации (кроме фузариоза): в фазе флагового листа и начала колошения. Против фузариоза: конец колошения, начала цветения. Расход - 300 л/га	40 (2)	- (3)
		Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина карликовая, бурая полосатая пятнистость листьев, сетчатая пятнистость, темно-бурая пятнистость, септориоз, ринхоспориоз, фузариоз колоса, ломкость стеблей			

		Рожь озимая	Ржавчина бурая, гельминтоспориоз, фузариоз колоса, ломкость стеблей, септориоз	Опрыскивание в период вегетации в стадии лигулы и раскрытия влагалища последнего листа. Расход - 300 л/га		
	0,4	Виноград	Оидиум	Опрыскивание в период вегетации: до цветения, после цветения, ягода размером с крупинку, зеленая ягода. Расход - 800-1000 л/га	40 (4)	10 (4)

медь

Оксид меди, КС (5 г/л) ООО «Агрохимпром» ГмбХ и Ко., КГ» 03/01/10	5	Яблоня	Парша	Опрыскивание в период вегетации 0,25 %-ным рабочим раствором. Расход рабочей жидкости 1000 л/га	15 (3)	3 (1)	
	25-50 г/10 л воды						
	5	Виноград	Милдью	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 400 л/га	20 (4)		
		Картофель	Фитофтороз, макроспориоз, ризоктониоз		30 (3)		
	5	Огурцы	Пероноспороз, бурая угловая пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 800-1000 л/га	20 (2)		
	25-50 г/10 л воды						
	5	Томаты	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 400-1000 л/га	20 (3)		
	7	Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороза				

зол

ал, КС (60 ОсОО остук нэшнл» 17/03/09 ВРК (60 г/л) ай МИО «Ко., ЛТД» 18/11/08 КС (60 г/л) и Компании итед» 12/08/08	0,5	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая	Опрыскивание посевов в фазе выхода в трубку и (или) начало колошения. Расход - 300 л/га	30 (1-2)	- (3)
	1		Мучнистая роса, пиренофороз, септориоз			
		Ячмень яровой и озимый	Ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, темно-бурая и полосатая пятнистости, пиренофороз, сетчатая пятнистость			
	0,5-1	Рожь	Ржавчина, мучнистая роса, ринхоспориоз, фузариоз колоса, оливковая плесень			
		Овес	Ржавчина, мучнистая роса, красно-бурая пятнистость			

зол+триадимефон

Фунгицид ВРК, КЭ (100 г/л) «Агрохимпром» Сайенс Ко., Г» 01/01/09 Фунгицид ВРК, КЭ (100 г/л) «Агрохимпром» Нонг Фу Микал Ко.,	1-1,25	Пшеница яровая и озимая	Ржавчина бурая, стеблевая, желтая, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз и др. пятнистости, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации	30 (1-2)	- (3)
	1	Ячмень яровой и озимый	Ржавчина стеблевая, карликовая, мучнистая роса, ринхоспориоз,		30 (1)	

тд" 4/05/2011 Аэро КЭ (120 г/л) «Абагрохим» 01/01/10			пиренофороз, сетчатая пятнистость			
		Рожь	Ржавчина бурая, мучнистая роса, фузариоз колоса			
		Овес	Ржавчина корончатая, мучнистая роса, красно-бурая пятнистость			
	0,3-0,5	Пшеница	Мучнистая роса, пятнистости, ржавчина			

г-метил						
н-М, СП (10 г/кг) «Сода Лтд» 01/01/09 СП (700 г/кг) «Вуд Лтд.» 122 /2011*	1-1,2	Пшеница, ячмень яровые и озимые	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	- (3)
	0,6-0,8	Свекла сахарная	Мучнистая роса, церкоспороз		20 (3)	7 (3)
	0,8-1,0	Огурцы открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0,1 %-ным рабочим раствором	7 (4)	
	1-2	Яблоня, груша	Мучнистая роса, парша, монилиоз		20 (5)	
	1	Вишня	Коккомикоз		20 (4)	
	1-1,5	Виноград	Оидиум, серая гниль		30 (5)	
	0,8-1	Смородина черная	Мучнистая роса, антракноз	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 0,1 %-ным рабочим раствором. В питомниках и маточниках без ограничений.	-(2)	
	2,9	Персик	Мучнистая роса, парша, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации 0,29 %-ным рабочим раствором	30 (1)	
	2	Слива	Дырчатая пятнистость, плодовая гниль, монилиоз	Опрыскивание в период вегетации 0,1-0,2 %-ным рабочим раствором	16 (2)	

ефон						
П (250 г/кг) «Кемикалс ЛТД» 29/12/08	0,5	Пшеница озимая и яровая	Мучнистая роса, бурая ржавчина	Опрыскивание в период вегетации	20 (2)	- (3)
	1		Ржавчина желтая, стеблевая, септориоз			
	0,5	Ячмень озимый и яровой	Мучнистая роса, ржавчина, сетчатая пятнистость		20 (1)	
и, СП (250 г/кг) «Семсайенс ЛТД» 15/10/09	0,6	Сахарная свекла	Мучнистая роса, ржавчина		20 (3)	
П (250 г/кг) / «Агрокем тори Ко., ЛТД» 18/11/08	0,5	Кукуруза	Пузырчатая головня, корневые гнили, фузариоз, плесневение початков	Опрыскивание семенных посевов в фазе выбрасывания нитей	20 (1)	
	0,06-0,12	Огурцы открытого грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0,01-0,02 %-ным рабочим раствором	20 (4)	7 (3)
	0,2-0,6	Огурцы защищенного грунта			5 (2)	5 (3)
и, СП (250 г/кг) «Достук нэшнл» 17/03/09	1-4	Томаты защищенного грунта		Опрыскивание в период вегетации 0,1 %-ным рабочим раствором	10 (2)	7 (3)
	0,3-0,4	Дыня		Опрыскивание в период вегетации 0,05	20 (3)	

н, СП (250 г/кг) и Ко., Лтд.» 4/02/2011* н, СП (250 г/кг) ал Эженс стриал Инт Со» 17/03/09 I (250 г/кг) Агрочайна шнл Трайд Лтд" 14/12/10				%-ным рабочим раствором		
	0,15-0,2	Яблоня	Мучнистая роса, парша	Опрыскивание в период вегетации 0,01 %-ным рабочим раствором	20 (6)	
	0,06-0,12	Слива, алыча	Дырчатая пятнистость, плодовая гниль, монилиальный ожог, «кармашки»	Опрыскивание в период вегетации 0,01-0,02 %-ным рабочим раствором	10 (2)	
	0,15-0,3	Виноград	Оидиум, серая гниль	Опрыскивание в период вегетации 0,01 %-ным рабочим раствором	30 (6)	
	0,35-0,4	Смородина черная	Американская мучнистая роса	Опрыскивание до цветения и после сбора урожая 0,04-0,05 %-ным рабочим раствором. В питомниках и маточниках без ограничений	-(2)	
	0,24	Земляника	Мучнистая роса, серая гниль			
	0,75	Роза защищенного грунта	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0,1-0,2 %-ным рабочим раствором	5 (1)	
	0,8-1	Роза эфиромасличная	Мучнистая роса, ржавчина, пятнистости	Опрыскивание в период вегетации 0,05 %-ным рабочим раствором	20 (2)	
	0,2	Малина	Мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации 0,015-0,02 %-ным рабочим раствором	-(2)	
	0,15-0,4	Городские зеленые насаждения	Мучнистая роса, ржавчина, парша	Опрыскивание в период вегетации 0,01 %-ным рабочим раствором	7(2)	
1,5	Сосна	Снежное и обыкновенное шютте	Опрыскивание растений в питомниках	-(1)		
ол						
КЭ (400 г/л) пон де емур ейшнз .р.л.» 06/10/09	0,05-0,075	Яблоня	Мучнистая роса, парша	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое до начала цветения. Интервал между обработками 10-12 дней	15 (2)	7 (3)
	0,05	Виноград	Оидиум			
фол						
СК (250 г/л) ян И-Тун кал Ко., тд." 6/01/2011	0,5	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз, фузариоз колоса, желтая пятнистость или пиренофороз	Опрыскивание посевов в период вегетации	40 (1-2)	- (3)
		Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина, ринхоспориоз, сетчатая			

			пятнистость, темно-бурая пятнистость			
0,1-0,15	Яблоня		Парша, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое - по зеленому конусу, второе - розовому бутону, третье и четвертое - после цветения по мелким плодам (опадение 75 % лепестков) с интервалом 10-14 дней. Расход - 1000-1200 л/га	30 (40)	7 (3)
0,1-0,125	Виноград		Оидиум	Опрыскивание посевов в период вегетации 0,06-0,08 %-ным рабочим раствором		
0,25	Свекла сахарная		Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание посевов в период вегетации	30 (1-2)	
нил+хлорокись меди						
т Р, СП (9,5 г/кг) пон де мур ейшнз р.л.» 06/10/09	2,5-3	Огурцы открытого грунта	Пероноспороз	Опрыскивание посевов в период вегетации. Первая обработка профилактическая до появления симптомов заболевания	5 (3)	7 (3)
	0,25-0,3	Огурцы защищенного грунта		Опрыскивание в период вегетации. Расход - 10 л/100 м ²	3 (4)	1 (-)
	2-2,5	Томаты открытого грунта	Фитофтороз	Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующее - с интервалом 7 дней. Расход - 600 л/га	5 (4)	7 (3)
	0,2-0,25	Томаты защищенного грунта		Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, в стадии 4-6 настоящих листьев или не позднее двух суток после инфицирования растений, последующее - с интервалом 7 дней. Расход - 10 л/100 м ²	3 (4)	4 (3)
	2-2,5	Картофель		Опрыскивание в период вегетации: первое - профилактическое, второе - до смыкания рядков в период начала цветения, последующее - с интервалом 7-10 дней	15 (4)	7 (3)

назол

00 SC, СК 0 г/л) гента» 3/01/09	0,1	Пшеница яровая и озимая	Эпифитотия ржавчин бурой, желтой, стеблевой	Опрыскивание в период вегетации	30 (1)	- (3)
	0,15-0,2		Мучнистая роса, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость, церкоспореллез, фузариоз колоса			
	0,2-0,25	Ячмень яровой и озимый	Мучнистая роса, ржавчина, ринхоспориоз, гельминтоспориозная и сетчатая пятнистости			
	0,15-0,2	Рожь	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ринхоспориоз, гельминтоспориозная пятнистость			
		Сахарная свекла	Церкоспороз, мучнистая роса, ржавчина,		20 (2)	10 (3)
	0,1	Горох	Ржавчина, мучнистая роса	Опрыскивание при появлении единичных пустул ржавчины или пятен мучнистой росы. При раннем развитии заболевания (фаза бутонизации) необходимы две обработки: первая - при появлении единичных пятен, вторая - через 7 дней после первой обработки		

оназол+тиофонат-метил

Дуо, КС 310 г/л) СФ СЕ» 21/12/09	0,4-0,6	Пшеница яровая и озимая	Мучнистая роса, ржавчина (бурая, стеблевая), желтая пятнистость, комплекс пятнистостей колоса (септориоз, темно-бурый, гельминтоспориоз и др.)	Опрыскивание растений в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 300 л/га	30 (-)	- (3)
		Яровой ячмень	Мучнистая роса, ржавчина (карликовая, стеблевая), сетчатая пятнистость, ринхоспориоз, комплекс пятнистостей колоса (септориоз, гельминтоспориоз, ринхоспориоз и др.)			
	0,6	Свекла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, рамуляриоз	Опрыскивание растений в период вегетации для профилактики или при появлении первых признаков одного из заболеваний, по мере необходимости с	28 (1-2)	
	0,4-0,6	Горох	Аскохитоз, ржавчина, мучнистая роса			

				интервалом 14-16 дней. Расход рабочей жидкости - 200-400 л/га		
--	--	--	--	--	--	--

ВИТЕЛИ СЕМЯН

1	2	3	4	5	6	7
к, СП (500 кг). «Достук нэшнл» 08/12/10 Т (500 г/кг) / Агрокем тори Ко, ГД» 18/11/08	2-3	Пшеница яровая и озимая	Пыльная и твердая головня, церкоспореллезная и фузариозная корневая гниль	Протравление семян. Расход - 10 л/т	- (1)	- (-)
	2	Рис	Пирикулярриоз, фузариозная корневая гниль	Протравление семян. Расход - 5-8 л/т		
	2-3	Ячмень яровой и озимый	Пыльная, каменная и черная головня, фузариозная корневая гниль	Протравление семян. Расход - 10 л/т		
		Овес	Пыльная, покрытая головня, фузариозная корневая гниль			
	3	Соя	Аскохитоз, фузариоз, антракноз, серая гниль, плесневение семян	Протравление семян. Расход - 5-10 л/т с добавкой 0,2 кг нитрагина на одну гектарную норму семян		
	5-6	Томаты	Фузариозное увядание	Протравление семян за 1-15 суток до посева. Расход - 5-10 л/т		
		Капуста	Серая гниль, сосудистый бактериоз	Погружение кочерыг перед закладкой на хранение или во второй половине хранения в смесь: 1,5 % Фундазола + 5 % метилцеллюлозы + 16 % мела + 77,5 % воды (в объемных процентах)		
	0,5			Серая гниль		
	5-6	Чеснок	Белая гниль донца, плесневение	Погружение зубков в 3 %-ный рабочий раствор за 1-3 суток до посадки		
	2	Морковь	Фомоз, белая и сухая гнили	Погружение в 5 %-ный рабочий раствор перед закладкой на хранение		
	1,5-3 г/м ²	Табак	Черная корневая гниль	Полив почвы в парниках 0,25 %-ным рабочим раствором после посева семян и при появлении первых признаков болезни	- (2)	10 (-)
	5	Яблоня	Фузариозная корневая гниль	Протравление кондиционных семян перед стратификацией.	- (1)	-(-)

				Расход - 5-10 л/т.		
	3	Подсолнечник	Белая гниль	Протравление семян за 15-20 дней до посева. Расход - 15 л/т		
ол						
н, СП (700 /кг) ке Агро ни ЛТД» 01/01/09	6	Свекла сахарная	Корнед всходов	Протравливание семян (15 л воды на 1 т семян)	- (1)	- (-
азол-М						
ЛО (20 г/л) мо Кемикал Юроп» 01/12/09	1-1,5	Пшеница яровая и озимая	Пыльная, твердая, карликовая головня, фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (10 литров воды на 1 т семян)	- (1)	- (-
	1-1,5	Ячмень яровой и озимый	Пыльная, каменная головня, корневые гнили, плесневение семян, «черный зародыш»			
оназол						
д, КС (30 /л) гента» 01/01/09 С (30 г/л) агрос икалс» 01/01/09	2	Пшеница яровая и озимая	Пыльная, твердая и карликовая головня, плесневение семян, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян непосредственно перед посевом или заблаговременно до посева (до одного года). 8-10 л воды на 1 т семян	- (1)	- (-
	3	Ячмень яровой	Каменная, пыльная головня, корневые гнили, плесневение семян			
		2	Кукуруза	Пыльная и пузырчатая головня, плесневение семян	Протравливание семян суспензией препарата (5-10 л воды на 1 т семян)	
оназол-ципроконазол						
нд Стар, 0+6,3 г/л) гента» 01/01/09 вол, КС (6,3 г/л) ай МИО кал, Ко ГД» 18/11/08	1 0,75	Пшеница яровая	Пыльная головня	Протравление семян перед посевом или заблаговременно (до одного года) расход - 10 л/т	- (1)	- (-
			Твердая, пыльная головня, гельментоспориозная, фузариозная корневые гнили, септориоз, плесневение семян			
	1	Пшеница озимая	Пыльная и твердая головня, септериоз, гельментоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян			
	1,5	Ячмень яровой	Пыльная, черная (ложная) головня			
	1		Каменная головня, полосатая, сетчатая пятнистости, плесневение семян, мучнистая роса			
	1-1,5	Ячмень озимый	Пыльная, каменная, черная (ложная) головня. полосатая.			

			сетчатая, пятнистости, гельментоспориозная, фузариозная корневые гнили, плесневение семян, мучнистая роса			
1	Овес		Пыльная, покрытая головня, красно-бурая пятнистости, плесневение семян,			
0,75			Гельментоспориозная корневая гниль			
1	Рожь озимая		Фузариозная, гельментоспориозная корневые гнили, спорынья, фузариозная снежная плесень, стеблевая головня			
0,2-0,3	Картофель (семенной)		Сухая (фузариозная) гниль, ризоктониоз	Обработка клубней перед посадкой. Расход - 3-5 л/т.		

ЗИМ

го Супер КС (200 /л) «Семи Кфт» 01/01/09	1,5-2	Пшеница яровая и озимая	Корневые и прикорневые гнили, церкоспореллез, снежная плесень, головня пыльная и твердая	Протравливание семян (10 л воды на 1 т семян)	- (1)	- (-)
		Ячмень яровой и озимый	Корневые и прикорневые гнили, церкоспореллез, снежная плесень, головня каменная и пыльная			
		Рожь озимая	Фузариозная корневая гниль, снежная плесень, стеблевая головня			
	0,2-0,3	Картофель (семенной)	Сухая гниль (фузариозная), ризоктониоз	Обработка клубней перед посадкой. Расход - 3-5 л/т		
КС (500 /л) «Агровит» 24/12/09	1-1,5	Пшеница, ячмень яровые и озимые	Пыльная, твердая (каменная) головня, церкоспореллезная, фузариозная корневые гнили, снежная плесень	Протравливание семян (10 л воды на 1 т семян)	- (1)	- (-)
		Рожь озимая	Фузариозная корневая гниль, снежная плесень, стеблевая головня			
		Просо	Фузариозная корневая гниль, головня			

ран

ан, ТПС 0 г/л) «Европа В» 01/01/09	25-30	Свекла сахарная	Комплекс почвообитающих и наземных вредителей	Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно, но не ранее, чем за 6 месяцев до посева (для фракции 4,5-5,5 мм и для дражированных)	- (1)	- (-)
	30-35			Обработка семян на		

				семенных заводах перед посевом или заблаговременно, но не ранее, чем за 6 месяцев до посева (для фракции 3,4 - 4,5 мм и для дражированных)		
	30	Свекла кормовая		Обработка семян на семенных заводах перед посевом или заблаговременно, но не ранее, чем за 6 месяцев до посева.		
	15	Рапс, капуста	Блошки	Обработка семян на специальной установке перед посевом.		

ин+тирам						
сил, КС (192,5 г/л) «Алсико- пром» 11/01/10 и, КЭ (200+ 0 г/л) «Жуочуанг ЛТД» 21/10/09	2,5-3	Пшеница яровая и озимая	Пыльная и твердая головня, фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход - 10 л/т	- (1)	- (-)
	2-3	Хлебные злаки	Пыльная, черная, каменная и твердая головни, корневые гнили (фузариозные и гельминтоспориозные), плесневение семян			
	2-2,5	Кукуруза	Пыльная, пузырчатая головня, плесневение семян, корневые и стеблевые гнили	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход - 5 л/т		
	4	Просо	Головня метелки	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход - 10-15 л/т		
	5	Хлопчатник	Корневые гнили, гоммоз, фузариозное увядание всходов (фузариозный вилт)	Протравливание семян суспензией препарата (25-30 л воды на 1 т опущенных и 15-20 л воды на механически оголенных семян)		
акс 200 , ВСК (170 г/л) «Европ ЛТД» 01/12/09	2-2,5	Пшеница яровая и озимая	Корневые гнили, пыльная и твердая головня, плесневение семян	Протравление семян суспензией препарата (10 л воды на 1 т. семян)	- (-)	- (-)
	2,5	Яровой ячмень	Корневые гнили, пыльная, каменная и черная головня, плесневение семян			
	2-2,5	Яровой ячмень (товарные посевы)				
	3-5	Кукуруза	Пыльная, пузырчатая головня, плесневение семян, корневые и стеблевые гнили			
	2,5-3	Просо	Головневые заболевания			
	2-3	Овес				
	4	Хлопчатник	Корневые гнили, гоммоз	Протравление семян суспензией препарата (16 л воды на 1 т		

				семян)		
ЗОЛ						
БРК (60 /л) р Кроп с А Г» 01/01/09	0,4-0,5	Пшеница яровая	Пыльная и твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз	Протравливание семян суспензией препарата. Расход - 10 л/т	- (1)	- (-
лт, КС (60 /л) Агровит» 24/12/09	0,4	Пшеница озимая	Пыльная и твердая головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили			
	0,4-0,5		Плесневение семян, септориоз			
КС (60 г/л) р Кемикал ЛТД» 21/12/09	0,4	Ячмень яровой	Каменная головня			
	0,5		Пыльная, пыльная ложная головня			
	0,4-0,5		Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян			
б, КС (60 /л) Семсайенс ЛТД» 15/10/09		Рожь озимая	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили			
р, КС (60 /л) агрос икалс» 01/01/09		Овес	Пыльная и покрытая головня, красно-бурая пятнистость			
	0,5	Лен-долгунец	Антракноз, крапчатость			
		Просо	Головня метелок	Протравливание семян суспензией препарата. Расход - 10 л/т		
лт, КС. (60 /л) «АсТеРо упп» 01/01/09						
КС (60 г/л) Куенсон ри групп» 22/08/07						
КС (60 г/л) ай МИО Ко., ЛТД» 18/11/08						
н, ВРК (60 /л) г Зуочуанг Ко., ЛТД» 26/07/07						
СК (60 г/л) м Компани итед» 26/03/07						
МЭ (60 г/л) Целково охим»						

21/12/09 ил, КЭ (60 /л) вуд Лтд.» 4/03/2011*									
КС (60 г/л) Рамсайдс ПВТ Лтд.» 08/12/10									
ВСК (60 /л) Фирма густ» 21/12/09									
КЭ (60 г/л) Гмбх и Ко., Г.» 5/04/2011									
бу, ВРК (60 /л) квим Ко., ГД» 01/01/09									
Ультра, КС (60 г/л) су Агрохем тори Ко, ГД» 22/07/08 КС (120 г/л) Агрочайна шнл Трайд , Лтд" 14/12/10	0,2-0,25	Пшеница яровая и озимая	Пыльная и твердая головни, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, фузариозная снежная плесень, септориоз, плесневение семян	Протравливание семян перед посевом. Расход рабочей жидкости - 10 л/т	- (1)	- (-			
		Ячмень яровой и озимый	Каменная (твердая), пыльная и пыльная ложная головни, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, сетчатая пятнистость, плесневение семян						
		Рожь озимая	Стеблевая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, снежная плесень						
		Овес	Пыльная и покрытая головни, красно-бурая пятнистость, плесневение семян						
	0,25	Просо	Головня метелок						
		Лен-долгунец	Антракноз, крапчатость						
	зол + флутриафол								
КС (25+25 /л) «багрохим» 1/01/2010	1,5	Пшеница яровая	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз	Протравление семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход - 10 л/т	- (1)	- (-			

			Пыльная головня			
2	Пшеница яровая (семенные посевы)					
1,5	Пшеница озимая		Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз, мучнистая роса, бурая ржавчина			
1,5-2	Ячмень яровой и озимый		Каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, септориоз, мучнистая роса, бурая ржавчина, гельминтоспориозы в т.ч. темно-бурая и полосатая пятнистости			
2			Пыльная головня			

назол

с, КС (25 /л) Ф Агро В.» 21/12/09 КС (25 г/л) Агровит» 24/12/09	1,2-1,6	Пшеница яровая и озимая	Твердая и пыльная головни, гельминтоспориозная, фузариозная и офиоболезная корневые гнили, плесневение семян, септориоз, церкоспореллезная гниль корневой шейки	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно до посева (до 1 года). На каждый литр препарата добавлять 3-4 литра воды.	- (1)	- (-
	1,5-2	Ячмень яровой и озимый	Пыльная и каменная головня, гельментоспориозные, фузариозные корневые гнили, септориоз, плесневение семян, сетчатая пятнистость			
		Рожь озимая	Гельментоспориозные, фузариозные корневые гнили, стеблевая головня, снежная плесень, бурая ржавчина, ринхоспориоз, плесневение семян, мучнистая роса, спорынья			
		Овес	Пыльная и покрытая головня, корневые гнили, красно-бурая пятнистость			
	2	Кукуруза	Пузырчатая головня, пыльная головня соцветий, корневые и стеблевые гнили, плесневение семян			
	1,5-2	Просо	Головня метелок			

фол

г Экстра,	0,5-0,75	Пшеница яровая и озимая	Пыльная, твердая головня, корневые	Протравливание семян заблаговременно или	- (1)	- (-
-----------	----------	----------------------------	---------------------------------------	---	-------	------

50 г/л) кова А/С» 01/01/09			гнили, септориоз, плесневение семян, мучнистая роса	перед посевом (до 10 л воды на 1 т семян)		
	0,8-0,9	Ячмень яровой и озимый	Пыльная и каменная головня, корневые гнили, плесневение семян, сетчатая пятнистость			

карб						
т, МКС 0 г/л) гента» 01/01/09	25	Кукуруза	Проволочники	Инкрустация семян перед посевом на специальной установке	- (-)	- (-)
	35	Свекла сахарная	Вредители всходов			
	30	Подсолнечник	Проволочники, трипсы			
	3	Пшеница озимая	Хлебная жужелица			
	25	Рапс	Крестоцветные блошки			

ИДЫ

1	2	3	4	5	6	7
тилгексировый эфир)						
Э (500 г/л кислоты) г Зуочуанг Ко., ЛТД» 26/07/07	0,6-0,9	Пшеница озимая, рожь	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры	60 (1)	- (3)
	0,6-0,8	Пшеница яровая, ячмень		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры		
	0,6-0,7	Овес, просо, сорго		Опрыскивание посевов в фазе кущения - выхода в трубку овса и проса, 3-5 листьев сорго		
	0,6-0,9	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры		
	0,6-1	Тимофеевка луговая, райграс высокий, овсяница луговая		Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до выхода в трубку	- (1)	
	0,4-0,8	Ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой		Опрыскивание посевов в фазе кущения		
	2-3	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых культур	Однолетние и многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период	- (1)	- (4)
	2-2,5	Пары		Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их массового появления		

метиламинная соль)						
ВРК (500 2,4-Д лоты) м Гмбх и , КГ» 03/01/10	1,2-2	Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, рожь	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Обработку озимых проводить весной	- (1)	- (3)
	1,2-1,6	Просо		Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры		
		Сорго		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры		
	1,5-2	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры		20 (

Р (600 г/л кислоты) ом Кроп о Лтд» 01/01/09	1-1,6	Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, рожь	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку	- (1)	- (4)
	1-1,3	Пшеница яровая и озимая		Опрыскивание посевов способом УМО в фазе кущения культуры до выхода в трубку		
		Просо		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку		
		Сорго		Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры		
Р (600 г/л кислоты) м Компани итед» 26/03/07	1-1,6	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры		20 (
ур Ф, ВР 0 г/л) м ГмбХ и , КГ» 03/01/10	1-1,3	Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, рожь	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Обработку озимых проводить весной		- (4)
		Просо		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку.		20 (
		Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры		
	2,6-4,6	Литсвенные и лиственно-хвойные древостои	Лиственные древесные породы (осина, береза и др.)	Инъекция в стволы нежелательных пород в июне-августе, 1-2 раза в период выращивания		- (-)
8ДМА-6), г/л 2,4-Д лоты) у Агро нсес» 01/01/09	0,85-1,4	Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, рожь	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Обработку озимых проводить весной	- (1)	- (3)
	0,85-1,1	Пшеница яровая и озимая		Опрыскивание посевов способом УМО в фазе кущения культуры до выхода в трубку		
		Просо		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку.		20 (
	0,85-1,4	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры		- (3)
	0,85-1,1	Гречиха		Опрыскивание посевов за 2-3 дня до всходов культуры		- (-)
		Клевер ползучий		Опрыскивание растений в год посева культуры после появления 1-го тройчатого листа		
	0,4-1,7	Многолетние злаковые		Опрыскивание		

		травы		растений в фазе 2-3 листьев - кушения культуры до выхода в трубку		
онарт, ВР /л 2,4-Д лоты) о Кемикал ЛТД» 1 21/12/09 мон, ВК /л 2,4-Д лоты) м ГмбХ и , КГ» 03/01/10 Р (720 г/л кислоты) м Компани питед» 12/08/08	1-1,5	Зерновые озимые (пшеница, ячмень, овес, рожь)	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов рано весной в фазе кушения культуры до выхода в трубку	- (1)	- (3)
	0,7-1	Зерновые яровые (пшеница, ячмень, овес, рожь)				
		Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	20 (3)	
	0,7-1,2	Сорго		Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры	- (1)	
	0,6-0,8	Клевер ползучий		Опрыскивание посевов в год посева культуры после появления 1-го тройчатого листа		
	1-1,5	Злаковые травы		Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры		
кстра, ВР /л 2,4-Д лоты) ай МИО Ко., ЛТД» 24/08/09 ВР. (720 г/л кислоты) рокеимкал Лтд» 08/12/09 -Д, ВР (720 [кислоты) квим Ко., ТД» 01/01/09	1-1,2	Зерновые озимые (пшеница, ячмень, овес)	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры	- (1)	- (3)
	0,8-1	Зерновые яровые (пшеница, ячмень, овес)				
	1-1,2	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	20 (3)	
	0,7-1,2	Сорго		Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры	- (1)	
Р. (850 г/л кислоты) нг Чаочанг Ко., ЛТД» 24/08/09	0,6-0,8	Пшеница озимая. Пшеница, ячмень яровая	Однолетние и многолетние двудольные. Амброзия полыннолистная и все виды полыни, бобовые, вьюнок виды, горчица все виды, горец виды, все виды осотов, гречишка татарская и ряд других сорняков	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры	- (1)	- (4)
жный 2-этилгексилловый эфир)						
КЭ (564 г/л кислоты) Семсайенс ЛТД» 15/11/09	0,6-0,8	Пшеница, ячмень яровые	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	60 (1)	- (3)
	0,8-1	Пшеница озимая		Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры до выхода в		

				трубку весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га		
	0,8-1,2	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га		
	0,6-0,8	Просо		Опрыскивание посевов в фазе кущения до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га		
ир, КЭ (905 (кислоты) м ГмбХ и , КГ» 14/04/11	0,5-0,7	Пшеница и ячмень яровые и озимые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кущения до выхода в трубку	- (1)	- (4)
	0,6-0,7	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры		
полетучие эфиры C ₇ -C ₉)						
н экстра, г/л 2,4-Д (поты) НИТИГ» 01/01/09	0,6-0,9	Пшеница озимая, рожь	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов рано весной в фазе кущения культуры	- (1)	- (4)
	0,6-0,8	Пшеница яровая, ячмень		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры		
	0,6-0,7	Овес, просо, сорго		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры		
	0,6-0,9	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев до выхода в трубку		
	0,6-1	Тимофеевка луговая, райграс высокий, овсяница луговая		Опрыскивание посевов в фазе кущения		
	0,4-0,8	Ежа сборная, кострец безостый, лисохвост луговой				
	2-3	Поля, предназначенные под посев яровых зерновых культур	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период		
	2-2,5	Пары		Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их массового появления		
камба (диметиламинные соли)						
ер, ВР (344 (к-ты+120 мбы к-ты) ай МИО Ко., ЛТД» 18/11/08	0,6-0,8	Пшеница озимая, рожь	Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов рано весной, в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га	60 (1)	- (4)
	0,5-0,7	Пшеница яровая, ячмень, овес, просо		Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га		
	1-1,5	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га		
ер, ВР (344 г/л +120 г/л бы к-ты) м Компани итед» 26/03/07						
супер, ВР 1 2,4-Д к-						

л дикамбы ты) м Компани питед» 12/08/08						
ВР (344 г/л г+120 г/л бы к-ты) Куенсон и групп» 22/08/07						
супер, ВК и 2,4-Д к- л дикамбы ты) «Достук нэшнл» 17/03/09						
н супер, ВР и 2,4-Д к- л дикамбы ты) ал Эженси стриал Инт. Со» 17/03/09						
супер, ВР 0 г/л) гента» 01/01/09	0,5-0,7	Пшеница и ячмень яровые	Однолетние и многолетние двудольные	Опрыскивание в фазе кущения культуры	- (1)	- (3)
	1,25-1,5	Кукуруза		Опрыскивание в фазе 3-5 листьев культуры		20 (
жний 2-этилгексильный эфир) + метсульфурон метил						
мет Дуэт, 564 г/л 2,4- + 600 г/кг) о Групп» 01/01/09	0,4-0,5 л/га Эланта + 4-5 г/га Террамета	Пшеница озимая и яровая, овес, рожь, ячмень	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (бодяк, осот, вьюнок) в т.ч. устойчивые к 2,4Д)	Опрыскивание посевов весной в фазе от начала и до конца кушения культуры, в ранние фазы роста сорняков. Применять на почвах с РН не выше 7,5. При необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу.	- (1)	- (-
тилгексильный эфир) + триасульфурон						
КЭ+ВДГ 2,4-Д к-ты 0 г/кг) абагрохим» 06/10/10	0,4-0,5 л/га Эланта, КЭ + 4-5 г/га Дуката, ВДГ	Пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь, овес	Однолетние и некоторые многолетние двудольные (бодяк, осот, вьюнок), в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов весной в фазе от начала и до конца кушения культуры, в ранние фазы роста сорняков. Применять на почвах с РН не выше 7,5. При необходимости пересева высевать только озимую и яровую пшеницу.	- (1)	- (-
тил-гексильный эфир)						
КЭ (564 г/л кислоты) абагрохим» 06/10/06	0,6-0,8	Пшеница яровая, ячмень	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и в ранние фазы роста сорняков	- (1)	- (7)

	0,8-1,0	Пшеница озимая		Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры весной		
	0,8-1,2	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков		

жный 2-этилгексиловый эфир)

КЭ (600 г/л кислоты) «Сайенсес» 12/12/09	0,4-0,6	Пшеница яровая, озимая, ячмень	Однолетние двудольные	Опрыскивание в фазе кушения до выхода в трубку	- (1)	- (7)
	0,6-0,8		Многолетние двудольные			
	0,7-1,0	Кукуруза		Опрыскивание при высоте растений более 20 см, но не позднее фазы 5 листьев культуры		

фрон

р, ВДГ (500 г/кг) «Интернэшнл Шинз Сарл» 29/03/07	20-30 г/га+Тренд 90 200 мл/га	Рис	Осоковые, в т.ч. клубнекамыш, однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3 листьев - кушение культуры и в фазу ежовников 3 листа - кушение, осоковых 2 листа - начало кушения, двудольных от семядолей до начала стеблевания.	- (1)	
е, ВДГ (500 г/кг) Куенсон и групп» 22/08/07						
р, ВДГ (500 г/кг) нг Нонг Фу икал Ко., Итд 4/05/2011						

н, ВР (480 г/л) Ф СЕ» 21/12/09	2-4	Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес, просо	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов весной в фазе кушения культуры	- (1)	- (3)
	2	Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом люцерны		Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кушения зерновых)		
ан, ВРК 0 г/л) «Достук нэшнл» 17/03/09	2-4	Рис	Осоковые, в т.ч. клубнекамыш, и однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев до кушения культуры		- (-)
		Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры		7 (3)
, ВР (480 г/л) Агрокем тори Ко., дт." 6/01/2011	3	Горох на зерно	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев к-ры		- (3)
		Горох овощной		Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев к-ры		
	1,5-3	Соя	Однолетние двудольные, в т.ч. дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 листьев культуры		- (-)
	2	Люцерна 1-го года вегетации	Однолетние двудольные	Опрыскивание семенных посевов в фазе 1-2 настоящих		

				листьев культуры		
	1,5-2	Люцерна (старовозрастные семенные посевы)		Опрыскивание посевов в фазе стеблевания культуры при высоте растений 10-15 см		
+МЦПА (калиево-натриевая соль)						
ан М, ВР 0 г/л зона к- 20 г/л А к-ты) Ф СЕ» 21/12/09	2-3	Пшеница яровая и озимая, ячмень, рожь, овес, просо	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры	- (1)	- (3)
		Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом клевера		Опрыскивание посевов после развития 1-го тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых)		
		Рис	Осоковые, в т.ч. клубнекамыш, и однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2 листьев - кущения культуры и 5- 7 листьев сорняка		- (-)
бак натрия						
СК (400 /л) нжен ОСТ рпрайз мент Ко., ГД» 30/03/11	0,075-0,09	Рис	Однолетние злаковые и осоковые, в т.ч. клубнекамыш, некоторые широколистные (монохория, частуха, стрелолист и др.) сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев однолетних злаковых сорняков и 5-6 листьев у клубнекамыша в баковой смеси с 0,075- 0,09 л/га А-100. Расход рабочей жидкости - 300-400 л/га, при авиационной обработке - 100 л/га	- (1)	- (-)
нил						
рил, СК 5 г/л) Кемикал акчерес гд» 01/01/09	1-1,5	Озимая и яровая пшеница, ячмень, просо	Однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов с начала кущения зерновых и ранние фазы роста (2-4 листа) сорняков	- (1)	- (3)
		Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	60 (1)	
д, РП (200 кг) и ГМБХ и КГ» 03/11/09	1	Лук	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание после всходов культуры	- (1)	
нил + 2,4-Д						
ил-Д, КЭ. 225 г/л) р Кроп енес» 01/01/09	1,25-1,5	Пшеница яровая, ячмень, просо	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры при ранних фазах роста сорняков	- (1)	3 (-)
	1,5-1,75	Пшеница озимая				
	2	Пшеница и ячмень яровые	Горчак розовый			
	1,25-1,5	Кукуруза	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры		7 (3)
доп - П - метил						
Супер, КЭ 4 г/л) ай МИО Ко., ЛТД» 18/11/08	0,5	Свекла сахарная и кормовая, соя, подсолнечник, лен- долгунец	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков, независимо от фазы развития культуры	- (1)	7 (3)
	1	свекла (сахарная и	Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов		

Супер, КЭ (4 г/л) Агрочайна шнл Трайд Лтд" 14/12/10 Э (104 г/л) и Ко, ЛТД» 26/12/07 -Супер, КЭ (4 г/л) м Компани итед» 26/03/07 с, КЭ (104 г/л) м Компани итед» 12/08/08		кормовая)	(пырей ползучий, гумай, свинорой)	по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения, независимо от фазы развития культуры		
	0,5	Рапс	Однолетние злаковые	Опрыскивание в фазе 2-3 листьев сорных растений, независимо от фазы развития культуры		
	1		Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте 10-15 см пырея ползучего, независимо от фазы развития культуры		
	0,5-1	Посевы и посадки сосны и ели	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов и посадок в период активного роста сорняков		
Супер, КЭ (4 г/л) о Саенсес» 09/01/09 ер, КЭ (104 г/л) «Достук нэшнл» 17/03/09	0,5	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, фасоль, рапс	Однолетние (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 до кущения)	- (1)	7 (3)
	1	Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, фасоль, рапс	Многолетние злаковые (пырей ползучий, свинорой, гумай)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см		
	0,5	Картофель, овощи	Однолетние (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 до кущения)		
	1	Картофель, овощи	Многолетние злаковые (пырей ползучий, свинорой, гумай)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см		
	0,5	Хлопчатник	Однолетние (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 до кущения)		
	1	Хлопчатник	Многолетние злаковые (пырей ползучий, свинорой, гумай)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см		
К (калийная соль)						
Фортэ, ВР (0 г/л) гента» 01/01/09 орте, (500 г/л) Агрочайна шнл Трайд Лтд» 14/12/10	1,5-3,5	Объекты города (аила) - парки, скверы, бульвары, железнодорожные пути и др. объекты	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности	- (1)	7 (3)
	1,5-3	Плодовые, виноградники	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)		
	3-4		Многолетние злаковые и двудольные			
	1,5-3	Пары и земли несельскохозяйственного пользования	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста		
		Поля, предназначенные под посев яровых культур	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков осенью в послеуборочный период		
	3-4		Многолетние злаковые и двудольные			
	1,5-3	Зерновые	Однолетние и	Опрыскивание посевов		

			многолетние злаковые и двудольные	за 2 недели до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		
60 мл/10 л воды	Поля, предназначенные под посев и посадку цветочных декоративных растений		Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Осеннее опрыскивание вегетирующих однолетних и многолетних сорняков под посадки следующего года, Расход - 3 л/100 м ²		
90 мл/10 л воды			Многолетние злаковые и двудольные			
	Участки, предназначенные под газоны		Опрыскивание вегетирующих однолетних и многолетних сорняков за 20-30 дней до посева газонных трав. Расход - 3 л/100 м ²			

(изопропиламинная соль)

ор, ВР (360 г/л) «Саенсес» 01/01/09	2-4	Плодовые, цитрусовые, виноградники	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)	- (1)	7 (3)
	4-8	Плодовые, цитрусовые	Многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры)	- (2)	
ВР (360 г/л) «Агровит» 1 24/12/09	4	Виноградники		Опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры)		
о, ВР (360 г/л) «Грейд» 01/01/09	5,2	Чай (питомники и многолетние насаждения)	Многолетние корневищные, однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков с повторной обработкой через 50 дней		
ВР (360 г/л) «ХХI» 01/01/09	3	Зерновые культуры	Однолетние и многолетние	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	- (1)	- (-)
оган, ВР (360 г/л) «Кемикал» 01/01/09	2-5	Сахарная свекла, кукуруза	Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева		
	2-3	Картофель		Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до появления всходов культуры		
Р, ВР (360 г/л) «АсТеРО» 01/01/09		Соя, подсолнечник, капуста	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры		
ВР (360 г/л) «Агрохем» 01/01/09		Соя		Опрыскивание посевов за 15 дней до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания		

ВР (360 г/л) ГмбХ Ко., Г» 4/04/2011			культурных и сорных растений		
		Лен-долгунец	Опрыскивание посевов за 28 дней до уборки для подсушивания культурных и сорных растений		
ВР (360 г/л) р Кемикал ЛТД» 1 21/12/09	2-4		Опрыскивание почвы весной за 2-5 дней до посева по вегетирующим сорнякам		
	3	Поля, предназначенные под посев льна-долгунца	Пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью по стерне предшествующей культуры	
	0,1	Арбуз, томаты рассадные и безрассадные	Заразиха	Опрыскивание посевов (посадок) в период образования на корнях культурных растений присосок заразихи с интервалом в 10 дней	- (4)
	2-4	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период	- (1)
	4-6		Многолетние злаковые и двудольные		
	6-8		Злостные многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.)		
	2-4	Пары	Однолетние и многолетние	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста	
	4-6		Многолетние злаковые и двудольные		
	6-8		Вьюнок полевой, бодяк полевой		
	4-8	Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав	Многолетние, однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав	
	0,6-0,8	Люцерна	Повилика тонкостебельная	Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса	
	0,3	Клевер (семенники)	Повилика	Опрыскивание в фазу начала ветвления повилики (двукратно, через месяц)	- (2)
	0,4			Опрыскивание в фазу начала ветвления повилики	- (1)
	8	Дренажные каналы и их обочины	Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные	Опрыскивания каналов и затопления их водой	- (-)
	8-10	Открытая коллекторно-дренажная и оросительная сеть	Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в период	

		(тростник, рогоз и др.)	интенсивного оттока питательных веществ в корневую систему (июль-сентябрь)		
3-5			Повторное опрыскивание на следующий год		
5-6	Мята перечная	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период		7 (3)
	Лаванда		Опрыскивание вегетирующих сорняков после уборки предшественника (при закладке новых плантаций)		
3	Облепиха, шиповник неплодоносящие со 2-го года вегетации		Опрыскивание плантаций по вегетирующим сорнякам весной или летом		
4-5	Облепиха, шиповник плодоносящие				
3	Паровые поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур		Опрыскивание сорняков в период их активного роста	- (2)	- (-)
5	Поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур		Опрыскивание сорняков в послеуборочный период	- (1)	
3-8	Паровые поля лесопитомников	Все виды нежелательных травянистых сорняков, лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.)	Опрыскивание вегетирующих сорняков в июне-августе		7 (3)
	Посевы и посадки ели, сосны в лесных питомниках		Опрыскивание вегетирующих сорняков после окончания роста сеянцев и саженцев		
	Лесокультурные площади		Опрыскивание сорной и нежелательной растительности в июне-августе при подготовке площадей под лесные культуры		
	Кедр, ель, сосна		Опрыскивание сорной нежелательной растительности после окончания роста хвойных пород		
	Лиственные молодняки	Лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.)	Опрыскивание нежелательной растительности в июне-августе при реконструкции малоценных молодняков		
	Хвойно-лиственные молодняки		Опрыскивание нежелательной растительности после окончания роста		

			хвойных пород при уходе за составом смешанных молодняков		
	Сенокосы и пастбища		Опрыскивание нежелательной растительности в июне-августе при окультуривании сенокосов и пастбищ		
0,2-0,4 г д.в./дерево	Лиственные, лиственно-хвойные молодняки и средневозрастные древостои		Инъекция в стволы деревьев нежелательных пород в июне-августе при регулировании состава и густоты древостоев или их реконструкции		- (-)
1,5-3 г д.в./дерево	Смешанные приспевающие и спелые древостои	Осина	Инъекция в стволы деревьев в период вегетации для предотвращения порослеобразования и содействия естественному возобновлению ценных пород (в спелых древостоях проводится перед сплошной рубкой главного пользования)		
3-8	Земли несельскохозяйственного пользования (охранные зоны линий электропередач и	Все виды сорняков и лиственные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, ива и др.)	Опрыскивание вегетирующих растений в мае-сентябре		
3-6	просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)	Многолетние, однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков		7 (3)
2-5	Объекты города (села): парки, скверы, бульвары, железнодорожные пути, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и др. объекты	Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность	Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности		
Р (360 г/л) «Багροхим» 06/10/10	2-4	Плодовые, citrusовые, виноградники	Однолетние и злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)	- (1)
	4-8	Плодовые, citrusовые	Многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в мае-июле (при условии защиты культуры)	- (2)
	4	Виноградники			
	2-5	Свекла сахарная, кукуруза	Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2 недели до посева	- (1)
	3	Зерновые культуры	Опрыскивание посевов		- (-)

	однолетние и многолетние	за 2 недели до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков		
2-3	Картофель	Однолетние и многолетние, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры	
2-3	Соя, подсолнечник, капуста	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание вегетирующих сорняков за 2-5 дней до посева (посадки) культуры	
2-8	Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые). А также однолетние цветочных (семенные посевы)	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период	
		Многолетние злаковые и двудольные		
		Злостные многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.)		
2-8	Пары многолетних злаковых трав	Однолетние и многолетние	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	
		Многолетние злаковые и двудольные		
		Вьюнок полевой, бодяк полевой		
4-8	Поля, предназначенные под семенные посевы многолетних злаковых трав	Многолетние, однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период или весной за 2-4 недели до посева трав	
0,6-0,8	Люцерна	Повилика стонкостебельная	Опрыскивание посевов через 7-10 дней после укоса	
3	Паровые поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	- (2)
5	Поля, предназначенные посевов и посадку лекарственных культур		Опрыскивание сорняков в послеуборочный период	- (1)
3-6	Земли несельскохозяйственного пользования (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков	7 (3)
2-5	Объект города (села):		Опрыскивание	

		парки, скверы, бульвары, трамвайные и железнодорожные пути, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и другие объекты		вегетирующих сорняков и нежелательной растительности.		
	3	Зерновые культуры	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Десикация. Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	- (1)	
	2-3	Лен-долгунец		Десикация. Опрыскивание посевов за 28 дней до уборки для подсушивания культурных и сорных растений		
	2-3	Соя		Десикация. Опрыскивание посевов за 15 дней до уборки (при влажности зерна не более 30%) для подсушивания культурных и сорных растений		
	3-4	Горох		Десикация. Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки при высокой влажности семян		
	2-5	Лен-долгунец (товарные посевы)		Десикация. Опрыскивание через 10 дней после конца цветения при засоренности однолетними сорняками		
	2	Подсолнечник		Десикация. Опрыскивание в начале побурения корзинок при влажности не более 35 %		
	3	Растопша		Десикация. Опрыскивание посевов за 15 дней до уборки		
осат, ВР 0 г/л) ом Кроп о Лтд» 01/01/09 ВК (410 г/л) онг Синда икал" 04/04/2011	2-4	Поля, предназначенные под посев различных культур (яр. зерновые, овощные, технические, масличные, бахчевые), а также однолетних цветочных (семенные посевы)		Однолетние злаковые и двудольные		
	4-5		Многолетние злаковые и двудольные			
	6-8		Злостные многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой)			
	2-4	Пары	Однолетние и многолетние	Опрыскивание сорняков в период их активного роста		
	4-6		Многолетние и злаковые и двудольные			

осат, ВР 0 г/л) вуд ЛТД» 09/01/09	6-8		Вьюнок полевой, бодяк полевой			
		Оросительные и дренажные каналы, водоемы и прочее	Однолетние и многолетние, в т.ч. гидрофитные (тростник, рогоз и др.)	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам в течение летнего сезона		
траст, ВР 0 г/л) кем Ко., тд» 26/12/07						
ВДГ (747 кг) Семсайенс ЛТД» 15/10/09						
форте, ВР 0 г/л) ай МИО Ко., ЛТД» 18/11/09	2,5	Пары	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	- (1)	7 (3)
	4		Злостные (горчак розовый, гумай, вьюнок полевой, свинорой пальчатый)			
	4-5	Коллекторно-дренажная сеть, каналы и их обочины	Тростник обыкновенный	Опрыскивание сорняков в период их активного роста до затопления их водой		
	2,5-5	Плодовые	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (при условии защиты культуры)		
	3-5	Объекты города (села): трамвайные и железнодорожные пути, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и другие объекты	Нежелательная травянистая и кустарниковая растительность	Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности. Расход рабочей жидкости 200 -300 л/га		
Г (соль тримезиум)						
ВР (480 г/л тримезиум 360 г/л ата к-ты) гента» 01/01/09	2-4	Плодовые, виноградники	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом (при условии защиты культуры)	- (1)	7 (3)
	4-6		Многолетние злаковые и двудольные			
ВР (480 г/л тримезиум 360 г/л ата к-ты) Куенсон и групп» 22/08/07	2-4	Зерновые культуры	Однолетние и многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание посевов за 2 недели до уборки (при влажности зерна не более 30 %) для подсушивания зерна и частичного подавления сорняков	- (1)	- (-)
		Пары	Однолетние многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста		- (-)
ВР (480 г/л тримезиум 360 г/л	2-4	Поля, предназначенные под посев яровых	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание вегетирующих		

ата к-ты) р Кемикал Лтд.» 1 21/12/09	4-6	зерновых	Многолетние злаковые и двудольные	сорняков осенью, в послеуборочный период		
ВР (480 г/л тримезиум 360 г/л ата к-ты) нскор эшнл Ко., тд» 21/01/11	3-4	Паровые поля, предназначенные под посев и посадку лекарственных культур	Многолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в период их активного роста	- (2)	- (-
ВР (480 г/л по мезиум или тифосата к- ты) рокемикал Лтд» 08/12/09	2		Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание сорняков в послеуборочный период	- (1)	
	2-5	Объекты города (села): парки, скверы, бульвары, железнодорожные пути, санитарно-защитные зоны промышленных предприятий и др. объекты	Нежелательная травянистая и древесно- кустарниковая растительность	Опрыскивание вегетирующих сорняков и нежелательной растительности		
ам+фенмедифам						
н ФД 11, +80 г/л) Целково охим» 1 21/12/09	4	Свекла сахарная, столовая, кормовая	Однолетние двудольные сорняки (включая виды щирицы)	Опрыскивание посевов с фазы 2 настоящих листьев культуры при ранних фазах роста сорняков	- (1)	7 (3
КЭ (80+80 /л) Агровит» 1 24/12/09	2			Опрыскивание вегетирующей культуры в фазе семядолей сорняков. Повторно через 5-10 дней	- (2)	
ам+фенмедифам + этофумезат						
е Гарант, +90+110 /л) Фирма густ» 1 21/12/09	1-3	Свекла сахарная, столовая, кормовая	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, подмаренник и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне, с интервалом 7- 14 дней). Расход рабочей жидкости - 200 л/га	- (3)	- (3
	2,5			Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков по первой, второй и третьей волне, с интервалом 7- 14 дней	- (2)	
	3			Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков	- (1)	
Прогресс	3-3,5	Свекла сахарная,	Однолетние	Опрыскивание посевов	- (1)	7 (3

РР Трио Р, КЭ +112 г/л) «АсТеРо упп» 01/01/09 ил-супер, +71+112 г/л) рохем ипани итед» 12/08/08	1	Свекла сахарная, столовая, кормовая	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, подмаренник и некоторые злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне)	- (3)	
1,25	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков			- (2)		
1,5	Опрыскивание посевов в фазе 4 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков			- (1)		
(диметиламинная соль)						
а, ВР (480 г/л) камбы лоты) Алсико- пром» 1 11/01/10	0,15-0,3	Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА, и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота (бодяк и др.)	Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4Д, МЦПА и гербициду Алмазис при опрыскивании посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних и 15 см высоты у многолетних сорняков.	- (1)	7 (3)
	0,4-0,5	Просо				
	0,4-0,8	Кукуруза				
	1,6-2	Сенокосные угодья	Чемерица, лютики, щавель, борщевик и др.	Опрыскивание вегетирующих сорняков весной		- (-)
	2,6-3,1			Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью		
	1,6-3,1	Пары и земли несельскохозяйственного пользования	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные (за исключением горчака ползучего)	Опрыскивание вегетирующих сорняков		
	ВР (480 г/л) СФ СЕ» 1 21/12/09	0,1-0,15	Яровая пшеница, озимая пшеница, ячмень	Однолетние и многолетние (за исключением горчака ползучего) двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к	Опрыскивание посевов в фазе кущения в смеси с препаратами из группы 2,4 Д, сульфонилмочевин	- (1)
0,25-0,3		Обочины дорог	Опрыскивание посевов			

			препаратам из группы 2,4 Д, 2М-4Х, сульфонилмочевин	в фазу кушения в чистом виде		
+ хлорсульфурон (диэтилэтаноламинные соли)						
зан, ВР 22,2 г/л) «Целково ошим» 1 21/12/09	0,14-0,2	Пшеница, ячмень, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе начала кушения (3-4 листа) - конец кушения культуры, и ранние фазы роста сорняков. Обработка озимых проводится ранней весной или осенью.	- (1)	- (3)
+ метсульфурон-метил						
т, ВГР 45 г/л) Фирма густ» 1 21/12/09	0,08-0,1	Пшеница озимая	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры и ранние фазы роста сорняков	- (1)	- (3)
амид-Р						
нтьер , КЭ (720 /л) «Ф СЕ» 1 21/12/09	1,2	Кукуруза, соя, подсолнечник, свекла сахарная и кормовая	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры	- (1)	- (3)
р						
и, ВК (250 /л) О Агро Б. З.» 21/12/09	2-2,5	Земли несельскохозяйственного пользования (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и другие промышленные территории)	Все виды сорняков, в т.ч. амброзия полыннолистная и горчак ползучий	Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста, в т.ч. амброзии полыннолистной в фазе 2-4 листьев и горчака ползучего в фазе стеблевания	- (1)	15 (3)
		Очаги карантинных сорняков на полосах отчуждения, линий электропередач, трасс нефте- и газопроводов, насыпях железных и шоссейных дорог и др. территоии	Амброзия полыннолистная	Однократное наземное опрыскивание в фазе 2-4 листьев амброзии		
	2-3	Вырубки разной давности при подготовке площадей под лесные культуры, для содействия естественному возобновлению хвойных пород, при реконструкции малоценных молодняков	Все виды сорняков, лиственные и хвойные древесно-кустарниковые породы (осина, береза, ольха, сосна, ель и др.)	Опрыскивание вегетирующих растений и почвы в июне-августе, 1 раз за период выращивания, посадка саженцев сосны и ели с закрытой корневой системой не ранее, чем через месяц после опрыскивания, с открытой корневой системой - весной следующего года	- (-)	7 (3)

ир

, ВРК (100 г/л) «Достук нэншл» 17/03/09 К (100 г/л) Рамсайдес с Пвт. Дтд» 08/12/10	0,5-0,8	Соя	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные, в т.ч. виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов - 2 настоящих листьев культуры. В год применения препарата рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через 2 года - все культуры без ограничения.	- (1)	- (3)
		Горох на зерно, горох овощной на семена	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивание сорняков в фазе 3-6 листьев культуры		
	0,5-0,75	Горох овощной (для промышленной переработки)				
	1	Люцерна На обочинах шоссеиных дорог, аэродромах и других промышленных объектах	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные, в т.ч. повилики	Опрыскивание посевов через 7-10 дней после первого укоса		- (-)
			Горчак ползучий	Однократное наземное опрыскивание в фазе стеблевания горчака		
	2-8	Полосы отчуждения линий электропередач, трасс нефте- и газопроводов, насыпи железных и обочины шоссеиных дорог, аэродромы и другие промышленные объекты	Поросль лиственных и хвойных пород (осина, береза, ольха, ива и другие, а также сосна и ель)	Наземное и авиационное опрыскивание растений и почвы с апреля по сентябрь (1 раз в 3-5 лет)	- (-)	
	4-5	Государственная граница (следовые полосы)	Все виды сорняков	Опрыскивание сорняков в ранние фазы их роста	- (1)	
ВРК (100 г/л) Ф Агро В.» 1 21/12/09 К (100 г/л) у Агрохем тори Ко., ГД» 22/07/08 РК (100 г/л) Семсайенс ЛТД» 15/10/09 РК (100 г/л) рокемикал Лтд» 31/03/10	0,5-1	Соя, фасоль	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные, в том числе виды амброзии	Опрыскивание почвы до посева (с заделкой), до всходов или опрыскивание посевов в фазе всходов - двух настоящих листьев культуры. При пересеве в год применения рекомендуется высевать озимую пшеницу, на следующий год - кукурузу, яровые и озимые зерновые, через 2 года - все культуры без ограничений.	60 (1)	- (3)
		Горох на зерно, горох овощной на семена	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные	Опрыскивание почвы в течение 2-3 дней после посева или опрыскивания сорняков в фазе 3-6		

Алт, ВК 0 г/л) Агровит» 1 24/12/09 К (100 г/л) и Компании ЛТД» 12/08/08 К (100 г/л) Куенсон и групп» 22/08/07 ВК (100 г/л) онг Синда Ко., Лтд.) 26/01/2011 ВК (100 г/л) Агрочайна ешнл Ко., ГД» 27/07/11	1	Люцерна	Однолетние, многолетние злаковые и однолетние двудольные, в том числе повилики	листьев культуры Опрыскивание посевов через 7-10 дней после первого укуса		- (-
фулон-метил-натрий + амидосульфурон + мефенпир-диэтил						
ор, ВДГ +125 г/кг) роп Сайенс ЛГ» 01/01/09	0,15-0,25	Пшеница, ячмень	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание ранней весной, до конца стадии кушения культуры	- (1)	- (-
л						
Э (225 г/л) ер Кроп енсес» 01/01/09	2-3	Лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры (ранние фазы роста сорняков)	- (1)	7 (3
	1,5-3	Чеснок озимый		Опрыскивание посевов		
	1,5-2	Чеснок из воздушных луковиц		в фазе 2-3 листьев культуры		
ил октаноат						
Э (240 г/л) Кемикал турес Лтд» 01/01/09	1,5-2	Чеснок	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе всходов - 2-3 листьев культуры	- (1)	7 (3
	2-3	Лук (кроме лука на перо)		Опрыскивание посевов в фазе всходов - 3-6 листьев культуры		
роп-П-тефурил						
а, КЭ (40 /л) Куенсон и групп» 25/09/08	0,75-1	Свекла сахарная , столовая, кормовая, картофель, лук, морковь, капуста, томаты рассадные и посевные, соя, подсолнечник	Однолетние злаковые (просо куриное, сорго полевое, щетинники)	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков, независимо от фазы развития культуры	- (1)	7 (3
	1-1,5		Многолетние злаковые (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см, независимо от фазы развития культуры		
рак+бенсульфурон						
СП (330+3 /л)	0,675-0,75	Рисовые поля	Однолетние и некоторые	Опрыскивание вегетирующих	- (1)	7 (3

онг Синда икал" 04/01/11			многолетние сорняки	растений			
Фоп-пропаргил							
П (150 г/кг) «Достук нэшнл» 08/12/10	0,16-0,2	Пшеница яровая и озимая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы (2-3 листа) роста сорняков, независимо от фазы развития культуры	- (1)	7 (3)	
	0,25-0,4		Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное)				
т, СП (150 /л) онг Синда и Ко., Лтд" 26/01/11	0,3-0,45	Озимая пшеница	Многолетние и однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих растений			
	0,2-0,3	Яровая пшеница					
Фоп-пропаргил + антидот							
КЭ (80+20 гента» IV- 1/01/09	0,3-0,5	Пшеница яровая	Овсяг	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (3-4 листа) независимо от фазы развития культуры	- (1)	- (3)	
			Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинников)				
(80+20 г/л) ай МНО Ко., ЛТД,» 18/11/08	0,5-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые просовидные сорняки (овсяг, щетинники, мятлик, метлица)				
Фид							
Р, ВДГ (750 /кг) «АсТеРо упп» 01/01/09	0,12	Свекла сахарная	Все виды ромашки, горца, осота	Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры	- (1)	7 (3)	
		Рапс яровой и озимый (семенные посевы)		Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры			
ралид, ВР 0 г/л) Куенсон и групп» 25/09/08	0,04	Свекла сахарная	Все виды ромашки, горца, осота	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков первой волны	- (1)	- (3)	
	0,08			Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков второй волны			
	0,06			Опрыскивание посевов последовательно в фазе семядолей сорняков первой и второй волны	- (2)		
	0,12			Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры	- (1)		
	0,04		Однолетние двудольные, в т.ч. щирца и некоторые однолетние злаковые. Все виды ромашки, горца, осота	Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков первой волны в смеси с 1,5 л/га Бифор Эксперт			
	0,08			Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков второй волны в смеси с 1,5 л/га Бифор Эксперт			
	0,06			Опрыскивание посевов последовательно в фазе семядолей сорняков первой и второй волны в смеси с 1,5 л/га Бифор Эксперт	- (2)		
	0,06			Опрыскивание посевов в фазе 4 листьев	- (1)		

				культуры в смеси с 3 л/га Бифор Эксперт		
		Рапс яровой	Все виды ромашки, горца, осота	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев культуры		
	0,04-0,12	Лен-долгунец	Однолетние и многолетние двудольные, в т.ч. виды ромашки, горца, осота	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» и в фазе розетки у многолетних двудольных сорняков	- (3)	
	0,025-0,04		Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное)			
ВР (300 г/л) «Щелково-Охим» 11/21/12/09	0,16-0,66	Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, просо	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку	- (1)	- (3)
	1	Кукуруза		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры		7 (3)
	0,3-0,5	Свекла сахарная		Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры		
	0,1-0,3	Лен-долгунец	Виды осота	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры при фазе розетки у сорняков		- (3)
	0,2-0,5	Капуста белокочанная	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание сорняков после высадки рассады		7 (3)
	0,5-0,6	Земляника	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка непахучая, горцы)	Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая		
	0,3-0,4	Рапс яровой и озимый (семенные посевы)	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание посевов в фазе 3-4 листьев культуры		- (3)
	0,3	Райграс однолетний	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (ромашка непахучая, горцы)	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры		7 (3)
	0,2-0,3	Наперстянка шерстистая 1-го года вегетации		Опрыскивание посевов в фазе 2-4 настоящих листьев культуры		
	0,3	Наперстянка шерстистая 2-го года вегетации		Опрыскивание посевов в фазе отрастания культуры		
	0,5	Лаванда	Виды осота, ромашки, гречишки, горца	Опрыскивание плантаций в фазе отрастания культуры		
	0,16-0,66	Газоны	Ромашка, осот, гречишка, одуванчик	Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса		
	0,3-0,4	Макля сердцевидная	Ромашка, осоты, горцы	Опрыскивание плантаций в фазе отрастания культуры		
СЭ (120 г/л) «Веста»	0,6-0,7	Свекла сахарная, кормовая, столовая,	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев -	- (1)	7 (3)

рейшн» 01/01/09		подсолнечник, соя		кушения сорняков, независимо от развития культуры		
	1,6-1,8		Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см, независимо от развития культуры		
ион+ПАВ Э (240 г/л) веста рейшн» 01/01/09	0,2-0,4 л/га + 0,6-1,2 л/га «Амиго»	Свекла сахарная, столовая, кормовая, картофель, морковь, лук, лен, соя	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры	- (1)	7 (3)
	0,7-1 л/га + 2,1-3 л/га «Амиго»		Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10- 20 см независимо от фазы развития культуры		
ЕРР КЭ 0 г/л) «АсТеРо упп» 01/01/09	0,2-0,4 л/га+0,6- 1,2 л/га Фосфата эфира или масла растительного	Свекла сахарная, столовая, кормовая, картофель, морковь, лук, лен, соя	Однолетние злаковые (просо куриное, виды щетинника)	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры		
	0,7 л/га + 2,1-3 л/га Фосфата эфира или масла растительного		Многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10- 20 см независимо от фазы развития культуры Опрыскивание плантаций 1-го и 2-го годов вегетации при высоте сорняков 10-15 см независимо от фазы развития культуры		
КЭ (120 г/л) онг Синда Ко., Лтд.» 26/01/11	0,45-0,6	Соя, рапс, лук, морковь, хлопчатник, сахарная свекла, картофель, подсолнечник и др.	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание вегетирующих растений	- (1)	7 (3)
			Многолетние злаковые сорняки			
вин						
П (700 г/кг) и Ко., Лтд» 26/12/07	0,7-1,4	Томаты	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до высадки рассады	- (1)	7 (3)
		Картофель				
		Люцерна				
, СП (700 /кг) Куенсон ри групп» 25/09/08 н, СП (700 /кг) и Ко., Лтд." 4/02/2011*	1,1-1,4	Томаты	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до высадки рассады	30 (1)	
	0,7			Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры		
				Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт		
	1	Картофель		Опрыскивание почвы до всходов культуры	- (1)	
	1,4-2,1			Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см	- (2)	
	0,5-1+0,3					
	1,4	Люцерна 2-го года вегетации (семенные посевы)		Опрыскивание почвы рано весной до начала отрастания культуры	60 (1)	
	1,1			Опрыскивание посевов при высоте культуры		

				10-15 см	
	2,1	Роза эфиромасличная (насаждение 1-2 года вегетации и плодоносящие)		Ранневесеннее направленное опрыскивание почвы рядков до начала вегетации культуры	- (1)
ин, СП (700 'кг) агриСайенс Ко» 01/01/09	1,1-1,4	Томаты	Однолетние двудольные и злаковые	Опрыскивание почвы до высадки рассады	- (1)
	0,7			Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры	30 (1)
	1			Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт	
н, СП (700 'кг) су Агрохем тори Ко., ГД» 22/07/08	1,4-2,1	Картофель		Опрыскивание почвы до всходов культуры	- (1)
	0,5-1+0,3			Опрыскивание почвы до появления всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см	
р, СП (700 'кг) рукем эшнл Ко, ГД» 24/09/07	0,5	Соя		Опрыскивание до всходов культуры	
Г (750 г/кг) Симсайенс ЛТД» 15/10/09	1,4	Люцерна		Опрыскивание почвы рано весной до начала отрастания культуры	
	1,1			Опрыскивание посевов при высоте культуры 10-15 см	
П (700 г/кг) Рамсайдс с Пвт Лтд» 08/12/10	2,1	Роза эфиромасличная (насаждения 1-2-го года вегетации и плодоносящие)		Ранневесеннее направленное опрыскивание почвы рядков до начала вегетации культуры	
П (700 г/кг) Агрочайна эшнл Ко., ГД» 27/07/11	0,5	Эхинацея пурпурная		Опрыскивание почвы до всходов культуры	
ан, ККР 0 г/л) Целково охим» 1 21/12/09	1+(0,4-0,6)	Картофель	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Двукратное опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см	- (2)
	1,1-1,4			Опрыскивание посевов при высоте ботвы 5 см	- (1)
	0,4+0,8	Томаты безрассадные	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 листьев культуры и в фазе 2-4 листьев культуры	30 (2)
	1,2-1,5			Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры	30 (1)
	1,7	Томаты рассадные		Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады в грунт	

Ферон-метил ВДГ (600 г/кг) «Алсико-проп» 11/01/10	0,008-0,01	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки (начиная с фазы 2 листьев - до конца кущения культуры).	- (1)	- (3)
ВДГ (600 г/кг) Куенсон и групп» 22/08/07		Пшеница озимая		Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха от применения препарата до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных гербицидом площадей высевать только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га		
ет, СП (600 г/кг) «АсТеРо упп» 01/01/09	0,008-0,01	Пшеница яровая, ячмень яровой	Однолетние двудольные в т.ч. устойчивые к 2,4 Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки, начиная с фазы 2-х листьев - до конца кущения зерновых.	- (1)	- (3)
СП (600 г/кг) Агровит» 1 24/12/09		Пшеница озимая		Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4листа) и многолетних в фазе розетки. На следующий год высевать злаковые культуры		
ВДГ (600 г/кг) «Семсайенс ЛТД» 15/10/09						
П (600 г/кг)	0,008-0,01	Пшеница яровая, озимая	Однолетние	Опрыскивание посевов	- (1)	- (3)

м Компани итед» 12/08/08		Ячмень яровой	двудольные сорняки в т.ч. устойчивые к 2,4 Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные.	в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки (начиная с фазы 2 листьев - до конца кущения культуры).		
, ВДГ (600 /кг) су Агрохим тори Ко., ГД» 29/08/08	10 г/га	Пшеница яровая, ячмень яровой, овес	Однолетние двудольные, в.т.ч. устойчивые к 2,4 и 2М- 4Х и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки (начиная с фазы 2 листьев - до конца кущения культуры).	- (1)	- (3)
, ВДГ (600 /кг) «ббагрохим» 21/04/10						
СП (600 /кг) Целково «ОХИМ» 1 21/12/09	0,008-0,01	Пшеница, ячмень, овес	Однолетние двудольные, в.т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки. Соблюдать ограничения по севообороту: на следующий год после уборки зерновых нельзя высевать свеклу и овощные; подсолнечник и гречиху - только после глубокой вспашки. Нельзя высевать подсолнечник и гречиху на следующий год, если рН почвы выше 7,5 или если была продолжительная засуха от применения препарата до посева этих культур. При необходимости пересева обработанных гербицидом площадей высевать только яровые зерновые. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га	- (1)	- (3)
фурон-метил+МЦПА						
ВДГ (600 750 г/л) «Алсико- пром» 1 11/01/10	5 г/га Алмазис + 145 г/га МЦПА	Пшеница и ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные, в.т.ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста однолетних (2-4 листа) и фазе розетки многолетних (начиная с фазы 2 листьев -до конца кущения культуры).	- (1)	- (3)
		Пшеница и ячмень озимые		Опрыскивание посевов весной в фазе кущения		

				культуры и ранние фазы роста однолетних сорняков (2-4 листа) и многолетних в фазе розетки.		
иметиламинная соль)						
, ВР (750 г/л) м Кроп о Лтд» 01/01/09 (750 г/л) м Гмбх и , КГ» 03/01/10	1-1,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес, рожь	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку	- (1)	- (3)
	1,3-1,8	Рис	Клубнекамыш, частуха и др. двудольные	Опрыскивание посевов в фазе полного кущения культуры		- (-)
фурон+атразин						
орн, МСК 0 г/л) онг Синда Ко., Лтд.» 26/01/11	1,875-2,625	Кукуруза	Однолетние и многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные сорняки.	Опрыскивание в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Опрыскивание проводить до 10 часов утра, или после 16 часов дня. Не смешивать с фосфорорганическими инсектицидами.	- (1)	- (3)
орфен						
КЭ (240 г/л) о Сайенсес» 21/12/09 ор, КЭ (240 г/л) Куенсон ри групп ГД» 29/09/08 и, КЭ (240 г/л) и Ко., Лтд.» 14/02/2011 Э (240 г/л) Агрочайна шнл Трайд Лтд» 14/12/10 ен, КЭ (240 г/л) су Агрохем тори Ко., ГД» 22/07/08 КЭ (240 г/л) «Достук нэшнл»	0,8-1,0	Подсолнечник	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание после посева до всходов культуры	- (1)	7 (3)
	0,5-1,0	Лук всех генераций. Чеснок		Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев культуры.		

17/03/09						
Огонь, КЭ 0 г/л) онг Синда Ко., Лтд.» 04/04/11	2,25-3,75	Пары, земли несельскохозяйственного пользования	Однолетних злаковых и двудольных сорняков	Равномерно опрыскивать на листья сорняков, в местах, где плотность сорняков высокая, необходимо увеличить норму расхода. После опрыскивания запрещается выпас скота и скашивание в течение 7 дней	-(1)	-(1)
г. Калинин						
Калинин, КЭ 0 г/л) Рамсайде ПВТ ЛТД» 08/12/10	5	Пшеница озимая	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы после посева до появления всходов культуры	- (1)	7 (3)
	5-6	Рис (при глубокой заделке семян)	Злаковые (виды ежовника)	Опрыскивание почвы за 1-2 дня до посева или в течение 7-10 дней после посева		- (-)
иметалин, 330 г/л) «Достук нэшнл» 17/03/09	3-6	Кукуруза, соя, хлопчатник, подсолнечник, табак, томаты рассадные, капуста рассадная, морковь, чеснок	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы до всходов культуры или до высадки рассады		7 (3)
	3	Томаты посевные		Опрыскивание почвы до всходов культуры		
	2,3-4,5	Лук всех генераций		Опрыскивание почвы за 2-3 дня до всходов культуры (после последнего окучивания)		
	5	Картофель				
КЭ (330 г/л) Ф Агро В.» 01/01/09	5	Пшеница озимая	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы после посева до появления всходов культуры	- (1)	7 (3)
	5-6	Рис (при глубокой заделке семян)	Злаковые (виды ежовника)	Опрыскивание почвы за 1-2 дня до посева или в течение 7-10 дней после посева		- (-)
Э (330 г/л) Агрочайна шнл Трайд Лтд» 14/12/10	3-6	Кукуруза, соя, подсолнечник, табак, томаты рассадные, морковь, чеснок	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы до всходов культуры или до высадки рассады		7 (3)
	3	Томаты посевные		Опрыскивание почвы до всходов культуры		
Э (330 г/л) м Компани итед,» 26/03/07	2,3-4,5	Лук всех генераций		Опрыскивание почвы до всходов культуры в течение двух дней после посева		
	3	Петрушка корневая		Опрыскивание почвы за 2-3 дня до всходов культуры (после последнего окучивания)		
Э (330 г/л) г Зуочуанг Ко., ЛТД.,» 26/07/07	5	Картофель		Опрыскивание до всходов или до высадки рассады		
Э (330 г/л) м Компани итед,» 12/08/08	6-9	Лекарственные травы				

Э (330 г/л) ай МИО Ко., ЛТД» 24/08/09	5	Пшеница	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы после посева до появления всходов культуры	- (1)	7 (3
Э (330 г/л) Квингфен айдс Ко., ГД» 20/02/08	3-6	Кукуруза, соя, подсолнечник, табак, томаты рассадные, морковь, чеснок		Опрыскивание почвы до всходов культуры или до высадки рассады		
	3	Томаты посевные		Опрыскивание почвы до всходов культуры		
	2,3-4,5	Лук всех генераций		Опрыскивание почвы за 2-3 дня до всходов культуры (после последнего окучивания)		
Э (330 г/л) Семсайенс ЛТД» 15/10/09	5	Картофель		Опрыскивание до всходов или до высадки рассады		
	4-9	Лекарственные травы				
	5-6	Рис (при глубокой заделке семян)	Однолетние злаковые (ежовник)	Опрыскивание почвы за 1-2 дня до посева или в течение 7-10 дней после посева		- (-
Э (330 г/л) Алсико- пром» 11/01/10	5	Пшеница озимая	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы после посева до появления всходов культуры	- (1)	7 (3
Э (330 г/л) Куенсон и групп» 22/08/07	5-6	Рис (при глубокой заделке семян)	Злаковые (виды ежовника)	Опрыскивание почвы за 1-2 дня до посева или в течение 7-10 дней после посева		- (-
Э (330 г/л) жен Мост рпрайз мент Ко., ГД» 30/03/2011	3-6	Кукуруза, соя, подсолнечник, табак, томаты рассадные, капуста рассадная, морковь, чеснок	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы до всходов культуры или до высадки		7 (3
	3	Томат посевной		Опрыскивание почвы до всходов культуры		
	2,3-4,5	Лук всех генераций		Опрыскивание почвы до всходов культуры в течение 2 дней после посева		
	3	Петрушка корневая		Опрыскивание почвы за 2-3 дня до всходов культуры (после последнего окучивания)		
Э (330 г/л) Целково охим» 11/12/09	5	Картофель		Опрыскивание почвы после обрезки главных корневищ до отрастания культуры		
Э (330 г/л) нскор эшнл Ко., ГД» 21/01/2011	6	Хмель		Опрыскивание почвы весной до высадки рассады		
п, КЭ (330 /л) нг Нонг Фу икал Ко., ГД» 4/05/2011	3-6	Кориандр, анис		Опрыскивание почвы весной до высадки		
		Лаванда		Опрыскивание почвы до отрастания культуры		
		Полынь лимонная		Опрыскивание почвы до посадки или до всходов культуры		
	3-4	Мята перечная		Опрыскивание почвы		
	3-6	Герань		Опрыскивание почвы		

				(с немедленной заделкой) до посадки культуры		
	4,5-6	Шалфей мускатный		Опрыскивание почвы в фазе 4-6 листьев культуры		
	6	Шалфей лекарственный		Опрыскивание переходящих плантаций в период начала отрастания культуры		
	6	Ромашка далматская		Опрыскивание посевов в период отрастания культуры		
	2-2,3	Валериана лекарственная 1-го года вегетации		Опрыскивание почвы до посева или всходов культуры. Уборка корней производится на втором году вегетации		

ам						
25 МД, (25 /л) «оСаенсес» 09/01/09	0,8-1	Рис	Однолетние (просовидные) и многолетние злаковые (клубнекамыш).	Опрыскивание сорняков в фазу 2-3 листа - кущение у злаковых сорняков и 5-7 листьев у клубнекамыша по влажной почве, или по рисовым чекам при 5-10 см воды. Перед каждой обработкой слить воду с чеков, повторное затопление чеков можно проводить через 6 часов после окончания обработки	- (2)	- (-)

лор+пирибензоксим						
КЭ (300+20 /л) «гента» 25/03/2011	1-1,5	Рис	Двудольные, злаковые (просовидные) сорняки, клубнекамыш	Опрыскивание посевов после затопления, в фазу начала кушения риса	- (1)	30 (

лор						
и (Арстан), 500 г/л) Рамсайдс ПВТ ЛТД» 08/12/10	1,5-2	Рис	Однолетние злаковые (просовидные), однолетние двудольные и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков по влажной почве или при слое воды 5-10 см с добавлением поверхностно-активного вещества.	- (1)	30 (

ин						
д, КС (500 /л) гента» 01/01/09 ерекс, СП 0 г/л) Кемикал акчерес	3-5	Хлопчатник	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры	- (1)	15 (
	2-4	Смешанные посевы кукурузы с подсолнечником				
		Подсолнечник				
	3-5	Горох на зерно, соя		Опрыскивание почвы до всходов культуры		- (3
		Чеснок				
	3	Фасоль		Опрыскивание почвы за 2-3 дня до всходов культуры		

гд.» 01/01/09 СП (500 г/л) Рамсайдс ПВТ, Лтд» 08/12/06 н, КС (500 /л) нг Чаочанг Ко., ЛТД» 24/08/09 КС (500 г/л) абагрохим» 06/10/10 П «Шанхай очайна ешнл Ко., ГД» 27/07/11 д, КС (500 /л) нскор эшнл Ко., гд." 21/01/2011 д, КС (500 /л) у Агрокем тори Ко., гд» 26/01/2011 д, СП (500 /кг) м Компани итед» 12/08/08 СП (500 г/л) остук нэшнл» 08/12/10	3-4	Картофель		Опрыскивание почвы до всходов культуры, реализация клубней разрешается не ранее, чем через 3 месяца после обработки		
	2-3	Морковь		Опрыскивание почвы до посева, до всходов культуры, или в фазе 1- 2 настоящих листьев. Реализация корнеплодов разрешается не ранее, чем через 4 месяцев после обработки		15 (3)
	3-4	Сельдерей, укроп, петрушка		Опрыскивание посевов по всходам культуры		
	4	Петрушка		Опрыскивание почвы до всходов культуры (в течение 2-5 дней после посева)		
	3-4	Чечевица		Опрыскивание почвы до посева (с заделкой) или до всходов культуры		- (3)
	3-4	Бобы кормовые		Опрыскивание почвы до всходов культуры		- (3)
ид W, СП (500 /кг) о Сайенсес» 21/12/09	3-5	Свекла сахарная	Повилика	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 пар настоящих листьев культуры	- (1)	7 (3)
		Люцерна (семенные посевы)		Опрыскивание посевов в фазе 3-4 пар настоящих листьев до смыкания рядков культуры		- (2)
		Клевер, люцерна (старовозрастные посевы)	Однолетние, многолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посевов рано весной в период покоя до начала отрастания культуры или поздней осенью		

бурон

СТС (250 г/кг) де Немур ейшенз р,л,» 06/10/09	40-50 г/га + 200 мл/га неионного ПАВ Тренда 90	Кукуруза	Однолетние, многолетние злаковые и некоторые однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и в период начала кущения однолетних злаковых и высоте многолетних злаковых сорняков 15- 20 см и в фазе розетки осотов.	- (1)	- (-
СТС (250 /кг) Куенсон и групп» 22/08/07	50 г/га + 200 мл/га неионного ПАВ Тренда 90	Картофель	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные	Опрыскивание посадок после окучивания, в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см.		
СТС (250 /кг) ген МОСТ рпрайз имент Ко., гд» 30/03/11						

ахлор+антидот

Люс, КЭ 0 г/л) ай МНО кал Ко, ГД» 18/11/08	1,6-2,6	Кукуруза	Однолетние злаковые, некоторые двудольные	Опрыскивание почвы (с заделкой) до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см).	- (1)	15 (-
		Соя				
		Подсолнечник				
		Хлопчатник				
		Свекла сахарная, столовая, кормовая				
	1,3-2,5	Сафлор				
д, КЭ (960 /л) гента» 01/01/09	0,6-1,6	Кукуруза	Однодольные злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание до посева или до всходов культуры		
		Соя				
		Подсолнечник				
	0,6-1,25	Сахарная свекла				
	0,6-1,4	Хлопчатник				

им

МКЭ (125 /л) т Сода Ко., гд.» 01/01/09	1-3	Свекла сахарная, столовая, огурцы, соя, морковь, капуста, лук всех генераций (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев у сорняков	- (1)	7 (3
	3-5		Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см		
	2,5-5	Томаты	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры или через 15-20 дней после высадки рассады (при высоте сорняков 10-15 см)		
		Арбузы		Опрыскивание посевов в фазе «шарика» культуры при высоте сорняков 10-15 см		
	1-2	Плодовые, цитрусовые, виноградники	Однолетние злаковые	Опрыскивание сорняков в фазе 2-4 листьев		
	4-5		Многолетние злаковые	Опрыскивание сорняков при их высоте 10-15 см		
	2,5-3	Люцерна	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов первого года и последующих лет вегетации при высоте		
	4-5		Многолетние злаковые			

				культуры 10-15 см		
етурон-метил (калиевая соль)						
овик, ВДГ (0 г/кг) «Окожай ХХI» 01/01/09	120-240 г/га	Земли несельскохозяйственного пользования (охранные зоны линий электропередач и просеки, трассы газо- и нефтепроводов, насыпи и полосы отчуждения железных и шоссейных дорог, аэродромы и др. промышленные территории)	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы и сорняков при их высоте до 15 см	1-2 (1)	- (-)
	240-350 г/га			Опрыскивание почвы и сорняков при их высоте более 15 см в смеси с Гераклом в дозе 6 л/га		
ксидим						
КЭ (45 л) «Ф СЕ» 21/12/09	1-2	Сахарная свекла, соя	Однолетние и многолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев - кущения сорняков, независимо от фазы роста культуры	56 (1)	7 (3)
он-метил						
битель, (750 г/кг) «Агровит» 1 24/12/09	0,015-0,020	Пшеница, ячмень яровые, овес	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов в фазе 2-3 листьев - начала культуры	- (1)	- (3)
	0,020-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д, и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, озимых - весной		
гар, СТС (0 г/кг) «Семсайенс ЛТД» 15/10/09						
стар, ВДГ (0 г/кг) «АсТеРо упп» 01/01/09						
, СТС (750 г/кг) м Компани итед» 12/08/08						
И (750 г/кг) «Достук нэшнл» 08/12/10						
рр, СТС (0 г/кг) анхай очайна ешнл Ко., ГД» 27/07/11						
Про, ВДГ (0 г/кг)	0,015-0,020 (авиаобработки)	Пшеница, ячмень яровые, овес	Однолетние и двудольные сорняки, в	Опрыскивание посевов в фазе 2-3-х листьев -	- (1)	- (3)

де Немур нз С.А.р,л» 06/10/09			т.ч. устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х	начала кушения культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа).		
Г (750 г/кг) су Агрохем тори Ко., ГД.» 29/08/08	0,02-0,025	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый, овес	Однолетние и двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х и бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры - выхода флагового листа и ранние фазы роста сорняков - однолетние 2-4 листа, бодяк полевой - розетка. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га		
ВДГ (750 /кг) Куенсон и групп» 22/08/07	0,01-0,015	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и двудольные сорняки, в т.ч. устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х	Опрыскивание посевов в фазе кушения культур в смеси с 200 мл/га Тренд 90 в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га		
	0,015-0,02	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	Однолетние и двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4Д и 2М-4Х, бодяк полевой	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры - выхода флагового листа и ранние фазы роста сорняков - однолетние 2-4 листа, бодяк полевой - в фазе розетки. Расход рабочей жидкости 200- 300 л/га		
он-метил+МЦПА						
СП (25+450 /кг) онг Синда Ко., Лтд." 26/01/2011	0,6-0,75	Зерновые	Однолетние двудольные	Опрыскивание посевов в фазе кушения культуры, озимых - весной	- (1)	- (3)
алин						
рекс, КЭ 0 г/л) Кемикал акчерес тд» 01/01/09	4-6 (в зависимости от типа почвы)	Капуста, томаты рассадные	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до высадки рассады. Возможно фитотоксическое последствие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы	- (1)	7 (3)
	4-8 (в зависимости от типа почвы)	Соя, подсолнечник		Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева, одновременно с посевом или до всходов культуры. Возможно фитотоксическое последствие на		15 (

			последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы	
4-8	Табак		Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до высадки рассады. Возможно фитотоксическое последствие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы	
1,8-2,4	Огурцы		Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) за 15 дней до посева культуры. Возможно фитотоксическое последствие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы	
3-4	Морковь		Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева или одновременно с посевом. Возможно фитотоксическое последствие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы	
8	Фасоль		Опрыскивание почвы (с немедленной заделкой) до посева. Возможно фитотоксическое последствие на последующие культуры севооборота - просо, луговые травы, а при неблагоприятных условиях - угнетение	

				овса, кукурузы, ячменя, риса, свеклы, пшеницы			
урон							
екс, СП 0 г/л) Кемикал ракчерес гд.» 01/01/09	1,2	Хлопчатник	Однолетние злаковые и двудольные	Опрыскивание ленточным методом до всходов культуры	- (1)	7 (3	
оп -П-бутил							
ад Форте, 50 г/л) гента» 01/01/09 роп-М, КЭ 0 г/л) ал Эженси стриал Инт. Со» 17/03/09	0,75-1	Картофель	Однолетние злаковые	Опрыскивание при высоте ботвы картофеля 10-15 см, (фаза 3-5 листьев у сорняков)	- (1)	7 (3	
	1-1,5		Пырей ползучий	Опрыскивание при высоте ботвы картофеля и пырея 10- 15 см			
	2		Многолетние злаковые при сильной засоренности				
	0,75-1	Лук	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев у сорняков			Опрыскивание при высоте пырея 10-15 см
	1-1,5		Многолетние злаковые (пырей ползучий)				
	2		Многолетние злаковые при сильной засоренности				
	0,75-1		Хлопчатник	Однолетние злаковые			
	1-1,5	Многолетние злаковые					
	шир						
Премиум, 30 г/л) о Саенсес" 04/02/2011	0,3-0,5	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние двудольные сорняки, (в т.ч. подмаренник) и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов от фазы кущения культуры до фазы флагового листа включительно.	20 (1)	7 (3	
е, КЭ (200 /л) нг Нонг Фу икал Ко., тд" 4/05/2011	0,75-1,25	Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	Однолетние и многолетние двудольные сорняки, а также некоторые корнеотпрысковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения до выхода в трубку культуры	- (1)	- (3	
проп - П - этила							
Р, ЭМВ. (69 /л) и Ко., Лтд» 26/12/07	0,8-1,2	Сахарная свекла, подсолнечник, рапс, лук всех генераций, соя, морковь, капуста	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры)	- (1)	- (-	
а-Супер, (69 г/л) ова А/С» 01/01/09	0,8-1	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо сорно-полевое)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до кущения (независимо от фазы развития культуры)	- (1)		
супер, ЭМВ 0 г/л) «Достук	0,8-1	Пшеница озимая	Однолетние злаковые, овсюг, метлица	Опрыскивание посевов рано весной по	- (1)		

нэшнл» 17/03/09			обыкновенная, просо сорно-полевое	вегетирующим сорнякам		
	0,6-0,9	Ячмень яровой	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо сорно-полевое)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2-го листа до кущения (независимо от фазы развития культуры)	- (1)	
с, КЭ (90 /л) Целково ОХИМ» 1 21/12/09	0,6-0,9	Свекла сахарная, столовая, кормовая, морковь, соя, подсолнечник, рапс, капуста белокочанная средне- и позднеспелых сортов, лук всех генераций, горох	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кушения (независимо от фазы развития культуры)	- (1)	7 (3
	1,4-1,9		Многолетние злаковые			
	1,4-1,9		Многолетние злаковые			
пер, КЭ (90 /л) Агрочайна шнл Трайд Лтд» 14/12/10						
групп-П-этил+андидот						
пер 100, КЭ -27 г/л) роп Сейенс» 01/01/09	0,4-0,6	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (виды щетинника, просо куриное, просо сорно-полевое)	Опрыскивание в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков независимо от фазы развития культуры	- (1)	7 (3
	0,6-0,9		Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кушения (независимо от фазы развития культуры)		
	КЭ (100+27 /л) Агровит» 1 24/12/09	0,6-0,75	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное, метлица обыкновенная, мятлик)		
кстра, КЭ -27 г/л) м Ко., Лтд." 4/02/2011*						
КЭ (100+27 /л) Семсайенс ЛТД» 15/10/09						
супер, КЭ -27 г/л) ай МЮ Ко., ЛТД» 18/11/08						
КЭ (100+27 /л) рукем эшнл Ко., ГД» 24/09/07.						
КЭ (100+27 /л) Куенсон и групп» 25/09/08						

Э (100+27 /л) «Достук нэшнл» 17/03/09						
Э (100+27 /л) Рамсайдс с Пвт. Лтд» 08/12/10						
упер, ВЭ (75 г/л) роп Сайенс» 01/01/09	0,6-1	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кушения (независимо от фазы развития культуры)	- (1)	7 (3
МВ (69+75 /л) Алсико- пром» 1 11/01/10	0,8-1	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное, метлица обыкновенная)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кушения (независимо от фазы развития культуры)		
		Ячмень яровой		Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кушения (в фазе кушения культуры)		
н Экстра, (40+70) Щелково ошим» 1 21/12/09	0,4-0,5	Пшеница озимая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое, метлица обыкновенная, мятлик)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кушения (независимо от фазы развития культуры).		
	0,3-0,45	Пшеница яровая	Однолетние злаковые (овсюг, виды щетинника, просо куриное, просо сорнополевое)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кушения (независимо от фазы развития культуры).		
	0,35-0,5	Ячмень яровой				
он						
н Турбо, (520 г/л) Ф СЕ» 21/12/09	3-5	Свекла сахарная	Однолетние двудольные	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры	- (1)	20 (
	2,5			Опрыскивание посевов по первой и второй волне сорняков в фазе семядолей независимо от фазы развития культуры (интервал между обработками 10- 15 дней)	- (2)	
оп - П- тефурил						
а, КЭ (40 /л)	0,75-1,5	Свекла сахарная, столовая, картофель, капуста, лук,	Однолетние и многолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе от 2-3 листьев до стеблевания у	30 (1)	7 (3
	1,25-1,5					

ра Европ тд» 01/12/09 КЭ (40 г/л) Куенсон и групп» 25/08/08 КЭ (40 г/л) нг Нонг Фу икал Ко., тд» 4/05/2011		хлопчатник, соя, подсолнечник		сорняков		
---	--	----------------------------------	--	----------	--	--

оп - II - этила

КЭ (51,6 г/л) «Алсико- проп» 11/01/10 ер, КЭ (51,6 /л) «Кемикал» 01/01/09	1-2	Свекла сахарная, морковь, капуста белокочанная, лук всех поколений (кроме лука на перо)	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков	- (1)	7 (3)
	2-3		Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см		
	1-2	Соя	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев у сорняков		- (3)
	2-3		Многолетние злаковые	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-15 см		
		Лен-долгунец	Многолетние и однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры (при высоте пырея ползучего 10-15 см)		
	2-4	Картофель	Однолетние и многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий	Опрыскивание растений в фазе 2-4 листьев у однолетних сорняков и высоте пырея 10-15 см		7 (3)
	2	Арбуз	Однолетние злаковые	Опрыскивание посевов в фазе «шарика» культуры (2-6 листьев у сорняков)		
	1-2	Томаты		Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры или через 15-20 дней после высадки рассады		
		Огурцы		Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры		
	1-2	Шалфей мускатный	Многолетние, однолетние злаковые	Опрыскивание плантаций в фазе 2-6 листьев культуры по вегетирующим сорнякам		- (3)
	2,5-3	Мята перечная		Опрыскивание плантаций после укоренения рассады или при высоте культуры 8-10 см		
	3-5	Роза эфиромасличная		Направленное опрыскивание почвы		

				рядков по всходам сорняков		
	3-4	Плодовые	Многолетние злаковые	Опрыскивание насаждений при высоте сорняков 10-15 см		
КЭ (125 /л) Фирма «Густ» 11/21/12/09	0,4-0,8	Свекла сахарная	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков	- (1)	7 (3)
	0,8-1,2		Многолетние злаковые сорняки (в т.ч. пырей)	Опрыскивание посевов при высоте пырея 10-15 см		

ИЩИДЫ

сум Г (0,05 г/кг) Алсико- пром» 11/01/10	0,005 % в приманке	Склады, хранилища, погреба, кормоцехи, защищенный грунт, хоз. постройки зерноперерабатывающие предприятия	Домовая мышь	Гранулы раскладывают по 6-8 г в приманочные ящики. Их ставят у каждого убежища, как внизу, так и на других уровнях в объекте. Порции восполняют в течение 2 недель по мере поедания	- (-)	- (-)
			Серая и черная крысы	Гранулы раскладывают по 30-60 г в приманочные ящики. Не менее 4-х в отсеке до 50 м ² . В более крупных помещениях и с внешней стороны объекта, интервал между смежными точками 10-15 м. Поедаемые порции восполняют на 7-й день. Общий срок борьбы - 2 недели		
		Зерновые озимые, многолетние травы	Мышевидные грызуны	Ручная раскладка гранулированной приманки по 5-8 г в каждую отдельно распложенную нору или одну из 2-3-х близко расположенных нор. Норма расхода: до 3 кг/га при высокой заселенности - 15-30 колоний/га (200-400 нор/га) и до 1 кг/га при низкой заселенности - до 10 колоний/га (100 нор/га). Обработки по мере необходимости		
	6	Все культуры	Обыкновенная и общественная полевки	Внесение в норы специальными ложками по 5 г по мере появления грызунов до полного заселения 1200 нор/га с интервалами не менее 16 суток, от обработки		

				до выпаса скота или уборки сена не менее 14 суток Обработки по мере необходимости		
Фен						
ВБ (0,05 /л) брикеты Ф Агро В.» 01/01/09	-	Склады, хранилища, погреба, кормоцехи, защищенный грунт, хоз. постройки	Домовая мышь	Раскладка по 0,3-0,5 брикета в каждый приманочный ящик. Их ставят как в низ, так и на других уровнях объекты. Минимальное расстояние между точками 2 м. Поедаемую приманку восполняют до 3 раз в течение 2 недель	- (2-3)	- (-
			Серая крыса	Раскладка по 2 брикета в каждый приманочный ящик. Не менее 4-х в отсеке размером до 50 м ² . В более крупных помещениях и с внешней стороны объекта интервал между смежными точками 10-15 м. Поедаемые порции восполняют 2 раза в течение 10 дней		
			Черная крыса	Раскладка по 2 брикета в каждый приманочный ящик. Не менее 4-х в отсеке размером до 50 м ² . В более крупных помещениях и с внешней стороны объекта интервал между смежными точками 10-15 м. Поедаемые порции восполняют 3 раза в течение 14 дней		

АНТЫ И ДЕСИКАНТЫ

1	2	3	4	5	6	7
цикланид						
КЭ (540 г/л) роп Сайенс» 01/01/09	2-2,5	Хлопчатник средневолокнистый	Ускорение созревания коробочек	Опрыскивание растений при раскрытии не менее 40-45 % коробочек	10-12 (1)	
	2,5-3	Хлопчатник тонковолокнистый		Опрыскивание растений при раскрытии не менее 50-55 % коробочек		

ТОРЫ РОСТА

гидролизованного белка+гуминовые в-ва+аминокислоты+растительные ингредиенты

оп, ВП (200	0,15-0,2	<u>Овощные культуры:</u>		Для всех культур:	10 (3)	-
-------------	----------	--------------------------	--	-------------------	--------	---

г/кг изованные + 12 г/кг е вещества 8 г/кг слоты + 50 нгредиенты 00 г/кг гельные диенты) Рамсайдс» 17/03/09		картофель, лук, морковь, томаты, огурцы, горох, бобы, капуста, перец, баклажаны, бахчевые и т.д. <u>Полевые</u> : хлопок, рис, зерновые, подсолнечник, кукуруза, соя и т.д. <u>Плодовые культуры</u> : яблоки, груши, персики, абрикосы, вишня, черешня, урюк, слива, виноград и т.д. <u>Декоративные цветочные культуры</u> : жасмин, розы, хризантемы и т.д.		Смешать с водой (200- 400 л/га) и опрыскать по зеленым растениям (листьям, побегам): 1-ое распыление - через 25-30 дней после посева/высадки рассады 2-ое и 3-е распыление - с интервалом 20-25 дней		
--	--	---	--	--	--	--

гидролизованного протеина+гуминовые и фульвиновые в-ва+аминокислоты+ растительные ингредиенты

Зандер, ВП 0 г/кг изованные ы + 12 г/кг овые и овые в-ва + г/кг слоты + 50 нгредиенты 00 г/кг гельные диенты) Рамсайдс» 17/03/09	2,5	<u>Овощные культуры</u> : картофель, лук, морковь, томаты, огурцы, горох, бобы, капуста, перец, баклажаны, бахчевые и т.д. <u>Полевые</u> : хлопок, рис, зерновые, подсолнечник, кукуруза, соя и т.д. <u>Плодовые культуры</u> : яблоки, груши, персики, абрикосы, вишня, черешня, урюк, слива, виноград и т.д. <u>Декоративные цветочные культуры</u> : жасмин, розы, хризантемы и т.д.		<u>1 способ</u> : Применять через 15-20 дней после посева/ высадки (или пересадки, рассады в грунт) как прикорневую подкормку - смешать с необходимым количеством сухого песка/ мин. удобрений/зола (а затем увлажнить почву) <u>2 способ</u> : Распылить за 7-10 дней перед цветением - смешать с водой (200- 400 л/га) и опрыскать по зеленым растениям (листьям, побегам)	10 (2)	-
---	-----	--	--	--	--------	---

грия

РП (300 г/л) ВП инком» 01/01/09 атрия, РП 0 г/л) «Аспан» 01/01/09	750 г/т	Пшеница озимая, ячмень яровой, овес, подсолнечник	Усиление роста растений, адаптация к неблагоприятным воздействиям погоды	Предпосевная инкрустация семян 7,5 %-ным рабочим раствором. Расход - 10 л/т	- (-)	- (-)
	600 г/т	Кукуруза	Снижение содержания нитратов	Предпосевная инкрустация семян 7,5 %-ным рабочим раствором. Расход - 10 л/т		
	35-40 г/т	Кукуруза на зеленую массу		Опрыскивание в фазе 3-5 листьев 0,017-0,02 %-ным рабочим раствором. Расход - 200 л/га		
	55-80 г/т	Пшеница озимая				

ия кислота + микро- макро элементы (высокомолекулярные производные аминокислот, органических и ненасыщенных алифатич

ВЭ (330- г/л) говая орация унсан»	При протравливании семян - 1 л/100- 120 л воды При опрыскивании -	Сахарная свекла	Усиление энергии прорастания и всхожести семян, фотосинтеза, увеличивает сопротивляемость к	Рабочий раствор - 20- 30 л/ 1 т семян. Протравленные семена увлажняют на 4-6 ч		
				Норма раб. раствора - 200-300 л/га.		

ИДР
17/03/10

1 л/1200 л воды		неблагоприятным условиям, болезням, гниению корней, повышает урожай и его качество, стимулирует рост и развитие растений.	Опрыскивание в фазе появления 3-4 листьев 1 раз, смыкания рядков 1 раз		
При протравливании семян - 1 л/100-120 л воды При опрыскивании - 1 л/1200 л воды	Пшеница яровая и озимая		Рабочий раствор - 20-30 л/ 1 т семян. Протравленные семена увлажняют на 4-6 ч		
			Норма раб. раствора - 200-300 л/га. Опрыскивание в фазе появления 3-4 листьев 1 раз, конце кущения 1 раз		
При протравливании семян - 1 л/100-120 л воды При опрыскивании - 1 л/1200 л воды	Кукуруза		Рабочий раствор - 20-30 л/1 т семян. Протравленные семена увлажняют на 4-6 ч		
			Норма раб. раствора - 200-300 л/га. Опрыскивание в фазе появления 3-4 листьев 1 раз		
При протравливании семян - 1 л/1200 л воды При опрыскивании - 1 л/1500 л воды	Перец		Рабочий раствор - 800 л/1 т семян. Протравленные семена замачивают в течение 10 ч, после чего сеют		
			Норма раб. раствора - 250 л/га. Опрыскивание перед цветением или пересаживания рассады - 1 раз		
При протравливании семян - 1 л/1200 л воды При опрыскивании - 1 л/1500 л воды	Томаты		Рабочий раствор - 800 л/1 т семян. Протравленные семена замачивают в течение 10 ч, после чего сеют		
			Норма раб. раствора - 250 л/га. Опрыскивание перед цветением или пересаживания рассады - 1 раз		
При протравливании семян - 1 л/1200 л воды При опрыскивании - 1 л/1500 л воды	Лук на репу		Рабочий раствор - 800 л/1 т семян. Протравленные семена замачивают в течение 10 ч, после чего сеют		
			Норма раб. раствора - 250 л/га. Опрыскивание перед появлением 3-4 настоящих листьев 1 раз		
При протравливании семян - 1 л/1200 л воды При опрыскивании - 1	Огурцы		Рабочий раствор - 500 л/1 т семян. Протравленные семена замачивают в течение 10 ч, после чего сеют		
			Норма раб. раствора -		

	л/1500 л воды			250 л/га. Опрыскивание в начале цветения 1 раз		
	При протравливании семян - 1 л/1200 л воды При опрыскивании - 1 л/1500 л воды	Соя		Рабочий раствор - 400-500 л/1 т семян. Протравленные семена замачивают до набухания, после чего сеют		
				Норма раб. раствора - 300 л/га. Опрыскивание в начале цветения 1 раз		
	При протравливании семян - 1 л/1200 л воды При опрыскивании - 1 л/1500 л воды	Картофель		Рабочий раствор - 300 л/1 т семян. Протравленные клубни замачивают в течение 6 ч, после чего сажают		
				Норма раб. раствора - 300 л/га. Опрыскивание в начале цветения 1 раз		
	При протравливании семян - 1 л/1200 л воды При опрыскивании - 1 л/1500 л воды	Баклажан		Рабочий раствор - 800 л/1 т семян. Протравленные клубни замачивают в течение 12 ч, после чего сеют		
				Норма раб. раствора - 300 л/га. Опрыскивание в начале цветения 1 раз		
	При протравливании семян - 1 л/1200 л воды При опрыскивании - 1 л/1500 л воды	Капуста		Рабочий раствор - 800 л/1 т семян. Протравленные клубни замачивают в течение 3 ч, после чего сеют		
				Норма раб. раствора - 200 л/га. Опрыскивание в период пересаживания рассад 1 раз, в начале образования качана 1 раз		
я кислота+экстракт водорослей+аскорбиновая кислота+аминокислоты+миоэнзим (катализатор)+тиамин (витамин B1)+альфа токоферол (витамин E)						
ВП (390 г/кг) мусовой + 250 г/кг экстракта водорослей + 200 г/кг аскорбиновой кислоты + 90 г/кг аминокислот + 40 г/кг миоэнзима (катализатор) + тиамина (витамин B1) + 10 г/кг альфа токоферола	0,125			1 способ: Применять через 15-20 дней после посева/высадки (или пересадки, рассады в грунт), как прикорневую подкормку - смешать с мин. удобрениями/песком или золой 2 способ: 1 распыление - за 7-10 дней перед цветением (125 гр/га на 200-400 л воды). 2 распыление - через 20-25 дней после 1-го (125 гр/га на 200-400 л	30 (3)	

мин Е) ОО сайдс» 12/12/07				воды) 3 способ: перед высадкой - замачивание на 15 минут корней рассады/ посевного материала перед высадкой (125 гр/ расход семян на га)		
гхлорид						
Р (50 г/л) Ф СЕ.» 21/12/09	1-1,5	Хлопчатник	Ускорение созревания коробочек	Опрыскивание двукратное: в начале цветения и в период массового цветения 0,4-0,6 % раствором препарата. Расход рабочего раствора 250 л/га		
изол						
Голд, ВК 0 г/л) ОО сайдс» 12/12/07	0,625	<u>Овощные культуры - не корнеплоды:</u> томаты, огурцы, горох, бобы, капуста цветная и брюссельская, тыква, арбузы, перец, баклажаны, бахчевые и т.д. <u>Плодовые культуры:</u> яблони, груши, персики, абрикосы, вишня, черешня, урюк, слива, виноград и т.д. <u>Декоративные цветочные культуры:</u> жасмин, розы, хризантемы и т.д. <u>Полевые:</u> хлопок, рис, зерновые, подсолнечник, кукуруза, соя и т.д.		<u>Для овощных культур - не корнеплодов, фруктовых и декоративных культур</u> Смешать с водой 200- 400 л/га и распылять - 1-ая обработка за 7-10 дней до цветения, 2-ая обработка - через 20-25 дней после 1-й обработки <u>Для овощных (корнеплодов) и полевых культур -</u> распылять с интервалом 20-25 дней после 1-й обработки гранулами	30 (2)	-
Голд, Г (кг) ОоОО йдс» VIII- 2/12/07	5	<u>Овощные культуры - корнеплоды:</u> картофель, лук, морковь, редька, редис, свекла сахарная и кормовая и т.д. <u>Полевые:</u> хлопок , рис, зерновые, подсолнечник, кукуруза, соя и т.д.		<u>Для овощных - (корнеплодов) и полевых культур</u> Прикорневая подкормка - смешать с необходимым количеством сухого песка/мин. удобрений/зола и обработать через 10-25 дней после высадки/посева культуры	30 (1)	
новые кислоты						
д, ВЭ (100 /л) О НПП мзащита» 01/01/05	0,05	Томаты	Повышение устойчивости к фитофторозу, черной бактериальной пятнистости	Опрыскивание в фазе цветения 1, 2 и 3 кистей. Расход - 300 л/га	- (3)	- (-)
д, ВЭ (100 /л) Алиско-	0,1	Лук на семена	Повышение устойчивости к пероноспорозу	Опрыскивание в фазе массового стрелкования, через 7 дней после первой обработки и через 7 дней после второй		

			обработки. Расход - 300 л/га	
	Лук на репку		Опрыскивание в фазе 4 листьев и через 15 дней после первой обработки. Расход -300 л/га	- (2)
	Картофель	Повышение устойчивости к фитофторозу	Опрыскивание в фазы начала цветения, в период массового цветения и через 7 дней второй обработки. Расход - 300 л/га	- (3)
0,015	Огурцы	Повышение урожайности, увеличение выхода стандартных плодов, содержания сахара и витамина С, повышение устойчивости к болезням	Опрыскивание в фазе 2-4 настоящих листьев, начала цветения, массового цветения и через 7 дней после третьей обработки. Расход - 300 л/га	- (4)
0,04	Капуста белокочанная	Повышение урожайности, увеличение содержания сахара и витамина С, выхода товарных кочанов	Опрыскивание в фазе 6-7 листьев и в фазе массового завязывания кочанов. Расход - 300 л/га	- (2)
0,02	Соя	Повышение урожайности, увеличение масличности семян	Опрыскивание в фазе начала цветения. Расход - 300 л/га	- (1)
	Фасоль	Повышения урожайности и устойчивости к болезням, ускорение биологической спелости	Опрыскивание в фазе начала цветения, массового цветения и через 7 дней после второй обработки. Расход - 300 л/га	- (3)
0,03	Свекла сахарная	Повышение устойчивости к церкоспорозу, мучнистой росе, пероноспорозу, ржавчине	Опрыскивание в фазе 8-10 настоящих листьев и через 15 дней после первой обработки. Расход - 300 л/га	- (2)
0,075	Хлопчатник	Повышение урожайности, масличности семян, улучшение качества волокна, повышение устойчивости к заболеваниям, ускорение созревания	Опрыскивание в фазе начала бутонизации и начала цветения. Расход - 300 л/га	
0,04	Подсолнечник	Повышение урожайности, масличности семян, повышение устойчивости к заболеваниям, ускорение созревания	Опрыскивание в фазе 2-4 листьев и начала цветения. Расход - 300 л/га	
0,05	Люцерна на семена	Повышение урожайности, ускорение созревания	Опрыскивание в фазе начала бутонизации и массового цветения. Расход - 300 л/га	

		Гречиха	Повышение урожайности и зеленой массы, ускорение созревания	Опрыскивание в фазе начала раскрытия цветков нижних соцветий и массового цветения		
		Ячмень	Повышение урожайности семян и ускорение созревания	Обработка семян. Расход - 10 л/т		
				Опрыскивание в фазе кущения. Расход - 300 л/га		
	0,06	Овес	Повышение урожайности и	Обработка семян. Расход - 10 л/т		
	0,05		устойчивости к заболеваниям, ускорение созревания	Опрыскивание в фазе кущения. Расход - 300 л/га		
		Рис	Повышение урожайности и ускорение созревания	Обработка семян. Расход - 10 л/т		
		Кукуруза	Повышение урожайности и устойчивости к заболеваниям, ускорения созревания	Обработка семян. Расход - 10 л/т		
				Опрыскивание в фазе 5-6 листьев. Расход - 300 л/га		
		Виноград	Повышение урожайности, увеличение массы грозди, повышение сахаристости	Опрыскивание цветения и через 15-25 дней после первого. Расход - 300 л/га		
		Пшеница яровая и озимая	Повышение устойчивости к фузариозно-гельминтоспориозным корневым гнилям	Предпосевная обработка семян. Расход - 300 л/га		
	0,030	Пшеница озимая	Повышение устойчивости к фузариозу колоса, септориозу колоса и листьев, мучнистой росе	Опрыскивание в фазе кущения и колошения. Расход - 300 л/га		

инналид

ин, Р Эстер М» 01/01/09	1 мл/0,25 л воды (Л)	Картофель	Улучшение клубнеобразования, повышение урожайности и пищевой (питательной) ценности клубней, стимулирование иммунной системы, повышение устойчивости к фитофторозу, снижение аккумуляции нитратов, солей тяжелых металлов и радионуклидов	Предпосевная обработка клубней. Расход - 0,25 л/50 кг	- (-)	- (-)
	1 мл/5 л воды (Л)			Опрыскивание в фазе бутонизации. Расход - 3л /100 м ²	- (1)	
	0,5 мл/2 л воды (Л)	Томаты открытого грунта	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление защитных свойств к неблагоприятным условиям внешней среды	Замачивание семян на 2 часа. Расход - 2 л/кг	- (-)	

1 мл/5 л воды (Л)		Увеличение количества завязей, предотвращение их опадения, ускорение созревания плодов и улучшения их качества, повышение устойчивости к заболеваниям, фунгипротекторное действие, снижение аккумуляции радионуклидов, нитратов, солей тяжелых металлов	Дополнительное опрыскивание в фазе бутонизации - начала цветения 1-й кисти. Расход -3-4 л/100м ²	
0,5 мл/5 л воды (Л)	Томаты защищенного грунта	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление защитных свойств к неблагоприятным условиям внешней среды	Замачивание семян на 2 часа. Расход - 2 л/кг	
1 мл/5 л воды (Л)		Увеличение количества завязей, предотвращение их опадения, ускорение созревания плодов и улучшения их качества, повышение устойчивости к заболеваниям, фунгипротекторное действие, снижение аккумуляции радионуклидов, нитратов, солей тяжелых металлов	Дополнительное опрыскивание в фазе начала бутонизации и в фазе цветения 1-й кисти. Расход - 3-4 л/100 м ²	- (2)
0,25 мл/л воды (Л)	Огурцы открытого грунта	Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление защитных свойств к неблагоприятным условиям внешней среды	Замачивание семян на 2 часа. Расход - 2 л/кг	- (-)
1 мл/5 л воды (Л)		Ускорение образования и предотвращения опадения завязей, повышение раннего и общего урожая, стимулирование иммунной системы, повышение устойчивости к пероноспорозу, снижение содержания нитратов и накопления тяжелых металлов	Дополнительное опрыскивание в фазе 2-3 настоящих листьев и повторно в фазе бутонизации. Расход - 3-4 л/100м ²	- (2)
2 мл/5л воды (Л)	Яблоня	Стимулирование образования завязей, предотвращения их опадения, повышение урожайности и	Опрыскивание по розовому бутону и повторно после цветения с интервалом 20 дней. Расход - 5-6	

			засухоустойчивости, стимулировать иммунной системы, повышение устойчивости к парше обыкновенной, снижение содержания радионуклидов и накопления тяжелых металлов	л/100м ²		
0,1 мл/2 л воды (Л)	Перцы защищенного грунта		Повышение энергии прорастания и всхожести, усиление защитных свойств к неблагоприятным условиям внешней среды	Замачивание семян на 2 часа. Расход - 2 л/кг	- (-)	
1 мл/5 л воды (Л)			Ускорение образования завязей и предотвращения и опадения, повышение урожайности, стимулировать иммунной системы, снижение содержания радионуклидов и накопления солей тяжелых металлов	Дополнительное опрыскивание в фазе начала бутонизации и повторно в фазе цветения. Расход - 3-4 л/100 м ²	- (2)	
0,25 мл/л воды (Л)	Розы		Ускорение корнеобразования у черенков и повышение их качества	Замачивание зеленых черенков на 12-14 часов	- (-)	

ФИЗИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

1	2	3	4	5	6	7
ЭНШ, Ж. не менее 4 п/эдров/мл я защиты аалал-Абад, ызстан	0,025(А)	Лиственные породы	Непарный шелкопряд (гусеницы 1-2 возраста)	Опрыскивание в период вегетации	- (1)	- (1)
	0,002-0,002/1 кладку (А)			Опрыскивание яйцекладок		
Вирин ЯП, р не менее гранул/г) кыргызское "ITKTR okyrg" 06/12/10	0,001	Яблоня, груша	Яблонная плодожорка (гусеницы)	Опрыскивание в период вегетации Расход рабочей жидкости 500-1000 л/га	- (6)	
и, живые и споры енного мицета omyces gn-2 (3x10 ⁹ клеток и рр/л) «кобилим» 16/04/10		Посевные материалы (семена, рассады) овощных, зерновых и технических культур	Корневые гнили, альтернариоз, фузариоз, вилт, парша и др. грибковые заболевания	Сухой препарат в кол-ве 50 г заливают 200 мл воды, выдерживают 1 час, затем фильтруют и доводят объем водой до 5 л, размешивают до получения однородной суспензии. 1 л суспензии достаточно для погружения 1 кг семян пшеницы и ячменя, 500 мл суспензии - 1 кг семян	- (2)	

				перца. Выдерживают семена в суспензии от 2 до 4 часов. Слегка просушивают семена при теневой поверхности до состояния сыпучести.		
Sporothrix 2.0 % A.S. IPL/FS/87 KOE: не х 10 ⁸ мл) рнэшнл дея Лтд» ндия 5/08/11	2,5-3	Яблоня, хлопчатник, овощи, декоративные растения	Клещи	Опрыскивание производить 2-3 раза, в зависимости от степени заражения, начиная с момента плодоношения, с интервалом 10-15 дней		
настра, um lecanii . Штамм № 05 (Число менее 2 х 8 мл) рнэшнл дея Лтд» ндия 5/08/11	1,5	Виноград	Червец мучнистый, щитовки	Для эффективного действия препарата необходим высокий уровень влажности. Опрыскивание следует проводить в вечерние часы. На томате в стадии формирования цветка опрыскивание производить 2 раза с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости 500 л/га.		
		Яблоня, абрикос, вишня, груша, слива, персик	Червец мучнистый, щитовки, в т.ч. калифорнийская, тли,			
		Картофель, томаты	Тли, белокрылки			
астра, rhizium 2.0 % A.S. IPL/KC/05 KOE: не х 10 ⁸ мл) рнэшнл дея Лтд» ндия 5/08/11	2,5	Пшеница, ячмень, перец, земляной орех	Корнеобитающие черви, термиты	Для эффективного действия препарата необходим высокий уровень влажности. Опрыскивание следует проводить в вечерние часы. При поливе почвы рабочим раствором препарата - производить в стадии развития сельхозкультур, 2 раза с интервалом 15 дней. Расход рабочей жидкости 1000 л/га		
	2,5	Яблоня, абрикос, вишня, груша, слива, персик	Тли			
	2,5	Картофель	Совки, колорадский жук			
а, Bacillus ensis var. 5.0 % W.P. DOR Bt-1 - 3 а, 3 б, 3 с) рнэшнл дея Лтд» ндия 5/08/11	2,5-5	Томат	Хлопковая совка	Добавить необходимое количество препарата в 3-4 л воды и настаивать 15-20 мин. Тщательно размешать для хорошей экстракции. Профильтровать раствор через ткань 2 раза. Довести фильтрат до необходимого объема с помощью воды и равномерно опрыскивать по культурам. В зависимости от вредителя, опрыскивание можно		
		Хлопчатник	Черви, совки			
		Капуста	Совки			
		Баклажан				
		Яблоня, абрикос, груша	Гусеницы яблонной плодожорки			

				проводить 2-3 раза с недельным и двухнедельным интервалом.		
, Beauveria 2.0 % A.S. мм № П/01 (Число менее 2 x 8 мл) рнэшнл дея Лтд» дия 5/08/11	1,5	Томат	Хлопковая совка	Для эффективного воздействия препарата необходим высокий уровень влажности. Опрыскивание следует проводить в вечерние часы. 2-разовый полив почвы препаратом на томате в стадии формирования плода с интервалом 10 дней.		
	2,5-5	Хлопчатник	Черви, совки			
	2,5	Капуста	Совки			
		Баклажан				
	2,5-5	Яблоня, абрикос, груша	Гусеницы яблонной плодожорки			
тофри, ces lilacinus Р (Число менее 2 x 6 мл) рнэшнл дея Лтд» дия 25/08/11	2,5-5	Перцы, томаты, баклажаны, лук	Клубеньковые нематоды			
тгвайт, omopas s 2.0 % A.S. e IPL/PS-01 КОЕ: не x 10 ⁸ мл) рнэшнл дея Лтд» дия 5/08/11	100 мл/кг семян	Перец	Черная ножка	Протравка семян: непосредственно перед посевом смешать необходимое кол-во препарата с минимальным количеством воды, равномерно нанести на семена, высушить в тени.		
	2500 мл/га			Обработка почвы: смешать 2500 мл препарата со 100 кг навоза за неделю до использования и равномерно разбросать на один гектар		
	2500-5000 мл/га	Цитрус	Увядание	Смешать необходимое кол-во препарата со 100-150 кг навоза или почвы и разбросать на поле перед орошением		
	2500 мл/га	Яблоня, абрикос, вишня, груша, слива, персик	Увядание	Обработка почвы: смешать 2500 мл препарата со 100 кг навоза за неделю до использования и равномерно разбросать на один гектар		
	10 мл/ 1 л воды		Бактериоз, мучнистая роса	Внекорневое опрыскивание с 10-дневным интервалом, 2-3 опрыскивания в зависимости от развития заболевания		
	5-10 мл/1 л. воды	Картофель	Альтернариоз, фузариоз	Внекорневое опрыскивание при		
		Хлопчатник	Гоммоз			

		Томаты	Альтернариоз	появлении первых признаков заболевания и повторное опрыскивание с интервалом 10 дней, в зависимости от развития заболевания		
		Тыквенные	Антракноз			
		Гороховые	Мучнистая роса			
		Капуста	Сосудистый бактериоз			
Trichoderma n 2.0 % A.S. имм № 102 (Число менее 2 х 10 ⁸ мл) «Прэншнл дея ЛТд» Индия 5/08/11	10 мл/кг семян	Томаты	Черная ножка	Смешать необходимое кол-во препарата со 100-150 кг навоза с минимальным кол-вом воды, равномерно нанести на семена, высушить в тени		
	2500 мл/га	Яблоня, абрикос, вишня, груша, слива, персик	Увядание	Смешать 2500 мл препарата со 100 кг навоза за неделю до использования и равномерно разбросать на один гектар		
				Распространить вышеуказанную смесь на основном поле в действующей корневой зоне плодовых деревьев		
	10 мл/кг семян	Баклажан	Черная ножка	Непосредственно перед посевом смешать необходимое кол-во препарата с минимальным количеством воды, равномерно нанести на семена, высушить в тени.		
	2500-5000 мл/га	Хлопчатник	Увядание	Смешать необходимое кол-во препарата со 100-150 кг навоза или почвы и разбросать на поле перед орошением		
		Цитрус	Увядание			
		Стручковый перец	Черная ножка, увядание, гниль			
«Кивни, na viride 1.0	3 г/1 кг семян	Капуста	Стеблевая гниль	Протравка семян. Сделать жидкую		

Штамм №
101 (Число
менее 2 х
9 мл)
«Рнэшил
деа Лтд»
дия
5/08/11

			пасту, смешав необходимое кол- во раствора с минимальным количеством воды, равномерно нанести на семена, высушить в тени непосредственно перед посевом.	
2,5 кг/га			Обработка почвы: Смешать 2,5 кг препарата с 62,5 кг навоза за неделю до использования и равномерно разбросать на одном гектаре	
5 г/кг	Баклажан	Корневая гниль, увядание, черная ножка	Протравка семян: Сделать жидкую пасту, смешав необходимое кол- во раствора с минимальным количеством воды, равномерно нанести на семена, высушить в тени непосредственно перед посевом.	
250 г/50 л воды на 400 кв. м.			Обработка почвы: Смешать 2,5 кг препарата с 62,5 кг навоза за неделю до использования и равномерно разбросать на одном гектаре	
			Обработка теплицы: Смешать 10 г препарата в одном литре воды и погрузить корни рассады в течение 15 минут	
2,5 кг/га			Обработка почвы: Смешать 2,5 кг препарата с 62,5 кг навоза за неделю до использования и равномерно	

			разбросать на одном гектаре		
10 гр/1 л воды	Капуста	Корневая гниль, гниль	Обработка корней рассады погружением: Смешать 10 г препарата в одном литре воды и погрузить корни рассады в течение 15 минут		
2,5 кг/га			Обработка почвы: Смешать 2,5 кг препарата с 62,5 кг навоза за неделю до использования и равномерно разбросать на одном гектаре		
25-50 г/дереву	Яблоня, абрикос, вишня	Увядание	Смешать препарат с навозом или почвой и распределить в активной зоне деревя, полить после применения		
2,5 кг/га	Хлопчатник	Увядание	Смешать препарат с навозом или почвой и распределить на активные зоны растения, полить после применения		
	Перец	Гнили	Смешать препарат с навозом или почвой и распределить на активные зоны растения, полить после применения		
10 мл/кг семян	Баклажан	Черная ножка	Протравка семян: Непосредственно перед посевом смешать необходимое кол- во препарата с минимальным количеством воды, равномерно нанести на семена, высушить в тени.		
10 мл/1 л воды	Яблоня, абрикос, вишня, груша, слива, персик	Бактериоз, мучнистая роса	Внекорневое		

			опрыскивание 2-3 раза с интервалом 10 дней в зависимости от развития заболевания	
5-10 мл/1 л воды	Картофель	Альтернариоз	Внекорневое опрыскивание при появлении первых признаков заболевания и повторное опрыскивание с интервалом 10 дней, в зависимости от развития заболевания	
	Хлопчатник	Гоммоз		
	Томаты	Альтернариоз		
	Тыквенные	Антракноз, пятнистость листьев		
	Горох	Мучнистая роса		
	Капуста	Сосудистый бактериоз		
	Виноград	Милдью, антракноз		
	Гранат	Пятнистость листьев		

Удобрения минеральные, в том числе комплексные (NPK), с добавлением микроэлементов (NPK) + микроэлементы

Формы удобрений	Содержание основного вещества, %		
	N	Na	CaO
Минеральные удобрения			
I. Азотные удобрения			
1. Аммиачная селитра (нитрат аммония, азотнокислый аммоний (NH ₄ NO ₃))	>34		
2. Известково-аммиачная селитра (кальциево-аммиачная селитра, NH ₄ NO ₃ +Ca CO ₃)	17-28		
3. Карбамид (мочевина, амид карбоминовой кислоты, CO(NH ₂) ₂)	>46		
4. Сульфат аммония (сернокислый аммоний (NH ₄) ₂ SO ₄)	20,5-21,0		
5. Сульфат аммония-натрия (NH ₄) ₂ SO ₄ +Na ₂ SO ₄)	17,5	8	
6. Хлористый аммоний (NH ₄ CL)	24-25		
7. Натриевая селитра (нитрат натрия, азотнокислый натрий, чилийская селитра, NaNO ₃)	16-16,4	26	
8. Кальциевая селитра (нитрат кальция, азотнокислый кальций, норвежская селитра, Ca(MO ₃) ₂)	17,5		
9. Цианамид кальция (CaCN ₂)	19-20		18-28
Медленно действующие удобрения			
10. Мочевино-формальдегидное удобрение (МФУ, карбамидформ, уреаформ, азорган)	38-42		
11. Мочевино-ацетальдегидное удобрение (уреа-Z)	31,4		
12. Кротонилидендимочевина (КДМ, кротодур)	32,5		
13. Изобутилидендимочевина - препарат (ИБДМ, (CH ₃) ₂ - CH-CH (NHCONH ₂) ₂)	32,2		
Оксамид (диамид щавелевой кислоты, (CONH ₂) ₂)	31,8		
Жидкие удобрения			
15. Водный аммиак (аммиачная вода NH ₄ OH)	18-20,5		
16. Сжиженный безводный аммиак (аммиак жидкий, NH ₃)	82,2		
17. Аммиакаты (растворы азотсодержащих солей в концентрированном водном аммиаке)	35-45		
18. Углеаммиакаты (водные растворы карбоната, бикарбоната аммония и мочевины)	18-35		
19. Сульфат-нитрат аммония (NH ₄ NO ₃ *(NH ₄) ₂ SO ₄)	25-27		
II. Фосфорные удобрения	P ₂ O ₅	N	MgO

1. Суперфосфат простой порошковидный из апатитового концентрата ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + 2\text{CaSO}_4$)	19-20+/-1		
2. Суперфосфат гранулированный из апатитового концентрата ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + 2\text{CaSO}_4$)	20+/-1		
3. Аммонизированный суперфосфат из фосфоритов Каратау ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O} + \text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)	15+/-1	1,5-2,5	
4. Суперфосфат двойной гранулированный ($\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$)	43-49+/-1		
5. Томасшлак ($4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5 + 4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5 \cdot \text{CaSiO}_3$)	14-20		
6. Мартеновский фосфослак ($4\text{CaO} + \text{P}_2\text{O}_5 \cdot \text{CaSiO}_3$)	10-12		
7. Термофосфат ($\text{Na}_2\text{O} \cdot 3\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5 + \text{ClSiO}_2$)	20-30		
8. Обесфторенный фосфат из апатитов ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5 \cdot \text{CaSiO}_3$)	30-32		
9. Обесфторенный фосфат из фосфоритов Каратау ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + 4\text{CaO} \cdot \text{P}_2\text{O}_5 \cdot \text{CaSiO}_3$)	22-28		
10. Преципитат (фосфат осажденный и удобрительный) ($\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	22-37		
11. Плавленный магниевый фосфат ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 + \text{MgSiO}_3$)	19-21		8-14
12. Матафосфат кальция ($\text{Ca}(\text{PO}_3)_2$)	63-18		
13. Фосфоритная мука ($\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaCO}_2 + \text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaF}_2$)	19-30		
14. Костная мука (фосфорин, $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2 \cdot \text{CaCO}_2$)	30		
15. Фосфат кормовой	36		
16. Фосфат кормовой из фосфоритов Каратау	25		
III. Калийные удобрения	K₂O	P₂O₅	MgO
1. Хлористый калий (KCl)	53,6-62,5		
2. Калий хлористый непылящий (KCl)	60		
3. Калий хлористый крупнозернистый (KCl)	54		
4. Калий хлористый крупнокристаллический (KCl)	60		
5. Калий хлористый из нефелинового сырья (KCl)	60		
6. Калий хлористый гранулированный (KCl)	58-60		
7. Калий хлористый мелкозернистый (KCl)	58-60		
8. Калий хлористый обеспыленный (KCl)	58-60		
9. Хлористый калий электролит ($\text{KCl} + \text{NaCl} + \text{MgCl}_2$)	45		
10. Калийная соль ($\text{KCl} \cdot \text{NaCl}$)	40-50		
11. Калийно-магниевый концентрат ($\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot 2\text{MgSO}_4 + \text{NaCl} + \text{CaSO}_4$)	17,5-19,5		9
12. Калимагнезия гранулированная (шенил, $\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{MgSO}_4$)	28		8
13. Калий сернокислый (сульфат калия K_2SO_4)	46-60		
14. Сильвинит ($\text{mKCl} + \text{nNaCl}$)	12-15		
15. Каинит ($\text{KCl} \cdot 2\text{MgSO}_4 \cdot 3\text{H}_2\text{O} + \text{NaCl}$)	9,5-10,5		6-7
16. Карналит ($\text{KCl} \cdot \text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O} + \text{NaCl}$)	12-13		14
17. Углекислый калий (поташ K_2CO_3)	55-56		
18. Цементная калийная пыль ($\text{K}_2\text{SO}_4 + \text{CaSO}_4 + \text{SiO}_2$)	10-15		
19. Зола ($\text{K}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}_4\text{P}_2\text{O}_9 + \text{SiO}_2$)	9,4-22,6	3,4-8,6	
20. Метафосфат калия (KPO_3)	40	60	
21. Полигалит ($\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{MgSO}_4 \cdot 2\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	10		5
22. Селитра калиевая (KNO_3)	46,4-46,5	N-13,8	
23. Калий хлористый с медью ($\text{KCl} + \text{Cu}$)	52	Cu: 0,7- 1,5	
IV. Комплексные удобрения	N	P₂O₅	K₂O
1. Аммофос ($\text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4$)	10	42-52	
2. Сульфоаммофос	12	25-39	
3. Аммофос порошковый из фосфоритного сырья	11	46-50+/-1	
4. Нитрофоска ($\text{CaHPO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O} \cdot \text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_4)_2 \cdot \text{NH}_4\text{NO}_3 \cdot \text{NH}_4\text{Cl} \cdot \text{KCl} \cdot \text{KNO}_3 \cdot \text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	11	10	11
5. Нитрофос ($\text{CaHPO}_4 \cdot \text{MgHPO}_4 \cdot \text{NH}_4\text{H}_2\text{PO}_4 \cdot \text{CaO} \cdot 5\text{H}_2\text{O} \cdot \text{NH}_4\text{NO}_3$)	22-24	14-22+/-1	
6. Нитроаммофос	16-25	20-24	

7. Нитроаммофоска	13-17+/-1	17+/-1	17+/-1
8. Карбоаммофос	19-32	16-30	
9. Карбоаммофоска	17-20	17-20	17-20
10. Удобрения жидкие комплексные (суспензионные)	6,5-15	12-30	10-15
11. Удобрения сложно-смешанные гранулированные	0-11	16-59	0-15
12. Фосфаты мочевины (Co(MH ₂) ₂ *H ₃ P0 ₄)	17,8-34,2	30,4-44,9	
13. Жидкий аммонийфосфат	10	34	
14. Полифосфат аммония (ПФА)	12-16	59-60	
15. Диаммоний фосфат кормовой (трикальций фосфат)	>19	52	
16. Пирофосфат калия		43	57
17. Триполифосфат калия		48	46-51
18. Монокалийортофосфат (KH ₂ P0 ₄)		52,2	34,6
19. Метафосфат калия (KPO ₃) ₄		53-59	37-39
20. Полифоска бесхлорная		35-40	6-10
21. Азофоска	>16	>16	>16
22. Полифид	23	7	23
V. Микроудобрения	Содержание основного вещества, 0/)		
Борные удобрения			
1. Борат магния	H ₃ BO ₃	9-11	
2. Удобрение борнодатолитовое	H ₃ BO ₃	13	
3. Боросуперфосфат гранулированный (H ₃ BO ₃)	P ₂ O ₅ B	20 +/- 1 0,2 +/-0,05	
4. Двойной суперфосфат с бором (H ₃ BO ₃)	P ₂ O ₅ B	43+/-1 0,4+/-0,05	
5. Порошок, содержащий бор (H ₃ BO ₃)	H ₃ BO ₃ B	14-16	
Формы удобрений	элементы	содержание основного вещества, %	
6. Борная кислота (H ₃ BO ₃)	H ₃ BO ₃ B	97 17,1	
7. Бура (Na ₂ B ₄ O ₇ * 10H ₂ O)	B	11,3	
8. Бормагннеевое удобрение (H ₃ BO ₃)	(H ₃ BO ₃) B MgO	13 2,27 14	
9. Борный концентрат (H ₃ BO ₃)	B	3,5	
Молибденовые удобрения			
10. Аммоний молибденовокислый ((NH ₄) ₂ MOO ₄)	MO	50	
11. Молибден аммония-натрия ((NH ₄) ₂ MO0 ₄ * NAMO0 ₄)	MO	36	
12. Порошок, содержащий молибден (MoOз)	MoO3	14,5-16,5	
13. Суперфосфат простой гранулированный с молибденом	P ₂ O ₅ MO	20+/-1 0.1	
14. Суперфосфат двойной гранулированный с молибденом	P ₂ O ₅ Mo	43+/-1 0,2+/-0,05	
Медные удобрения			
17. Медный купорос (CuS0 ₄ * 5H ₂ O)	Cu	23,4-24,9	
18. Порошок, содержащий медь	CU	5-6	
19. Пиритные (колчеданные) огарки	CU	0,25	
20. Медно-калийные удобрения	K ₂ O Cu	56,8+/-0,6 1+/-0,2	
Цинковые удобрения			
21. Сернокислый цинк (сульфат цинка , ZnSO ₄ *7H ₂ O)	Zn	21,8-22,5	
22. Цинковое полимикроудобрение (ПМУ-7)	Zn	25	
23. Порошок, содержащий цинк	ZnSO ₄	18-22	
Марганцевые удобрения			
24. Марганезированный суперфосфат	P ₂ O ₅ Mn	20+/-1 1-2	

25. Порошок, содержащий марганец	MnSO ₄	18-22
26. Сернокислый марганец (сульфат марганца, MnSO ₄)	MnSO ₄ Mn	70 21-24
27. Марганцевый шлам	Mn	9-15
Магниевые удобрения		
28. Магниевый плавленый фосфат (оСа ₃ (P ₀ ₄) ₂ * MgSiO ₃)	MgO P ₂ O ₅	12 20
29. Доломитовая мука (CaCO ₃ * MgCO ₃)	MgO CaO	12 28
30. Доломитизированный известняк (CaCO ₃ * MgCO ₃)	MgO CaO	12-18 27-36
31. Полуобожженный доломит (CaCO ₃ * MgO)	MgO CaO CaCO ₃	27 7 57
32. Дунитовая мука (Mg ₂ SiO ₄ * FeSiO ₄)	MgO	45
33. Доломит+аммиачная селитра (CaCO ₃ *MgCO ₃ + NH ₄ NO ₃)	MgO CaO N	10 14 17
34. Жженая магнезия (MgO)	MgO	>89
35. Серпентинитовая мука (Mg ₃ H ₄ Si ₂ O ₃)	MgO	≤45
36. Вермикулит (гидрослюда, Mg _x (Mg,Fe ₂) _{3-x} [AlSiO ₁₀]*(OH) ₂ *4H ₂ O)	MgO K ₂ O	14- 30 ≤5
37. Эпсомит (сульфат магния) (MgO ₄ * 7H ₂ O)	MgO	13,7
38. Калимаг (калийно-магниевый концентрат, K ₂ SO ₄ * 2MgSO ₄)	MgO K ₂ O	9 17.5-19,5
39. Калимагнезия (шениг K ₂ SO ₄ * MgSO ₄ * 6H ₂ O)	MgO K ₂ O	8-10 28-30
40. Каинит (KCl*2MgSO ₄ * 3H ₂ O + NaCl)	MgO	10
41. Аммошениг ((NH ₄)SO ₄ * MgSO ₄ * 6H ₂ O)	MgO N	>10 7
42. Полигалит (K ₂ SO ₄ *MgSO ₄ * 2CaSO ₄ * 2H ₂ O)	MgO	5
43. Карналлит (KCl * MgCl ₂ * 6H ₂ O+ NaCl)	MgO	14
44. Магнезия (MgCO ₃)	MgO	45
Серные удобрения		
45. Гипс сыромолотый (CaSO ₄ *2H ₂ O)	CaSO ₄	92
46. Фосфогипс (CaSO ₄ * 2H ₂ O)	CaSO ₄	80-92
Железные удобрения		
47. Железный купорос (FeSO ₄ * 7H ₂ O)	FeSO ₄	47-53
48. Хелаты железа (Fe ДТНУ) (Fe ПННУ)	Fe ДТНУ Fe ПННУ	>10 > 7
49. Магний-аммонийфосфат (MgNH ₄ P ₀ ₄ * 6H ₂ O)	N P ₂ O ₅ MgO	19 45,7 25,9
50. Кристаллин (растворин)	N P ₂ O ₅ K ₂ O	10-20 5-40 10-20

Удобрения органо-минеральные, органо-минеральные + микроэлементы

С - разрешен для применения только в сельскохозяйственном производстве

ЛС - разрешен для применения в сельскохозяйственном производстве и в личных подсобных хозяйствах

Л - разрешен для применения только в личных подсобных хозяйствах

Название (марка)	Культура	Доза применения	Время, особенности применения
1	2	3	4
(Л), Агрикола	Агрикола-1		

универсальное комплексное удобрение Марка 1 Марка 2 Марка 3 Марка 4 Марка 5 Марка 6 Марка 7 Марка Для декоративно- листных растений Марка Для кактусов и суккулентов Марка Для комнатных и садовых роз Марка Для пальм Марка Для фикусов Марка Для цветущих растений Марка Для комнатных растений Марка Для ягодных культур	Капуста белокочанная, краснокочанная и цветная	25 г/10 л воды Расход рабочей жидкости при поливе - 1-3 л/м ² , при опрыскивании - 3 л/100 м ²	Корневые и некорневые подкормки: 1-я - через 2 недели после высадки рассады, последующие - с интервалом 10-14 дней
	Агрикола-2		
	Лук на репку, чеснок. Кроме лука на “перо”	25 г/10 л воды Расход рабочей жидкости при поливе - 1-3 л/м ² , при опрыскивании - 3 л/100 м ²	Корневые и некорневые подкормки: 1-я - через 2 недели после высадки рассады, последующие - с интервалом 10-14 дней
	Агрикола-3		
	Томат, перец, баклажан	25 г/10 л воды Расход рабочей жидкости при поливе - 1-3 л/м ² , при опрыскивании - 3 л/100 м ²	Корневые и некорневые подкормки: 1-я - через 2 недели после высадки рассады, последующие - с интервалом 10-14 дней
	Агрикола-4		
	Морковь, свекла, редис	25 г/10 л воды Расход рабочей жидкости при поливе - 1-3 л/м ² , при опрыскивании - 3 л/100 м ²	Корневые и некорневые подкормки: 1-я - после появления всходов, последующие - с интервалом 10-14 дней
	Агрикола-5		
	Огурец, кабачок, патиссон, дыня	25 г/10 л воды Расход рабочей жидкости при поливе - 1-3 л/м ² , при опрыскивании - 3 л/100 м ²	Корневые и некорневые подкормки: 1-я - через 2 недели после высадки рассады, последующие - с интервалом 10-14 дней
	Агрикола-6		
Рассада овощных культур	25 г/10 л воды	Корневые и некорневые подкормки:	
	Расход рабочей жидкости при опрыскивании - 1 л/30 м ² , при поливе - 1-3 л/м ²	1-я - через 10-14 дней после пикировки (пересадки семян), последующие - с интервалом 7-10 дней	
Агрикола-7			
Комнатные и балконные цветочные культуры	5 г/2 л воды	Корневые подкормки с интервалом 7-10 дней. С ноября по февраль - 1 раз в месяц	
		Некорневые подкормки с интервалом 20-30 дней	
Садовые цветочные культуры	5 г/2 л воды. Расход рабочей жидкости при опрыскивании - 1 л/30 м ² ; при поливе - 1-3 л/м ²	Корневые подкормки с интервалом 7-10 дней	
		Некорневые подкормки с интервалом 20-30 дней	
Агрикола для декоративно-листных растений			
Алоказия, аспедистра, бегония, диффенбахия, драцена, сингониум, монстера, плющи и др.	5 г/2 л воды	Корневые подкормки с интервалом 7-10 дней. С ноября по февраль - 1 раз в месяц	
Агрикола для кактусов и суккулентов			
Агава, алоэ, каланхоэ,	4-5 г/2 л воды	Корневые подкормки с	

	молочаи и др.		интервалом 10-14 дней. С ноября по февраль - 1 раз в 2 месяца
	Агрикола для комнатных и садовых роз		
	Розы садовые	15-20 г/м ²	Внесение весной с последующим рыхлением
(Л), Агрикола-аква универсальное комплексное удобрение Марка Вегета Марка Форвард Марка Фантазия Марка Для Декоративно-листных растений Марка Для кактусов и суккулентов Марка Для комнатных и балконных растений Марка Для пальм Марка Для роз Марка Для фикусов Марка Для цветущих растений Марка От пожелтения листьев	Марка Вегета		
	Овощные, бахчевые культуры, картофель	100 мл/10 л воды/3-5 м ²	Корневые подкормки в период вегетации с интервалом 10-15 дней
		30 мл/3 л воды/100 м ²	Некорневые подкормки: 1-я - через 20-25 дней после появления всходов, последующие - с интервалом 15-20 дней
	Марка Форвард		
	Рассада овощных и цветочных культур	100 мл/10 л воды/3-5 м ²	1-2 корневые подкормки с интервалом 7-10 дней
	Рассада огурца, кабачка, дыни	3 мл/0,3 л воды/10 м ²	3-4 некорневые подкормки с интервалом 7-10 дней
	Рассада томата, баклажана, перца и цветочных культур	3 мл/0,3 л воды/10 м ²	4-5 некорневые подкормки с интервалом 7-10 дней
	Марка Фантазия		
	Комнатные растения	20 мл/л воды	Корневые подкормки с интервалом 10-15 дней, зимой - с интервалом 15-20 дней
		50 мл/2 л воды	Некорневые подкормки с интервалом 25-30 дней
	Марка Для декоративно-листных растений		
	Декоративно-листные растения	10 мл/л воды	Корневые подкормки с интервалом 7-10 дней
		5 мл/л воды	Некорневые подкормки с интервалом 10-14 дней
	Марка Для кактусов и суккулентов		
	Кактусы, алоэ, молочайные и толстянковые культуры	5 мл/л воды	Корневые подкормки с интервалом 10-14 дней
		5 мл/2 л воды	Некорневые подкормки с интервалом 10-14 дней
	Марка Для комнатных и балконных растений		
	Комнатные растения	10 мл/л воды	Корневые подкормки с интервалом 7-10 дней
		5 мл/л воды	Некорневые подкормки с интервалом 10-14 дней
	Марка Для пальм		
	Пальмы	5 мл/л воды	Корневые подкормки с интервалом 7-10 дней
		5 мл/2 л воды	Некорневые подкормки с интервалом 10-14 дней
	Марка Для фикусов		
	Фикусы	5 мл/л воды	Корневые подкормки с интервалом 7-10 дней
		5 мл/2 л воды	Некорневые подкормки с интервалом 10-14 дней
	Марка Для роз		
	Розы	10 мл/л воды	Корневые подкормки с интервалом 7-10 дней
		5 мл/л воды	Некорневые подкормки с

			интервалом 10-14 дней
	Марка Для цветущих растений		
	Цветочные культуры	10 мл/л воды	Корневые подкормки с интервалом 7-10 дней
		5 мл/л воды	Некорневые подкормки с интервалом 10-14 дней
	Марка От пожелтения листьев		
	Все культуры	5 мл/л воды	Корневые подкормки с интервалом 7-10 дней
5 мл/2 л воды		Некорневые подкормки с интервалом 10-14 дней	
(С), Аммиак водный технический марка Б	Все культуры	Агрохимические показатели почвы, с учетом требования культуры	Основное внесение, подкормка
(ЛС), Водорастворимое комплексное минеральное удобрение “Акварин” Марки Акварин 1, Акварин 2, Акварин 3, Акварин 4, Акварин 5, Акварин 6,	Марка Акварин 1, Марка Акварин 2		
	Зерновые, технические, плодовые, овощные, цветочные культуры открытого и защищенного грунта	0,5-2 г/л Концентрация рабочего раствора - 0,05-0,2% (С)	Корневые подкормки через системы полива и дождевания
		1-2,5 кг/800-1000 л воды Расход раствора - 100-400 л/га (С)	Некорневые подкормки в течение вегетационного сезона
Акварин 7, Акварин 8, Акварин 9, Акварин 10, Акварин 11, Акварин 12, Акварин 13, Акварин 14, Акварин 15, Акварин 16, Акварин - хвойный, Акварин - супер, Акварин - колор, Акварин - цветочный, Акварин - юниор, Акварин - овощной, Акварин - газонный, Акварин - земляничный, Акварин - плод, Акварин - картофельный	Плодово-ягодные культуры, виноградники	1-2,5 кг/800-1000 л воды/га (С)	
	Марка Акварин 3, Марка Акварин 4		
	Зерновые, технические, плодовые, овощные, цветочные культуры открытого и защищенного грунта	0,7-1,5 г/л Концентрация рабочего раствора - 0,07-0,15% (С)	Корневые подкормки через системы полива и дождевания
	Марка Акварин 5, Марка Акварин 6		
	Зерновые, технические, плодовые, овощные, цветочные культуры открытого и защищенного грунта	0,7-1,5 г/л Концентрация рабочего раствора - 0,07-0,15% (С)	Корневые подкормки через системы полива и дождевания
		1,5-3 кг/800-1000 л воды Расход раствора - 100-400 л/га (С)	Некорневые подкормки в течение вегетационного сезона
	Плодово-ягодные культуры, виноградники	1,5-3 кг/800-1000 л воды/га (С)	
	Марка Акварин 7, Марка Акварин 8, Марка Акварин 9, Марка Акварин 10, Марка Акварин 11, Марка Акварин 12, Марка Акварин 13, Марка Акварин 14		
	Зерновые, технические, плодовые, овощные, цветочные культуры открытого и защищенного грунта	0,7-1,5 г/л Концентрация рабочего раствора - 0,07-0,15 % (С)	Корневые подкормки через системы полива и дождевания
	Марка Акварин 15, Марка Акварин 16		
	Зерновые, технические, плодовые, овощные,	2,5-3 г/л Концентрация	Корневые подкормки через системы полива и

	цветочные культуры открытого и защищенного грунта	рабочего раствора - 0,25-0,3% (С)	дождевания
	Марка Акварин - хвойный		
	Хвойные декоративные растения	15-20 г/10 л воды/м ² приствольного круга (Л)	До 5 подкормок. Последняя подкормка: конец августа - начало сентября
	Марка Акварин - супер		
	Овощные, цветочные культуры	25 г/10 л воды Расход раствора - 1-4 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки в течение вегетационного сезона 1 раз в месяц. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
		25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	До 5 корневых подкормок (путем полива) в течение вегетационного сезона с интервалом 7-8 дней. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
	Зеленные культуры, ранние овощи	25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	1 корневая подкормка через 5-7 дней после всходов (путем полива)
	Плодово-ягодные культуры	25 г/10 л воды Расход раствора - 8-10 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки в течение вегетационного сезона 1 раз в месяц. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
		25 г/10 л воды Расход раствора - 10-30 л/м ² приствольного круга (Л)	До 5 корневых подкормок (путем полива) в течение вегетационного сезона. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
	Комнатные цветочно-декоративные культуры	25 г/10 л воды Расход раствора соответствует поливочной норме и зависит от размера и вида растений (Л)	Подкормки путем полива: в летний период (с марта по сентябрь) - 1 раз в 2 недели, в зимний период - 1 раз в месяц
	Марка Акварин - колор		
	Овощные, цветочные культуры	25 г/10 л воды Расход раствора - 1-4 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки в течение вегетационного сезона с интервалом 2 недели. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
		25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневые подкормки в течение вегетационного сезона с интервалом 2 недели. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
	Плодово-ягодные кустарники	25 г/10 л воды Расход раствора - 8-10 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки (путем полива) в течение вегетационного сезона 1 раз в месяц. Последняя подкормка - за две недели

		до сбора урожая
	25 г/10 л воды Расход раствора - 5-10 л/куст (Л)	Корневые подкормки (путем полива) в течение вегетационного сезона 1 раз в месяц. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
Комнатные цветочные растения	25 г/20 л воды Расход раствора соответствует поливочной норме и зависит от размера растений (Л)	Подкормки путем полива: в летний период (с марта по сентябрь) - 1 раз в 2 недели, в зимний период - 1 раз в месяц
Марка Акварин - цветочный		
Комнатные цветочные растения	10-20 г/10 л воды Расход раствора соответствует поливочной норме и зависит от размера растений (Л)	Подкормки путем полива: в летний период (с марта по сентябрь) - 1 раз в 2 недели, в зимний период - 1 раз в месяц
Однолетние цветочные культуры	15-20 г/10 л воды Расход раствора - 1-4 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки с интервалом 10-12 дней
Однолетние цветочные культуры (выращиваемые на балконе)	15-20 г/10 л воды Расход раствора соответствует поливочной норме и зависит от размера растений (Л)	
Розы и другие многолетники открытого грунта	15-20 г/10 л воды Расход раствора - 5-10 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки: 1-я подкормка после перезимовки, последующие с интервалом 12-15 дней
Луковичные цветочные культуры	15-25 г/10 л воды (Л)	Некорневые подкормки: 1-я - в период активного роста побегов, следующие с интервалом 10-15 дней, последняя - через 10 дней после цветения
	10-20 г/10 л воды (Л)	
Садовые цветочно-декоративные растения	10-25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	До 5 корневых подкормок. Последняя подкормка - конец августа - начало сентября. До 5 некорневых подкормок в летний период (с марта по сентябрь) - 1 раз в 7-10 дней, в зимний период - 1 раз в месяц.
Комнатные цветочно-декоративные растения	10-25 г/10 л воды Расход раствора - до полного смачивания листовой поверхности растения (Л)	
	10-25 г/10 л воды Расход раствора соответствует	До 5 корневых подкормок путем полива: в летний период (с марта по

		поливочной норме и зависит от размера и вида растения (Л)	сентябрь) - 1 раз в 7-10 дней, в зимний период - 1 раз в месяц
	Марка Акварин - юниор		
	Огурец, томат, перец, баклажан	25 г/10 л воды Расход раствора - 1-4 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки в течение вегетационного сезона с интервалом 12 дней. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
		25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневые подкормки в течение вегетационного сезона с интервалом 12 дней. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
	Капуста, лук, редис и др.	25 г/10 л воды Расход раствора - 1-4 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки в течение вегетационного сезона с интервалом 2 недели. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
		25 г/10 л воды (Л)	Корневые подкормки в течение вегетационного сезона с интервалом 2 недели. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
	Зеленные культуры, ранние овощи	25 г/10 л воды/2-30 м ² (Л)	1 корневая подкормка через 5-7 дней после всходов
	Плодово-ягодные кустарники	25 г/10 л воды Расход раствора - 8-10 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки (путем полива) в течение вегетационного сезона 1 раз в месяц. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
		25 г/10 л воды Расход раствора - 5-10 л/куст (Л)	Корневые подкормки (путем полива) в течение вегетационного сезона 1 раз в месяц. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
	Комнатные цветочные растения	25 г/20 л воды Расход раствора - соответствует поливочной норме и зависит от размера растений (Л)	Подкормки путем полива: в летний период (с марта по сентябрь) - 1 раз в 7-10 дней, в зимний период - 1 раз в месяц
	Комнатные цветочно-декоративные растения	25 г/20 л воды Расход раствора - до полного смачивания листовой поверхности растения (Л)	Некорневые подкормки: в летний период (с марта по сентябрь) - 1 раз в 7-10 дней, в зимний период - 1 раз в месяц
	Марка Акварин - овощной		
	Томат, перец, баклажан (рассада)	10-15 г/10 л воды (Л)	Корневые подкормки
	Томат, перец, баклажан	15-25 г/10 л воды/2-	Корневые подкормки: 1-я

	3 м ² (Л)	подкормка - через 10-15 дней после высадки рассады; последующие в период плодоношения каждые 7-10 дней
Перец, баклажан	3-5 г/л воды Концентрация раствора - 0,3-0,5 % (Л)	Некорневые подкормки: 1-я подкормка - через 10-15 дней после высадки рассады; последующие в период плодоношения каждые 7-10 дней
Тыквенные	15-25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневая подкормка в фазе 5-6 листьев
	20 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневые подкормки в период плодоношения 1 раз в неделю
	2-3 г/л воды Концентрация раствора - 0,2-0,3 % (Л)	Некорневые подкормки: 1-я подкормка - в фазе 5-6 листьев, последующие в период плодоношения каждые 7 дней
Капуста	20 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневая подкормка через 5-7 дней после высадки рассады
	25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневая подкормка в период формирования кочана
	3-5 г/л воды Концентрация раствора - 0,3-0,5 % (Л)	Некорневые подкормки: 1-я подкормка - через 5-7 дней после высадки рассады; последующие в период формирования кочана
Корнеплоды	15-25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневая подкормка через 30-40 дней после посева семян
	25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневая подкормка в период образования корнеплодов
Капуста	3-5 г/л воды Концентрация раствора - 0,3-0,5 % (Л)	Некорневые подкормки: 1-я подкормка - через 30-40 дней после посева семян; последующие в период образования корнеплодов
Лук, чеснок	25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневая подкормка при появлении 2-3 листьев
Зеленные культуры	10-15 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневая подкормка через 10 дней после всходов
Марка Акварин - газонный		
Газоны	20-25 г/10 л воды/м ² (Л)	До 5 подкормок после стрижки, или 1 раз в 10-15 дней
Марка Акварин - земляничный		
Земляника	25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневая подкормка ранней весной
	20 г/л на 10 м ² Расход раствора - 1-4 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки в начале цветения и после сбора ягод
Марка Акварин - плод		
Огурец, томат, перец,	25 г/10 л воды	Некорневые подкормки в

	баклажан	Расход раствора - 1-4 л/100 м ² (Л)	течение вегетационного сезона с интервалом 12 дней. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
	Огурец, томат, перец, баклажан	25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневые подкормки в течение вегетационного сезона с интервалом 12 дней. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
	Капуста, лук, редис и др.	25 г/10 л воды Расход раствора - 1-4 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки в течение вегетационного сезона с интервалом 2 недели. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
		25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневые подкормки в течение вегетационного сезона с интервалом 2 недели. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
	Плодово-ягодные кустарники	25 г/10 л воды Расход раствора - 8-10 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки (путем полива) в течение вегетационного сезона 1 раз в месяц. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
		25 г/10 л воды Расход раствора - 5-10 л/куст (Л)	Корневые подкормки (путем полива) в течение вегетационного сезона 1 раз в месяц. Последняя подкормка - за две недели до сбора урожая
	Марка Акварин - картофельный		
	Картофель	20-30 г/10 л воды Расход раствора - 3 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки: 2 подкормки - перед окучиваниями, перед цветением и после цветения
(Л), Водорастворимые удобрения Марка А 17:17:17 (Растворин) Марка Б 17:8:22 (Крепыш) Марка В 8:20:25 (Родничок) Марка Г 12:6:29 (Малышок)	Все культуры	10 г/10 л воды Расход раствора - 8-10 л/м ²	Корневые подкормки
		10 г/10 л воды Расход раствора - 1-1,5 л/10 м ²	Некорневые подкормки
	Комнатные декоративные культуры	10 г/10 л воды Расход раствора - до полного увлажнения земляного кома	Корневая подкормка
		10 г/10 л воды Расход раствора - до смачивания всей поверхности листьев	Некорневая подкормка
(ЛС), Гуматизированное жидкое комплексное удобрение марка ГОМУ-ЖКУ 1,5	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Гуматизированный	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

аммофос марка ГОМУ-АЛ 1,5			
(ЛС), Добавка микроэлементная удобрительная гранулированная ОАО «Буйский химический завод»	Все культуры	100-400 кг/т тукосмеси (С)	Составление тукосмесей
		До 1000 кг/га (С)	Внесение в почву
	Садовые и огородные культуры	200-300 г/м ² (Л)	Внесение под перекопку почвы совместно с минеральными удобрениями
	Все культуры	Песчаные и супесчаные почвы - 400-500 г/м ² . Суглинистые и глинистые почвы - 500-700 г/м ² . Тяжелые глинистые - 700-1000 г/м ²	Для нейтрализации почвы
(ЛС), Келик марки: Келик Микс, Келик Бор, Келик Магний, Келик Кальций, Келик Молибден, Келик Марганец, Келик Калий, Келик Кальций-Бор, Келик Цинк	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Келкат марки: Келкат Микс-Кальций, Келкат Бор, Келкат Железо, Келкат Марганец, Келкат Цинк	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(С), Кендал	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Кислота борная	Капуста белокочанная и цветная	10 г/10 л воды Расход раствора - 1 л/10 м ²	Некорневая подкормка
	Картофель	10 г/10 л воды 1 л/25 кг	Обработка клубней перед посадкой
		10 г/10 л воды Расход раствора - 1 л/10 м ²	Некорневая подкормка
	Лук репчатый, огурцы, свекла, томаты	5 г/10 л воды Расход раствора - 1 л/10 м ²	
	Ягодные культуры (виноград, малина, земляника, смородина, крыжовник)	5 г/10 л воды Расход раствора - 1-2 л/10 м ² (или 1-1,5 л/куст)	
	Плодовые культуры (вишня, груша, слива, яблоня)	10-20 г/10 л воды Расход раствора - 2-10 л/дерево	
	Цветочные культуры	5 г/10 л воды Расход раствора - 1 л/10 м ²	
		10-20 г (мл)/10 л воды Расход раствора - 5-10 л/растение	Корневая подкормка в период вегетации, 1-3 раза
(С), Нутривант Плюс	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(С), Поли-фид Марка 11-12-33 + 2MgO Марка 14-10-34	Марка 11-12-33 + 2MgO		
	Томаты	0,5 кг/1000 л Расход раствора - 150-300 л/га	Некорневая подкормка в период укоренения
		0,67 кг/1000 л	Некорневая подкормка в

		Расход раствора - 150-300 л/га	период развития зеленой массы - цветения
		0,85 кг/1000 л Расход раствора - 150-300 л/га	Некорневая подкормка в период развития плодов
		0,97 кг/1000 л Расход раствора - 150-300 л/га	Некорневая подкормка в период плодоношения
	Огурцы	0,5 кг/1000 л Расход раствора - 150-300 л/га	Некорневая подкормка в период развития зеленой массы
		0,88 кг/1000 л Расход раствора - 150-300 л/га	Некорневая подкормка в период плодоношения
	Перец	0,88 кг/1000 л Расход раствора - 150-300 л/га	Некорневые подкормки, 4-5 раз в течение вегетационного периода
		Марка 14-10-34	
	Томаты	0,35 кг/1000 л Расход раствора - 150-300 л/га	Некорневая подкормка в период укоренения
		0,65 кг/1000 л Расход раствора - 150-300 л/га	Некорневая подкормка в период развития зеленой массы - цветения
		0,82 кг/1000 л Расход раствора - 150-300 л/га	Некорневая подкормка в период развития плодов
		0,94 кг/1000 л Расход раствора - 150-300 л/га	Некорневая подкормка в период плодоношения
	Огурцы	0,35 кг/1000 л Расход раствора - 150-300 л/га	Некорневая подкормка в период укоренения
		0,7 кг/1000 л Расход раствора - 150-300 л/га	Некорневая подкормка в период развития зеленой массы - цветения
		0,85 кг/1000 л Расход раствора - 150-300 л/га	Некорневая подкормка в период плодоношения
	Перец, розы, дыни	1 кг/1000 л Расход раствора - 150-300 л/га	Некорневые подкормки, 4-5 раз в течение вегетационного периода
(С), Поли-фид 15-7-30	Сахарная свекла	6 кг/га Максимальная концентрация рабочего раствора - 2 % Расход раствора - 300 л/га	Некорневая подкормка (наземное опрыскивание) в период формирования 18 листьев до смыкания листьев в междурядьях и через 3 недели после смыкания листьев в междурядьях
		6 кг/га Максимальная концентрация рабочего раствора - 5 % Расход раствора - 50-80 л/га	Некорневая подкормка (авиационное опрыскивание) в период формирования 18 листьев до смыкания листьев в междурядьях и через 3 недели после смыкания листьев в междурядьях
	Подсолнечник	5 кг/га Максимальная концентрация рабочего раствора -	Некорневая подкормка (наземное опрыскивание) до начала цветения и через 14 дней после

		2 % Расход раствора - 300 л/га	первой (в начале цветения)
		5 кг/га Максимальная концентрация рабочего раствора - 5 % Расход раствора - 50-80 л/га	Некорневая подкормка (авиационное опрыскивание) до начала цветения и через 14 дней после первой (в начале цветения)
	Рапс	2,5 кг/га Максимальная концентрация рабочего раствора - 2 % Расход раствора - 300 л/га	Некорневая подкормка (наземное опрыскивание) до начала цветения
		5 кг/га Максимальная концентрация рабочего раствора - 2 % Расход раствора - 300 л/га	Некорневая подкормка (наземное опрыскивание) в начале цветения
		2,5 кг/га Максимальная концентрация рабочего раствора - 5 % Расход раствора - 50-80 л/га	Некорневая подкормка (авиационное опрыскивание) до начала цветения
		5 кг/га Максимальная концентрация рабочего раствора - 5 % Расход раствора - 50-80 л/га	Некорневая подкормка (авиационное опрыскивание) в начале цветения
(С), Поли-фид 19-19-19 + MgO + МЭ	Пшеница	5 кг/га Расход раствора - 200 л/га	Некорневая подкормка в фазе кущения и в фазе цветения
	Томаты, дыни, перец, баклажан	13 кг/га Концентрация рабочего раствора - 0,01-0,05 %	Корневые подкормки до периода завязывания плода через различные системы полива, ежедневно
	Салат	10 кг/га Концентрация рабочего раствора 0,01-0,05 л/га	Корневые подкормки до уборки урожая через различные системы полива, ежедневно
	Цветочные культуры (с малой потребностью в питательных веществах)	0,3 кг/1000 л	Корневые подкормки через различные системы полива
	Цветочные культуры (со средней потребностью в питательных веществах)	0,4 кг/1000 л	Корневые подкормки через различные системы полива
	Цветочные культуры (с высокой потребностью в питательных веществах)	0,5 кг/1000 л	
(С), Поли-фид 21-11-21	Пшеница, ячмень	5 кг/га Максимальная концентрация	Некорневая подкормка (наземное опрыскивание) в фазе выхода в трубку и в

		рабочего раствора - 2 % Расход раствора - 250-300 л/га	фазе цветения
		5 кг/га Максимальная концентрация рабочего раствора - 2 % Расход раствора - 50-80 л/га	Некорневая подкормка (авиационное опрыскивание) в фазе выхода в трубку и в фазе цветения
	Овощные, плодово-ягодные, цветочно-декоративные культуры, газонные травы	5-10 мл/л воды Расход раствора: некорневая подкормка - 3-10 л/100 м ² ; корневая подкормка - 1-5 л/м ² (Л)	Подкормка в начальный период вегетации 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
	Цветочно-декоративные культуры (горшечные)	5 мл/500 мл воды Расход раствора - 200-500 мл/растение (Л)	Подкормка 3 раза: после посадки, далее - с интервалом 10-15 дней
(ЛС), Райкат марки: «Райкат Старт», «Райкат Развитие», «Райкат Финал»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС) «Растворин» удобрение для теплиц и открытого грунта (С), Марка А (С), Марка А1 (С), Марка Б (С), Марка Б1 (Л), Марка Рассада-Рост (Л), Марка Овощное (Л), Марка Цветочное (Л), Марка Зеленый ковер ОАО «Буйский химический завод»	Марки А, А1, Б, Б1		
	Культуры открытого и защищенного грунта	Применяется в виде водного раствора концентрацией 0,1-0,2 % (С)	Удобрение вносится через различные системы полива. Подкормки могут проводиться в течение всего вегетационного периода. Количество подкормок и количество вносимого удобрения определяется по результатам агрохимического анализа грунтов и требований выращиваемой культуры
	Марка Овощное		
	Огурцы, томаты, морковь, свекла и др.	25 г/10 л воды Расход - 1-4 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки
		25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневые подкормки
	Земляника	25 г/10 л воды Расход - 1-4 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки
		25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневые подкормки
	Плодово-ягодные	25 г/10 л воды Расход - 8-10 л/100 м ² (Л)	Некорневые подкормки
		25 г/10 л воды Расход - 10-30 л/растение (Л)	Корневые подкормки
	Рассада овощных и цветочных	25 г/10 л воды (Л)	Корневые и некорневые подкормки
Кристалон в ассортименте	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
	Комнатные растения	25 г/10 л воды	Некорневые подкормки

		Расход раствора - до полного смачивания листовой поверхности растения (Л)	путем опрыскивания: в летний период (с марта по сентябрь) - 1 раз в 10-15 дней, в зимний период - 1 раз в месяц
		25 г/10 л воды Расход раствора соответствует поливочной норме и зависит от размера и вида растений (Л)	Подкормки путем полива: в летний период (с марта по сентябрь) - 1 раз в 7-10 дней, в зимний период - 1 раз в месяц
		25 г/10 л воды/2-3 м ² (Л)	Корневые подкормки
	Комнатные растения	25 г/10 л воды Расход раствора - до полного смачивания листовой поверхности растения (Л)	Некорневые подкормки путем опрыскивания: в летний период (с марта по сентябрь), 1 раз в 10-15 дней, в зимний период - 1 раз в месяц
		25 г/10 л воды Расход раствора соответствует поливочной норме и зависит от размера и вида растений (Л)	Подкормки путем полива: в летний период (с марта по сентябрь), 1 раз в 7-10 дней, в зимний период - 1 раз в месяц
	Марка Рассада-Рост		
	Рассада овощных и цветочных	25 г/10 л воды (Л)	Корневые и некорневые подкормки
	Марка Зеленый ковер		
	Газоны, цветочно-декоративные, овощные, плодово-ягодные	0,2-0,3 % 20-30 г/10 л воды/2 м ² (Л)	Подкормки в течение вегетационного сезона
(С), Ризоторфин Марка А Марка Б Марка В	Марки А, Б		
	Бобовые и зернобобовые культуры	300 г на гектарную норму семян	Предпосевная обработка семян
		Марка В	
	Бобовые и зернобобовые культуры	300 мл на гектарную норму семян	Предпосевная обработка семян
		Концентрация рабочего раствора 3 % (С)	Корневая подкормка с интервалом 1-2 раза в месяц
	Цветочно-декоративные культуры, газонные травы	300 мл/10 л воды Расход раствора - 10 л/м ² (Л)	Корневая подкормка с интервалом 1-2 раза в месяц
	Декоративные деревья и кустарники	300 мл/10 л воды Расход раствора - 20-120 л/растение (Л)	Корневая подкормка с интервалом 1-2 раза в месяц
		200 мл/10 л воды Расход раствора - 10-24 л/растение (Л)	Некорневая подкормка с интервалом 1-2 раза в месяц
	Свекла сахарная	8 л/20 л/т (С)	Предпосадочная

		4-6 л/200-300 л/га (С)	обработка семян Некорневая подкормка за 20-25 дней до начала уборки
	Хмель	6 л/800-1200 л/га (С)	Некорневая подкормка: 1-я - в фазе цветения, 2-я - в фазе образования шишек
	Овощные культуры	15 мл/300 мл воды/100 г семян (Л)	Предпосевная обработка семян
		10 мл/15 л воды Расход раствора - 4-5 л/м ² (Л)	Полив рассады, 1 раз в неделю до высадки в грунт
	Картофель, луковичные растения	40-50 мл/10 л воды Расход раствора - 2 л/кг (Л)	Предпосадочная обработка посадочного материала
	Овощные, бахчевые культуры, картофель	10 мл/10 л воды Расход раствора - 1,5-3 л/10 м ² (Л)	Некорневая подкормка в течение вегетации, 1-2 раза
		20 мл/10 л воды Расход раствора - 1,5-2 л/м ² (Л)	Корневая подкормка в течение вегетации, 1-2 раза
	Плодово-ягодные деревья	10 мл/10 л воды Расход раствора - 2-10 л/дерево (Л)	Некорневая подкормка, 1-3 раза
	Ягодные кустарники, земляника	10 мл/10 л воды Расход раствора - 1,5-5 л/10 м ² (Л)	
(С), Специальное комплексное минеральное удобрение с микроэлементами Кемира в ассортименте ЗАО "Кемира Агро"	Яровые зерновые культуры, кукуруза, рапс, многолетние травы	300-500 кг/га	Основное внесение и подкормки
(Л), Удобрение минеральное жидкое «Фиалка», «Сударушка», «Семицветик»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению.		
Л), Универсальное медленнодействующее минеральное удобрение Марка «Сударушка», «Рязаночка», «Семицветик».	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению.		
(Л), Эффект в ассортименте ОАО "Воскресенские минеральные удобрения"	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(С), Яра Вита Марка Брасситрел Марка Битрел "Яра Фосин Лтд"	Марка Брасситрел		
	Овощные, зернобобовые, технические культуры	1-3 кг/га Расход раствора - 200-300 л/га	Некорневая подкормка
	Марка Битрел		
	Свекла (сахарная, столовая, кормовая)	3-5 кг/га Расход раствора - 100-200 л/га	Некорневая подкормка
(С), Яра Мила Комплекс Яра Интернэшнл АСА	Все культуры	Агрохимические показатели почвы с учетом требований культуры	Основное, припосевное внесение, подкормка, составление питательных торфо- и почвосмесей
Лифдрип 15-30-15	Все	2-3 кг/га	В период вегетации.

FRARIMEX, Франция	сельскохозяйственные культуры		
Лифдрип 20-20-20 FARIMEX, Франция	Все сельскохозяйственные культуры	2-3 кг/га	В период вегетации.
Лифдрип 12-12-360 FRARIMEX, Франция	Все сельскохозяйственные культуры	2-3 кг/га	В период вегетации.
Концентрированное микроудобрение «Аквамикс», «Аквамикс-Т» ОАО «Буйский химический завод» (FeДТПА +Fe ЭДТА) 3,84 % (Mn ЭДТА) 2,57 % (Zn ЭДТА) 0,53 % (Ca ЭДТА) 2,57 % (B) 0,52 %	Зерновые культуры	100 г/т 10 л/т семян 1-1,2 кг/га	Обработка семян перед посевом 2-х кратная некорневая подкормка растений в фазу кущения и фазу налива зерна.
	Подсолнечник, кукуруза.	100 г/т.	Обработка семян перед посевом.
	Овощные культуры открытого и защищенного грунта, корнеплоды.	100-150 г/л 10 л/т семян.	Дражирование семян перед посевом.
	Плодово-декоративные деревья и кустарники, виноградники.	0,5-2 кг/га. 800-1000 л/га.	Корневые подкормки сельскохозяйственных культур.
	Все культуры.	2-5 кг/га.	Корневые подкормки сельскохозяйственных культур.
	Декоративные культуры.	1-2 г. на 5 л воды	Некорневые подкормки растений (1-2 раза за сезон).
	Плодово-декоративные деревья и кустарники, виноградники.	1-4 г на 5 л воды.	Некорневые подкормки растений (1 -е цветения, 2-я после цветения).
«Солу Микро Fe Д 11» (Хелат железа) Fe (ЕДТА) 11 ОАО «Буйский химический завод»	Овощные культуры (защищенный грунт).	0,2-0,4 г/1000 л воды.	Корневая подкормка (внесение с поливными водами).
		0,5 г/1000 л воды.	Некорневая подкормка с интервалом 1-2 недели.
	Цветочные-декоративные (защищенный грунт и горшочные растения).	0,2-0,3 г/1 л. воды.	Корневая подкормка (внесение с поливными водами).
		0,5 г /1000 л воды.	Некорневая подкормка с интервалом 1-2 недели (до смачивания поверхности листьев).
	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры.	2,5-25 кг/га	Корневая подкормка (внесение с поливными водами).
«Солу Микро Fe Д 13» (Хелат железа) Fe (ЕДТА) 13 ОАО «Буйский химический завод»	Овощные культуры (защищенный грунт).	15-25 г/1000 л воды.	Корневая подкормка (внесение с поливными водами).
		0,1-0,5 г/ л воды.	Некорневая подкормка с интервалом 1-2 недели.
		0,2-0,3 г/1 л. воды.	Некорневая подкормка с интервалом 1-2 недели.
	Цветочные-декоративные (защищенный грунт и горшочные растения).	8 г/1000 л. воды.	Корневая подкормка (внесение с поливными водами).
		0,1-0,4 г/л воды.	Некорневая подкормка с интервалом 1-2 недели (до смачивания поверхности

			листьев).
	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры.	2,5-25 кг/га	Корневая подкормка (внесение с поливными водами).
«Солу Микро 15» (Хелат цинка) Zn (ЭДТА) 15 ОАО «Буйский химический завод».	Овощные культуры (защищенный грунт).	4-6/1000 л воды.	Корневая подкормка (внесение с поливными водами).
		0,1-0,5 г/л воды 2-10 л/100 м ² .	Некорневая подкормка с интервалом 1-2 недели.
	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые, плодово-ягодные, овощные культуры.	2-4 кг/га.	Корневая подкормка (внесение с поливными водами).
	Плодово-ягодные, овощные культуры.	2-5 кг/га.	Корневая подкормка (внесение с поливными водами).
	Виноград.	10-40 г/растение.	Корневая подкормка (внесение с поливными водами).
	Все культуры (открытый грунт).	1-1,5 кг/га, 200-1000 га.	Некорневая подкормка.
Солу Микро Са 10» (Хелат кальция) Са (ЭДТА) 10 ОАО «Буйский химический завод».	Овощные, цветочно-декоративные (защищенный грунт).	1 г/л воды, 2-10 л/100 м ² .	Некорневая подкормка с интервалом 2 недели.
	Цветочно-декоративные (горшечные) растения).	0,8 г/л воды.	Некорневая подкормка.
	Цитрусовые, семечковые.	1 кг/га, 800-1000 л/га.	Некорневая подкормка.
	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры.	1-2 кг/га.	Корневая подкормка (внесение с поливными водами).
	Косточковые.	0,8 кг/га, 800-1000 л/га.	Некорневая подкормка.
Солу Микро Си 15» (Хелат меди) Си (ЭДТА) 15 ОАО «Буйский химический завод».	Овощные культуры (защищенный грунт).	0,2-0,6 г/1000 л воды, 2-10 л/100 м ² .	Некорневая подкормка с интервалом 3 недели.
	Цветочно-декоративные (защищенный грунт, горшечные растения).	0,2-0,5 г/1000 л воды	Корневая подкормка (внесение с поливными водами) до смачивания поверхности листьев.
		0,2-0,7 г/л воды, 2-10 л/100 м ² .	Некорневая подкормка с интервалом 3 недели.
	Зерновые, зернобобовые, технические, кормовые культуры.	1-2 кг/га.	Корневая подкормка (внесение с поливными водами).
Кислота борная (В) 17 % ОАО «Буйский химический завод»	Все культуры (обработка семян морковки, томата, лука, свеклы) (Капуста, огурцы, кабачки на 12 часов).	1-2 гр/10 л воды.	Замачивание семян на 1 сутки.
		1-2 гр/10 л воды и проливают 10 м ² .	Для внесения в почву.
		1000 кг/га.	Внесение в почву.
«Зеленая игла» ОАО «Буйский химический завод»	Хвойные, декоративные растения.	50 гр. При высоте растений до 2-х метров. 100 гр при высоте растений до 4-х метров. 250 гр при высоте растений до 8-и метров.	Удобрение разбрасывается равномерно по поверхности почвы, при возможности заделывается в верхний слой почвы рыхлением, обязательно обильно полить. Вносится весной после начала активной

			вегетации и летом. Профилактически вносится 2 за сезон, при появлении побурения 1 раз в 3-4 недели. Не вносится осенью.
	Комнатные растения.	25 г/10 л воды.	Некорневые подкормки путем опрыскивания: в летний период (с марта по сентябрь) 1 раз в 10-15 дней, в зимний период - 1 раз в месяц. Расход раствора - до полного смачивания листовой поверхности растения.
Комплексное минеральное удобрение в ассортименте ОАО «Буйский химический завод»	Цветочные, газонные, овощные, клубника, картофель, плодово-ягодные, декоративные кустарники, лук и чеснок.	20-60 г/м ² , 10-15 г/на лунку.	Перед прокопкой при подкормке при посадке.
Фосфорно-калийное удобрение «Осень» ОАО «Буйский химический завод.	Овощные, плодово-ягодные и декоративные культуры.	35-60 г/м ² .	Внесение при обработке почвы осенью.
		35-60 г/м ² .	Внесение при обработке почвы весной совместно с азотными удобрениями.
		15-40 г/м ² .	Подкормка во время цветения, плодоношения.
	Плодово-ягодные культуры, цветочные и декоративные культуры.	40 г/м ² .	Подкормка в сентябре.
Магний сернокислый технический ОАО «Буйский химический завод»			
«Купорос железный» (сульфат железа) (FeSO ₄) 47-54 % ОАО «Буйский химический завод»	Цветочно-декоративных, плодово-ягодных и овощных культур.	125-150 г/10 л воды.	Подкормки проводят 3-4 раза за сезон путем опрыскивания, ранневесеннее и осеннее опрыскивания деревьев и кустарников (после опадания листьев).
«Купорос цинковый»			
«Купорос медный» ОАО «Буйский химический завод»	Плодово-ягодные	100 г/10 л воды.	Опрыскивать растения до распускания почек, свежеприготовленным раствором препарата.
Тушум ОсОО «Тушум-Вико», Кыргызстан	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Удобрение органоминеральное «Кыргыз-Гумат»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
ОМУ «Универсальное», марка «Универсал» в ассортименте	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Борная кислота	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Жидкое комплексное удобрение «Берегиня для орхидей» ООО «Фаско +»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Удобрение Корневая смесь «Фермерское», марка С	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

ООО «Фаско +»	
Фосфоритная мука ООО «Фаско +»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Жидкие комплексные удобрения с микроэлементами ООО «Фаско +»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Удобрения-палочки в ассортименте ООО «Фаско +»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Раствор питательный ООО «Фаско +»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Органоминеральные удобрения в ассортименте ООО «Фаско +»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Фосфорно-калийное удобрение «Осеннее» ООО «Фаско +»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Специализированные органоминеральные удобрения в ассортименте. ООО «Фаско +»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Удобрения длительного действия ООО «Фаско +»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Органоминеральные удобрения в ассортименте ОАО «Буйский химический завод»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

УДОБРЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИЕ

Название	Культура	Доза применения	Время, особенности применения
(Л), «Азалия» ЗАО МНПП «ФАРТ»			В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
(Л), «Изумруд» ЗАО МНПП «ФАРТ»			В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
(Л), «Лимон» ЗАО МНПП «ФАРТ»			В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
(Л), «Роза» ЗАО МНПП «ФАРТ»			В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
(Л), «Сенполия» ЗАО МНПП «ФАРТ»			В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
(Л), «Фея» ЗАО МНПП «ФАРТ»			В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
(ЛС), Биогумус в ассортименте ЗАО МНПП «ФАРТ»			В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
(ЛС), Биокомпост			В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
ОАО «Буйский химический завод»	Овощные культуры, картофель, плодово-ягодные и декоративные кустарники, деревья	0,5-1,5 кг/м ²	Под основную обработку почвы
	Овощные культуры, картофель	0,5-1,5 кг/м ² (100-150 г/растение)	Внесение перед посадкой
	Плодово-ягодные и декоративные кустарники	0,6-0,9 кг/растение 1,2-1,8 кг/растение	Внесение при посадке
	Газон	30-40 кг/100 м ²	Подготовка почвы при закладке газона

	-	100-150 г/кг грунта	Приготовление питательных грунтов
	Ягодные и декоративные кустарники	0,2-0,3 кг/растение (Л)	
	Плодово-ягодные и декоративные деревья	0,5-0,7 кг/растение (Л)	
(ЛС), Сапропель натуральный	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Удобрение органическое “Биогумус”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Удобрение сапропелевое	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
ЛС), Компост “	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Навоз крупного рогатого скота подстилочный (влажностью 47 %). № 8,4 Р2 О5 4,6	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Навоз крупного рогатого скота подстилочный (влажностью 90 %). N- 4 Р2О 5 -2	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Навоз крупного рогатого скота жидкий бесподстилочный (влажностью 94 %) N- 2,3 Р2 О 5 - 1,1	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Навозные стоки (влажностью 98 %)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Свиной навоз подстилочный (влажностью 60,7 %)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Свиной навоз полужидкий бесподстилочный (влажностью 90 %)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Свиной навоз жидкий бесподстилочный (влажностью 94 %) N- 2,9 Р2О 5 - 1,4	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Навозные стоки (влажностью 98 %) N- 1,2 Р2О 5 - 0,6	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Овечий навоз (влажностью 38,6 %) N- 12,2 Р2О 5 - 6,2	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Куриный помет (влажностью 56 %) N- 15 Р2О 5 - 15,8	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Куриный помет полужидкий (влажностью 67 %)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Утиный помет (влажностью 83 %)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Пудрет (сухой помет, влажностью 20 %)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Соломенно-пометный компост (влажностью 70 %)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Перегной КРС (влажностью 55 %)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Навозная жижа КРС (влажностью 99 %)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

Фекалии (влажностью 93 %)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Ил хозяйственно-бытовых сточных вод	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Солома пшеничная (влажностью 14 %)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Солома зернобобовых культур (влажностью 14 %)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Зола кизяка	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Зола каменного угля с дровами	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Навоз конский (влажностью 69 %)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Торф (влажностью 34,5 %)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Сапропель (влажностью 20 %)	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Зола древесная	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
«Е.А.П.» ОсОО «БиУз», Российская Федерация	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Фитоп-Флора-С, ОсОО «Био-Бан», Российская Федерация	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Название	Доза применения
(ЛС), Байкал ЭМ-1 (концентрат) ООО «ЭМ-центр», ООО «ЭМ-кооперация»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
(Л), Байкал ЭМ-1 (водный раствор) ООО «ЭМ-центр», ООО «ЭМ-кооперация»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Азотобактерин	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Нитрагин	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Премиум Азото (Azotobacter spp 2.0 % spp). Число КОЕ не менее: 1×10^8 мл. «Интернэшнл Панаacea Лтд» Индия	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Премиум Азоспи (Azospillium spp 2.0 % spp). Число КОЕ не менее: 1×10^8 мл. «Интернэшнл Панаacea Лтд» Индия	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Премиум Ризо (Rhizobium 2.0 % spp). Число КОЕ не менее: 1×10^8 мл. «Интернэшнл Панаacea Лтд» Индия	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

Премиум Фосфофикс (Phosphate Solubilising Bacteria). Число КОЕ не менее: 1×10^9 мл. «Интернэшнл Панаacea Лтд» Индия	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению
Pulse-R HP Soybean Inoculant Почвенные бактерии Bradyrhizobium Japonicum or Rhizobium Japonicum (не менее 5×10^9 бактерий/г) ОО «Общественная Миссия Тянь-Шаня»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению

УДОБРЕНИЯ ТОРФЯНЫЕ

Название (марка)	Культура	Доза применения	Время, особенности применения
(Л), «Волшебная грядка» грунт питательный Марка Томат, перец, баклажан Марка Цитрусовая Марка Пальмовая Марка Кактусовая Марка Фиалковая Марка Жасминовая Марка Вересковая Марка Огурец Марка Универсальная Марка Цветочный Универсальный	Марка Цитрусовая		
	Комнатные цитрусовые растения	Полностью готов к применению, используется без разбавления	Применяется в качестве почвенного субстрата
	Марка Пальмовая		
	Цветочно-декоративные растения (финик, ховея, неанта, аспаргус (кокос Веделя), хамеропс, рапис, саговые пальмы, фикусы, шефлеры, аралии, розаны и т.п.)	Полностью готов к применению, используется без разбавления	Применяется в качестве почвенного субстрата
	Марка Кактусовая		
	Зигокактусы, эпифиллюмы, апорокактусы, эхинопсисы, ребюции, пародии, псевдолобивии, маммилярии, лобивии, нотокактусы, астофитумы, опунции	Полностью готов к применению, используется без разбавления	Применяется в качестве почвенного субстрата
ОАО «Буйский химический завод», г. Буй	Марка Фиалковая		
	Сенполии, алоказии, кампанулы, аукубы, аспидистры, циперусы, диффенбахии, драцены, традесканции, цикламены	Полностью готов к применению, используется без разбавления	Применяется в качестве почвенного субстрата
(ЛС), Грунт питательный торфяной в ассортименте	Все культуры	Полностью готов к применению, используется без разбавления	Применяется в качестве почвенного субстрата
(Л), Грунты растительные на основе торфа для цветочных и овощных культур в ассортименте.	Все культуры	Полностью готов к применению, используется без разбавления	Применяется в качестве почвенного субстрата
(Л), «Микропарник» питательный торфогрунт ОАО «Буйский химический завод», г. Буй	Рассада овощных культур, зеленные культуры (лук, укроп, салат и др.), комнатные и балконные цветочные культуры	Полностью готов к применению, используется без разбавления	Применяется в качестве почвенного субстрата

(ЛС), Продукты переработки торфа марки: Садовая земля, Микропарник	Марки «Садовая земля», «Микропарник»		
	Все культуры	Полностью готов к применению, используется без разбавления	Применяется в качестве почвенного субстрата
(Л), Удобрение жидкое комплексное гуминовое на основе торфа в ассортименте.	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС) «Обогащенный торф» в ассортименте ТМС 1-12 ОАО «Торфопредприятие Нестеровское» Российская Федерация	Все культуры		Согласно агрохимическим показателям почвы с учетом требований культуры
Торфогоршки в ассортименте ООО «ФАСКО +»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

Удобрения на основе гуминовых кислот

Название (марка)	Культура	Доза применения	Время, особенности применения
1	2	3	4
(Л), Гумат	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Гумат калия /натрия	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Гумилайф жидкий ООО «Урал Соил»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(С), Гумилайф пролонгированного действия ООО «Урал Соил»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Гумилайф твердый ООО «Урал Соил»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Гумимакс Марка Гумимакс-универсальный концентрированный Марка Гумимакс - двойная сила Марка Гумимакс торф Марка Гумимакс для осенне-зимнего сезона Марка Гумимакс для весенне-летнего сезона Марка Салфетка для замачивания и проращивания семян Марка Гумимакс - для замачивания семян Марка Гумимакс - для овощей Марка Гумимакс - для комнатных растений Марка Гумимакс - Фильтр-пакетик для комнатных растений ЗАО «Уралэкосоил»	Марка Гумимакс-универсальный концентрированный		
	Все культуры	70-140 мл/т Расход раствора - 10-20 л/т (С)	Предпосевная обработка семян
		150-170 л/га Расход раствора - 2500 л/га (С)	Полив почвы перед вспашкой (культивацией)
		0, 35-1 л/га Расход раствора - 100-300 л/га (С)	Некорневая подкормка
		3,5-5,25 л/га Расход раствора - 1000-1500 л/га (С)	Корневая подкормка через различные системы полива
	Марка Гумимакс - двойная сила		
	Все культуры	50-100 мл/т Расход раствора - 10-20 л/т (С)	Предпосевная обработка семян
		100-125 л/га Расход раствора - 2500 л/га (С)	Полив почвы перед вспашкой (перекопкой)
		0,25-0,75 л/га Расход раствора - 100-300 л/га (С)	Некорневая подкормка

(ЛС), Гумимакс-Ж ЗАО “Уралэкосил”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Гумимакс-П ЗАО “Уралэкосил”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Гумимакс-С ЗАО “Уралэкосил”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Гумимакс - двойная сила ЗАО “Уралэкосил”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Удобрения гуминовые в ассортименте	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), ФлорГумат в ассортименте	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Гумифицированные удобрения в ассортименте	Все культуры 100-500 мл/10 л воды Расход раствора - 4-5 л/10 м ² Полив при посадке (пересадке), подкормки		
Гумимакс - двойная сила. Гумимакс-универсальный концентрированный, Ж ЗАО «Уралэкосил»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Гибберсиб природный стимулятор роста	Все культуры	0,5 растворить в 5-10 г. водки, затем растворить в 10 л воды.	
Удобрение гуминовое жидкое «Узгуми» Эдагум СМ «Agroscitnce Trading», Узбекистан	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
«Кыргыз - Гумат» комплексное удобрение с содержанием гуминовых кислот. ОсОО «ADAID», Кыргызстан	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению.		
Эдагум СМ	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению.		

ПОЧВЕННЫЕ ГРУНТЫ

Название (марка) Вид хозяйства	Культура	Доза применения	Время, особенности применения
(ЛС), “Бегония” ЗАО МНПП “ФАРТ”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Биогумус “ в ассортименте	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

ЗАО МНПП “ФАРТ”			
(Л), Биопочва для азалий	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Биопочва для кактусов СПК “Чистые сады”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), “Герань” ЗАО МНПП “ФАРТ”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), “Гортензия красная” ЗАО МНПП “ФАРТ”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Почвенные грунты в ассортименте, производство ОАО «Буйский химический завод»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Грунт обогащенный в ассортименте ОАО “Торфопредприятие “Нестеровское”	Все культуры	Полностью готов к применению, используется без разбавления	Применяется в качестве почвенного субстрата
(Л), Грунт питательный в ассортименте ООО “Фаско+”	Все культуры	Полностью готов к применению, используется без разбавления	Применяется в качестве почвенного субстрата
(Л), Грунт питательный	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(С), Грунт “Рапсодия” ЗАО МНПП “ФАРТ”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), “НоктюРН” ЗАО МНПП “ФАРТ”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(ЛС), Питательный грунт	Все культуры	Полностью готов к применению, используется без разбавления	Применяется в качестве почвенного субстрата
(Л), Почвогрунт	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Почвогрунт Гумимакс Марка Гумимакс для пасленовых Марка Гумимакс для тыквенных Марка Гумимакс для пальм Марка Гумимакс для кактусов Марка Гумимакс для хвойных Марка Гумимакс для комнатных растений ЗАО “Уралэкоил”	Все культуры	Полностью готов к применению, используется без разбавления	Применяется в качестве почвенного субстрата
(Л), “Рапсодия” ЗАО МНПП “ФАРТ”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), “Садовая земля” ЗАО МНПП “ФАРТ”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), “Симфония” ЗАО МНПП “ФАРТ”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
	Марка “Садовая земля”		
(Л), “Соната” ЗАО МНПП “ФАРТ”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), Торфогрунт	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), “Традесканция” ЗАО МНПП “ФАРТ”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

(Л), “Увертюра” ЗАО МНПП “ФАРТ”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
(Л), “Фикус” ЗАО МНПП “ФАРТ”	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Грунт питательный «Цветочный Рай» в ассортименте ОАО «Буйский химический завод» N 75 мг/л P2O5 75 мг/л K2O 125 мг/л MgO 70 мг/л	Цветочно-декоративные комнатные и садовые растения, овощные, зеленые культуры.	Полностью готов к применению, используется без разбавления.	применяется в качестве почвенного субстрата.
«Обогащенный грунт» в ассортименте ТМС 1-12 ОАО «Торфопредприятие Нестеровское», Российская Федерация	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
«Естественный активатор почвы».	Полностью готов к применению, используется без разбавления.		
Грунт питательный «Волшебная грядка » в ассортименте ОАО «Буйский химический завод» N 75 мг/л P2O5 75 мг/л K2O 125 мг/л MgO 70 мг/л	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		
Питательный торфогрунт «Микропарник» ОАО «Буйский химический завод»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению		

МЕЛИОРАНТЫ ПОЧВЫ ИЗВЕСТКОВЫЕ

Название (марка), вид хозяйства	Культура	Доза применения	Время, особенности применения
1	2	3	4
(С), Мел рыхлый	Все культуры	Согласно показателям кислотности почвы с учетом требований культуры	-
(ЛС), Мука известняковая (доломитовая)	Все культуры	Согласно показателям кислотности почвы с учетом требований культуры (С)	-
	-	Кислые почвы с рН менее 4,5 - 500- 600 г/м ² (Л)	Внесение осенью или весной под перекопку почвы
	-	Среднекислые почвы с рН 4,5-5,2 - 450-500 г/м ² (Л)	
-	-	Слабокислые почвы с рН 5,2-5,6 - 350-450 г/м ² (Л)	

(ЛС), Удобрения известковые местные	Все культуры	Согласно показателям кислотности почвы с учетом требований культуры (С)	-
	-	Кислые почвы (рН менее 4,5), слабокислые почвы (рН 5,2-5,6) - 300- 500 г/м ² (Л)	Внесение осенью или весной под перекопку почвы
(С), Фосфогипс для сельского хозяйства	Все культуры	Согласно агрохимическим показателям почвы с учетом требований культуры	Используется в качестве химического мелиоранта слабосолонцеватых и солончаковых почв, солонцов
Вермикулит «Цветочное счастье» ООО «Фаско +»	В соответствии с утвержденными рекомендациями по применению.		

Приложение 1. Гигиенические нормативы

В графе 2 указаны только те вещества, по которым осуществляется контроль. Если вещество (в графе 2) является одним из компонентов совместного препарата, то после его торгового названия (в графе 9) в скобках указывается порядковый номер другого компонента (в случае контроля по обоим компонентам). До косой черты указаны ПДК, после черты - ОДК (для почвы), ОДУ (для воды) или ОБУВ (для воздуха). ВДСД и ВМДУ помечены звездочкой (*).

Условные обозначения:

(+) - препарат опасен при попадании на кожу;
А - препарат обладает аллергенным действием;
ВДСД - временно-допустимая суточная доза;
ВМДУ - временный максимально допустимый уровень;
ДСД - допустимая суточная доза;
кл - клеток;
м.-в. - миграционно-водный лимитирующий показатель;
м.-вз. - миграционно-воздушный лимитирующий показатель;
м.р. - максимально разовая концентрация;
МДУ - максимально допустимый уровень;
нд - не допускается в пределах чувствительности метода контроля;
нн - не нормирован в данной среде;
нт - нормирование не требуется в данной среде;
ОБУВ - ориентировочно безопасный уровень воздействия;
общ. - общесанитарный лимитирующий показатель;
ОДК - ориентировочно допустимая концентрация;
ОДУ - ориентировочно допустимый уровень;
орг. - органолептический лимитирующий показатель;
ПДК - предельно допустимая концентрация;
с.с. - средне-суточная концентрация;
с.-т. - санитарно-токсикологический лимитирующий показатель;
тр. - транслокационный лимитирующий показатель;
фит. - фитосанитарный лимитирующий показатель;

№	Наименование действующего вещества	ДСД (мг/кг массы тела человека)	ПДК/ОДК в почве (мг/кг)	ПДК/ОДУ в воде водоемов (мг/дм ³)	ПДК/ ОБУВ в воздухе рабочей зоны при применении (мг/м ³)	ПДК/ОБУВ в воздухе атмосферы при применении (мг/м ³)	МДУ в продукции (мг/кг)	
---	--	---	-------------------------------	--	---	---	-------------------------------	--

1.	2,4-Д кислота (диметиламинная соль)	0,0001	0,1/(тр.)	0,0002/(с.-т.)	1,0/	/0,0002	Все пищевые продукты - нд	2,4-Д Ди Лу Дез Дез Гра Ме 2,4
2.	2,4-Д (малолетучие эфиры)	0,0001	0,15/(тр.)	0,002/(орг.)	0,5/	нн	Все пищевые продукты - нд	Ок экс
3.	2,4-Д (этилгексильные эфиры)	0,0001	0,15/(тр.)	0,002/(орг.)	0,5/	нн	Все пищевые продукты - нд	Ок Эст
4.	Абамектин	0,0001	нт	0,001	0,05/	0,0001/	нт	Ал Аб До Вер Кр
5.	Альфа- циперметрин	0,02	/0,02	0,002/(общ)	/0,1	/0,002	Зерно хранящихся запасов к моменту реализации - 0,01*; кукуруза, картофель, зерно хлебных злаков, яблоки, виноград, черешня, свекла, рапс, горчица, томаты, дикорастущие грибы и ягоды - нд	Ал Цу Ки Пи Фа Фа Бес Ал Фа
8.	Ацетамиприд	0,06	/0,06	0,02/	/0,2	/0,004	Огурцы, томаты - 0,03; картофель, пшеница - 0,5	Пи Яс Мо Та Сп Мо Ви Тра
10.	Беномил	0,02	/0,1	0,5/(орг.)	0,1	0,01	Зерно хлебных злаков, рис - 0,5; свекла сахарная - 0,1; виноград, плодовые, ягодные, соя (семена и масло) - нд	Ар Ви
11.	Бромоксинил	0,001	/0,1	0,001/(общ.)	/0,3	/0,001	Зерно хлебных злаков, просо, кукуруза - 0,05	Бр Эм
12.	Бромуконазол	0,01	/0,1	0,002/(общ)	/0,1	/0,005	Зерно хлебных	Вер

							злаков, яблоки, груши, виноград - 0,04; смородина - 0,08*	
13.	Бромпропилат	0,008	/0,05	0,05/(общ.)	0,1	/0,001	Яблоки, шрот, мед - 0,02; виноград - 0,01; цитрусовые (мякоть) - 0,03; ягодные культуры - 0,05	Нео
14.	Бифентрин	0,005	/0,1	0,005/(общ)	/0,015	/0,0015	Яблоки - 0,04; зерно (хранящиеся запасы, виноград - 0,2; томаты - 0,4; огурцы - 0,4; кукуруза (зерно) - нд; подсолнечник (семена) - нд	ТЕ Тал Гол Пи Ки Пи Три
15.	Бентазон	0,1	/0,15	0,01/(с.-т.)	5,0/(+)	/0,01	Зерно хлебных злаков, рис - 0,1; горох (овощной и на зерно) - 0,1; соя (семена и масло), кукуруза - 0,1*;	Баз
17.	Бета-цифлутрин	0,01	/0,2	0,001/(общ.)	/0,1	/0,001	Яблоки, картофель - 0,2; зерно хлебных злаков, рапс (семена, масло) - 0,1; горох, капуста - 0,1*	Бул
	Галаксифоп-Р-метил	0,0002	/0,15	0,001/ (общ.)	1,0/	/0,0001	Свекла сахарная, подсолнечник и соя (семена) масло растительное, свекла кормовая - 0,05; рапс (семена) - 0,2; картофель - 0,01*	Гал Ме Зел Зел Сул Зел Зел Дел
18.	Гекситиазокс	0,04	/0,1	0,0005/(общ.)	/1,0	/0,05	Цитрусовые (мякоть) - 0,02*; яблоки, виноград - 0,1	Хар Гек Ни
19.	Глифосат	0,01	0,5/(тр.)	0,02/(с.-т.)	1,0/	/0,001	Плодовые, цитрусовые, подсолнечник (семена), зерно хлебных злаков, овощи, картофель, кукуруза, грибы - 0,3; арбузы - 0,3*; виноград,	Дол Ви Эри Гер Гли Гли Фар Кли

							подсолнечник, (масло) - 0,1; ягоды (все) - нд	Гли Гли Сви Ви. Гли Ко Фа
20.	Глифосат тримезиум	0,1	/0,8	0,004/(общ.)	/0,5	/0,02	Зерно ячменя, яблоки - 0,3	Ур Гли Гли Гра Гри
21.	Гимексазол	0,01	нн	0,002/(с.-т.)	/1,0	нт	Свекла сахарная, столовая, горох, рис - нд	Та
22.	Гуминовых кислот натриевые соли	Нт	Нт	Нт	нт	/0,05	Нт	Гум нат
23.	Диметенамид	0,02	/0,1	0,1/(орг.)	/0,7	/0,006	Кукуруза, соя (семена, масло) - 0,02; свекла сахарная и кормовая, подсолнечник (семена и масло) - 0,02	Фро
24.	Диазинон	0,002	0,1/(тр.)	0,004/(с.-т.)	0,2/(+)	0,0001/(с.-с.)	Зерно хлебных злаков, капуста, лук, картофель, хлопчатник (семена и масло), кукуруза, брюква, турнепс, свекла сахарная, столовая - 0,1; табак, томаты, огурцы, мак масличный - 0,5; хмель - 1,0; мясо (в пересчете на жир) - 0,01; морковь, молочные продукты, мясо птицы, яйца - нд	Диа Диа Так
25.	Дифлубензурон	0,02	/0,2	0,01/	3,0/	/0,006	Яблоки - 0,1, капуста - 0,05*, шампиньоны - 0,1	Дим Дим 6 м.
26.	Дельтаметрин	0,003	0,01/(тр.)	0,006/(с.-т.)	/0,1(+)	/0,03	Подсолнечник (семена), дыня, табак - 0,1*; подсолнечник (масло), персик, бананы - 0,05*;	Дел Дел Экс

							зерно хлебных злаков, зернобобовые, яблоки, груша, капуста, кукуруза, огурцы, салат, рис, цитрусовые (мякоть) - 0,01; виноград, картофель, свекла сахарная, томаты, арбуз, соя (масло), перец, какао бобы - 0,01*; хмель сухой - 5,0*; морковь - нд	
27.	Дитианон	0,002	/0,02	0,007/(общ)	/0,5	Нн	Яблоки, персики - нд	Дал
29.	Диметоат	0,001	/0,1	0,003/(с.-т.)	0,5/(+)	0,0003/(с.-с.)	Груши, слива, маслины, грибы, рис, бахчевые, огурцы, томаты, табак, махорка - нд; свекла стол. - нд; шелковица, ягоды (все), капуста - нд; зерно хлебных злаков, зернобобовые, просо, яблоки, виноград, цитрусовые (мякоть), свекла сахарная, картофель подсолнечник (семена и масло) - нд	Би- Дим Тай Бел Дим Таг
30.	Диниконазол-М	0,003	нн	0,004/(с.-т.)	/0,01	0,005/	Зерно хлебных злаков - 0,05	Сум
31.	Дифеноконазол	0,01	/0,01	0,001/(с.-т.)	/0,1	/0,01	Плодовые (семечковые), свекла сахарная - 0,1, зерно хлебных злаков - нд	Див Диф Ско
32.	Дикамба к-ы	0,06	0,25/(тр.)	0,02/(с.т.)	1,0/	0,01/	Зерно хлебных злаков, кукуруза, просо - нд	Дик
37.	Иоксинил	0,001	/0,2	0,01/(с.-т.)	/0,1	/0,001	Чеснок, лук - 0,1	Иог
38.	Йодосульфурон метил	0,03						Сек
40.	Имазапир	1,0	/0,5	0,1/	/0,1	/0,05	Ягоды	Арс

							дикорастущие - 0,2; грибы дикорастущие - 4,0	
41.	Имазетапир	1,0	/0,1	/0,7 (общ.)	/2,0	/0,04	Соя (семена и масло) - 0,5	Пив Пим Пив Фак Пре Оре
42.	Имидоклоприд	0,06	0,04	0,03	/0,2	/0,2	Огурцы, томаты - 0,1; картофель -0,05	Кон Сто Мид Им Бат Суп вак Пил Кол Им Тан
44.	Карбоксин	0,01	/0,05	0,02/(с.-т.)	1,0/	/0,015	Зерно хлебных злаков, просо, кукуруза - нд	Вит Вит Вит
45.	Клетодим	0,01	/0,1	0,002/(общ.)	/0,7	/0,005	Лук, морковь, соя (семена, масло), свекла сахарная, кормовая, столовая, лен-долгунец (семена) - 0,1; картофель, подсолнечник - 0,2	Сел Цен Зла Син
46.	Клодинафоп-пропаргил	0,002					Зерно хлебных злаков - 0,05	Тул Топ
47.	Карбендазим	0,01	/0,1	0,1/	0,1/	/0,01	Свекла сахарная - 0,1*; зерно хлебных злаков - 0,2; земляника, смородина, яблоки, виноград, огурцы - нд	Кол Кер суп
48.	Карбофуран	0,002	0,01/(м.-в.)	0,02/(с.-т.)	0,05/	/0,001	Свекла сахарная, виноград - нд; хмель сухой - 5,0*	Фур
49.	Клопиралид	0,15	/0,1	0,04/	2,0/	/0,01	Зерно хлебных злаков - 0,2; кукуруза, свекла сахарная - 0,1*; капуста - 0,05*; мясо и мясопродукты - 0,3; молочные продукты, дикорастущие грибы и ягоды - нд	Лон Кин Лор

43.	Лямбда-цигалотрин	0,002	/0,05	0,001/(с-т)	/0,1(+)	/0,003	Яблоня, вишня - 0,03*; картофель, кукуруза - 0,01, хмель сухой - 1,0*; рапс - 0,1*; персик - 0,2*, капуста, томаты, горох, пшеница (зерно хранящихся запасов) - 0,01*	Кар Кар Кин Сум Дос Гар Дал Кар Сам Лям
50.	Манкоцеб	0,005	/0,1	/0,015 (орг.)	0,5/	/0,001	Картофель, лук, томаты, виноград, огурцы - 0,1	Дит Кле Маг Аск
51.	Малатион	0,02	2,0/(тр.)	0,05/(орг.)	0,05/(+)	0,015/(м.р.)	Зерно хлебных злаков - 3; крупа (кроме манной) - 1; мука - 2; кукуруза, горох, соя (зерно), хлеб - 0,3* Свекла сахарная и столовая, яблоня, груша, айва, вишня, черешня, слива, виноград, арбуз, капуста, огурцы, томаты, дыня, чай - 0,5; табак, махорка, хмель сухой, грибы, крупа (кроме манной) - 1,0 подсолнечника (масло), соя (масло) - 0,1 арахис - 1,0* цитрусовые (мякоть) - 0,2*; горошек зеленый, подсолнечник (семена) - 0,5* горчица, масличный - 0,1* ягоды (все), манная крупа, продукты животноводства - нд	Бар Фуф
53.	Металаксил	0,03	0,05/(тр.)	0,1/(орг.)	0,5/	/0,02	Картофель, лук, свекла сахарная, столовая - 0,05; томаты - 0,5*;	Рид МЦ

							огурцы - 0,5; капуста - 0,01; хмель сухой - 5,0*; табак - 1,0*; виноград - 0,03*; подсолнечник (семена и масло) - 0,1, зерно кукурузы -	
54.	Метсульфурон - метил	0,003	/0,1	0,01/(общ.)	/1,0	/0,005	Зерно хлебных злаков - 0,05	Алм Гре Лаз Лам Мет
55.	Метрибузин	0,01	0,2/(м-вз.)	0,1/(общ.)	/1,0	/0,003	Томаты, картофель - 0,25, соя (семена) - 0,25*, соя масло - 0,1*	Зен Зен Пил Кар Три Рам Зон
56.	Мепикватхлорид			0,7-	0,6			Пик
57.	Метолахлор	0,002	/0,02	0,02/(с.-т.)	/1,0	/0,02	Кукуруза, свекла сахарная, соя (семена), бахчевые, огурцы - 0,05*; подсолнечник (семена) - 0,1*; свекла столовая, подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,02*; табак, хмель сухой - 1,0*; череда - ид	Дуа плюс
	МЦПА	0,002	/0,04	0,003/(орг.)	1,0/	/0,001	Зерно хлебных злаков, горох, лен-долгунец, просо, рис, картофель, подсолнечник - 0,05	2М-
59.	Оксифлуорфен	0,01	/0,2	/0,01 (с.-т.)	/1,0	/0,001	Все продукты питания и с/х сырье - 0,2	Гоа Кин Гал Фл Дос
60.	Пропиконазол	0,02	/0,2	0,15/(орг.)	0,5/	/0,01	Зерно хлебных злаков, свекла сахарная - 0,1	Бам Тил Ми Кре
61.	Прометрин	0,01	0,5/(тр.)	0,002/(с.-т.)	5,0/	/5,0	Подсолнечник (семена), тмин, кордиандр - 0,1*; подсолнечник (масло), кукуруза,	Гез Пр Ар Шер Вез Гез

							картофель, соя (семена и масло), горох, чеснок, фасоль, чечевица - 0,1; морковь, сельдерей, укроп, петрушка - нд	
62.	Пропаргит	0,02	/0,04	/0,002	/0,4 (+)	/0,02	Хлопчатник (семена, масло), соя (семена, масло) - 0,1*, яблоки, виноград, вишня - 0,5*; цитрусовые (мякоть) - 0,3*; огурцы - 0,2*; хмель сухой - 30,0	Ом Таг Энт
63.	Пенконазол	0,007	0,1/	0,003/ (общ.)	/0,8	/0,01	Огурцы, смородина, земляника, малина, арбуз - 0,1, томаты - 0,1*, яблоки, дыни - 0,2; виноград, персик, вишня - 0,3; зерно хлебных злаков - нд	Топ Топ
64.	Пендиметалин	0,008	/0,15	0,05/(орг.)	0,5/	нн	Соя (семена и масло), табак, чеснок, хмель сухой - 0,1*; томаты, морковь, капуста, огурец - 0,05*; петрушка - 0,05	Сто Пен Дос Тес Пан Тум Гла Щи Сто
66.	Пропизамид	0,3	/0,2	0,3/	/0,5	/0,003	Свекла сахарная - 0,1; цикорий салатный - 0,1*	Кер
67.	Сетоксидим	0,1	/0,2	0,04 (общ. орг)	/1,0	/0,08	Свекла сахарная, соя (семена и масло) - 0,1; цитрусовые - 0,02; морковь - 0,02*; капуста - 0,03*; плодовые, виноград - 0,05*	Наб
68.	Сульфат меди	0,17 (по меди)	/0,1	0,004/	0,3/	0,003/(м.р.) 0,001/(с.с.)	Картофель, хмель сухой - 10,0*; яйцо, мясо - 0,2; плодовые семечковые и	Куп

							косточковые, овощные, виноград, цитрусовые ягодные, бахчевые - 5,0	
70.	Тиофанат-метил	0,02	/0,4	0,05/(орг.)	0,1/	нн	Свекла сахарная, зерно хлебных злаков, персик - 1,0; хурма, фейхоа - 0,2*; огурцы, яблоки, груша, вишня, виноград - 0,5; смородина -нд	Топ
71.	Трибенурон-метил	0,01	нд	0,06/(общ.)	/1,0	/0,003	Зерно хлебных злаков - нд	Ист Мос Тер Гро Мен Гра
72.	Трифлуралин	0,01*	/0,1	0,02/(с.-т.)	3,0/	/0,01	Морковь пучковой зрелости, арбуз - 0,25*; подсолнечник (семена), соя (семена), капуста, томаты, огурцы, табак, чеснок, баклажаны, перец, лук - 0,5; подсолнечник (масло), соя (масло) - 0,1*; морковь товарной зрелости - 0,01*; петрушка пучковая зрелая - 0,01, табак - 0,5	Три
73.	Тритиконазол	0,005	/0,1	0,001	/1,0	нн	Зерно хлебных злаков - 0,04; кукуруза, просо - 0,1	Пре
74.	Тефлубензурон	0,002	/0,2	0,01/	/0,2	/0,001	Яблоки - 0,96, картофель, капуста, виноград - 0,1	Ном
76.	Тритерпеновые кислоты	Нн нт	Нт нт	Нт нт	/5,0 /5,0	Нт /0,05	Нт нт	Нво
77.	Тебуконазол	0,01	/0,4	0,025/(общ.)	/0,4	0,01	Зерно хлебных злаков - 0,2, просо - 0,2, виноград - 0,1	Бун Рак Алт Тер Фол Рас Вин Тен

								Рок Агр Рам Пил Тен Пак
78.	Тепралоксидим	0,05	/0,2	0.002/ (общ.+орг.)	/1,0	/0,01	Свекла сахарная - 0,1*; соя (масло) - 0,2*; соя (зерно) - 0,5*	Ара
79.	Феноксапроп-П- Этил	0,01	/0,04	0,0003/ (общ.)	/0,06	/0,002	Зерно хлебных злаков, морковь, свекла столовая, подсолнечник (масло), лук - 0,01; свекла сахарная - 0,05*, соя (семена и масло) - 0,05; капуста - 0,02; рапс (семена и масло), горох - 0,2	Пум Овс Экс Фен Тра Дан
81.	Флоуметурон			0,01/0,03	5,0/	0,05	Хлопчатник (зерно, масло) - 0,1, херно ячменя - 0,5	Кот
82.	Фенбутатион	0,03		0,005	/1,5		Яблоки - 0,1	Тор
84.	Фенмедифам	0,03	0,25/(тр.)	0,05/(общ.)	0,5/	/0,001	Свекла сахарная, столовая, кормовая - 0,2	Бет ОФ Гар Три Бет
85.	Флуазифоп-П- бутил	0,005	/0,3	0,001/ (общ.)	/ 0,5	/ 0,08	Свекла столовая - 0,1*; свекла сахарная, лук - 0,02; морковь - 0,03*; плодовые, виноград - 0,02*. Капуста, рапс (семена, масло) - 0,04; горох (зерно) - 0,03* подсолнечник (масло, семена) -0,04*; картофель - 0,02	Фю Флу
86.	Флутриафол	0,004	0,1/	0,006/ (общ.)	/0,5	/0,005	Зерно хлебных злаков, свекла сахарная - 0,1; виноград - нд; яблоки - 0,1*	Вин
87.	Флокумафен							Шт
88.	Фенпропатрин	0,01	/0,05	0,06/(с.-т.)	/0,1 (+)	/0,002	Яблоки, виноград - 0,02	Дан
89.	Фенитротион	0,005	1,0/(тр.)	0,006/(с.-т.)	0,1/(А)	/0,005	Зерно хлебных	Сум

							злаков, рис - 0,3; мука - 0,3; хлеб, подсолнечник (семена и масло), груши, вишня, слива, яблоки, цитрусовые (мякоть), табак, свекла сахарная и столовая - 0,1; чай - 0,5*; ягоды и грибы дикорастущие - нд	
90.	Фуратиокарб	0,0001	/0,01	0,0006/ (с.-т.)	/0,05	/0,0001	Пшеница, подсолнечник (семена и масло), рапс, кукуруза, свекла сахарная - нд	Прм
91	Фипронил	0,00025	0,05/(м.-в.)	0,001/ (с.-т.)	/0,1	/0,0001	Картофель - 0,005*; зерно хлебных злаков - 0,005; сахарная свекла - 0,005	Рег Тип
92.	Хлорпирифос	0,0003	0,2/(тр.)	0,002/(с.-т.)	/0,3	0,0002/	Свекла сахарная - 0,01, кукуруза - 0,0006*; картофель - 0,005*; яблоки - 0,01	Дур УМ
93.	Хлоридазон	0,002	/0,7	0,01/ (с.-т.)	0,5/	0,5/ (м.р.) 0,001/ (с.-с)	Свекла сахарная, столовая, кормовая - 0,1	Пир
94.	Хизалофоп-П-тефурил	0,005	/0,4	0,001	/0,2	/0,001	Корнеплоды сахарной свеклы - 0,1, картофеля - 0,1, лен (семена) - 0,1, лен (масло) - 1,0, горох (зерно) - 0,1, зеленый горох - 0,5	Пан Кин Энт
95.	Хизалофоп-П-этил	0,01	/0,8	0,0001/ (общ.)	/0,2	/0,01	Свекла столовая - 0,01; свекла сахарная, морковь, арбуз, лук, капуста, картофель, томаты - 0,05;	Тар Суп
96	Циперметрин	0,01	0,02/(тр.)	0,006/ (с.-т.)	0,5/	0,04/(м.р.) 0,01/ (с.-с.)	Виноград, соя (семена), морковь - 0,01*; капуста, цитрусовые	Арр Шер Цип Цип Цет

							(мякоть) - 0,01; огурцы, томаты, перцы - 0,2*; кукуруза - 0,05*; 4 соя (масло) - 0,1*; арбуз, дыня - 0,2; ягоды (все) - нд; рыба - 0,0015; горошек (овощной), люцерна, рапс - 0,1; свекла сахарная, яблоки, картофель, пшеница - 0,05	
97.	Ципроконазол	0,005	/0,2	0,001/ (с.-т.)	/0,7	/0,001	Зерно хлебных злаков - 0,05; свекла сахарная, горох, груши, виноград, яблоки - 0,1	Аль
98.	Этефон	0,006	/0,5	/0,04	/1,0	/0,008	Зерно хлебных злаков, цитрусовые, свекла сахарная, горох, томаты, капуста, огурцы - 0,5*; картофель - 0,15	Фин
99.	Эсфенвалерат	0,0034	/0,1	0,003/ (орг.)	/0,05 (+)	/0,0004	Горох - 0,1*; рапс - 0,1; ячмень - 0,02*; картофель, пшеница - нд, капуста - 0,01	Сум Суп
100.	Эпибрасиналид	Нн	/0,5	/0,04	/0,1	Нн	Нн	Эпи
101.	Эпиксиконазол	0,002	/0,2	0,004/	/0,05	/0,001	Зерно хлебных злаков - 0,1*	Рек

**Временные нормативы
предельно допустимых уровней содержания нитратов в картофеле, плодовоовощной и бахчевой
продукции на 2010-2019 гг.**

Наименование продукции	Допустимые уровни содержания нитратов, мг/кг		
	Открытый грунт		Защищенный грунт
	поздние	ранние	
Картофель	120	250	
Капуста белокочанная	250	700	
Морковь	200	300	
Томаты	60	80	300
Огурцы	150	300	400
Свекла столовая	1400	2000	
Лук репчатый	60	80	
Лук - пер.	300	400	
Зеленые культуры (салат, шпинат, щавель, сельдерей, петрушка, кинза, укроп, капуста, салатная)	1500	2000	

Дыня	60	60	
Арбузы	45	45	
Редис	1000	1200	
Редька	900	1200	
Баклажаны	150	250	
Тыква	120	120	
Перец сладкий	130	130	
Яблоки, груши	45	45	400
Клубника, малина	45	45	
Виноград, черешня	60	60	
Патиссоны	200	200	
Тархун	300	500	
Чеснок	120	120	
Щавель	110	120	
Капуста пекинская	300	450	450
Дыня сушеная	600	600	
Кукуруза	45	60	
Горох	45	60	
Кабачки	200	300	
Продукты детского питания (овощные консервы)	50	50	

Нормативы утверждены Распоряжением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 3 июля 1991 года № 174-р.

**Максимальные дозы азота и соответствующие им урожаи сельскохозяйственных культур,
обеспечивающие эколого-токсикологическую безопасность.
Регламенты по применению азотных удобрений под овощные культуры без внесения
органических удобрений по Кыргызской Республике**

Культура	Максимально допустимая годовая доза азота, кг/га дейст. вещества	Урожай, ц/га
Картофель	130	300
Помидоры	140	550
Огурцы	130	350
Морковь	120	250
Капуста	120	600
Лук	100	300
Свекла столовая	120	450
Кормовые корнеплоды	160	800
Кукуруза на силос	180	650
Бобовые травы	30-50	100
Озимая пшеница обрабатываемая	160	60
Озимая пшеница без орошения	150	30
Кукуруза на зерно	150	75
Свекла сахарная	160	650
Хлопчатник	250	40

Максимально рекомендуемые нормы азотных удобрений

Культура	Максимально допустимая годовая доза азота, кг/га дейст. вещества	Урожай, ц/га
Пшеница яровая (вторая культура после пара), (Казахстан, сухостойная зона)	50	20
Пшеница яровая (при орошении), (Узбекистан)	120	40
Ячмень яровой (Украина, лесостепь)	90	50
Овес (Украина, лесостепь)	100	50
Гречиха (Украина, лесостепь)	60	20
Просо (Казахстан)	40	25

Рис (Узбекистан)	170	70
Сахарная свекла (без орошения) (Украина, степь)	130	400
Картофель без орошения (Казахстан)	120	350
Подсолнечник (Украина, южный регион)	60	20
Подсолнечник (Казахстан)	70	20

Нормы утверждены Госагропромом СССР 09.09.1986 года.

Ограничения по применению пестицидов в коммунальном хозяйстве

В связи с ограниченной антропогенной нагрузкой в лесопарках, ботанических садах, на территориях санитарно-защитных зон промышленных предприятий, дорог автомобильного и железнодорожного транспорта разрешается за весь вегетационный период проводить одну обработку химическим и две обработки биологическими препаратами.

В городских парках, скверах, на бульварах, озелененных улицах и проспектах разрешается одна обработка химическим и две обработки микробиологическими препаратами в минимальной норме расхода пестицидов при условии наличия санитарно-защитной зоны до жилых домов не менее 50 м.

Во дворах и придомовых участках допускается только в случае угрозы массового размножения вредителей или болезней зеленых насаждений выборочная очаговая обработка их пестицидами с минимальной нормой расхода препарата.

Запрещается применение любых пестицидов на территории детских, спортивных, медицинских учреждений, школ, предприятий общественного питания и торговли пищевыми продуктами, водохранилищ, зон первого и второго поясов санитарной охраны источников водоснабжения, в непосредственной близости от жилых домов и воздухозаборных устройств.

Городские зеленые насаждения обрабатываются только при помощи наземной шланговой аппаратуры. Обработку насаждений пестицидами следует проводить в ранние утренние или вечерние часы, при наиболее низкой температуре воздуха, малой инсоляции и минимальных воздушных потоках. В виде исключения допускается их проведение в пасмурные и прохладные дни в дневные часы. Предпочтение следует отдавать очаговым обработкам растений. В один прием не рекомендуется обрабатывать участки площадью более 5 га.

При обработке пестицидами различных озеленительных объектов должны предусматриваться меры по охране открытых водоемов хозяйственно-бытового и рыбохозяйственного назначения. Обработки лесопарков, садов и парков допускаются только при возможности соблюдения санитарно-защитной зоны не менее 300 м между обрабатываемыми объектами и водоемами.

Перед проведением обработок зеленых насаждений городов и других населенных пунктов Департамент химизации и защиты растений обязан оповещать жителей о предстоящих обработках. На границах обработанного участка (у входа и выхода) устанавливаются единые предупредительные знаки безопасности, которые убирают только после окончания установленных сроков возобновления пользования зелеными насаждениями. В эти сроки запрещается пребывание людей и домашних животных на обработанных площадях.

При обработке пестицидами скверов и парков необходимо обеспечить защиту от загрязнения детских песочниц и пищевых продуктов (в торговых точках - киосках, павильонах, ресторанах) с последующей тщательной влажной уборкой. Завоз пищевых продуктов и работа объекта могут быть возобновлены после влажной уборки торговой точки и согласования с учреждениями Госсанэпиднадзора.

После применения пестицидов в парках и скверах необходимо обеспечить влажную обработку территории, паркового инвентаря и оборудования (скамейки, игровые сооружения детских и спортивных площадок, киоски, павильоны, рестораны), при необходимости - заменить песок в детских песочницах.

Классы опасности пестицидов для пчел и соответствующие экологические регламенты их применения

1 класс опасности - **ВЫСОКООПАСНЫЕ ДЛЯ ПЧЕЛ** пестициды: Необходимо соблюдение следующего экологического регламента:

- проводить обработку растений ранним утром или поздним вечером;
- при температурах воздуха - ниже 15°;
- при скорости ветра - до 1-2 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел - не менее 4-5 км;
- ограничение лета пчел - 96-120 часов.

2 класс опасности - **СРЕДНЕОПАСНЫЕ ДЛЯ ПЧЕЛ** пестициды: Необходимо соблюдение следующего экологического регламента:

- проводить обработку растений в утренние или вечерние часы;
- при температурах воздуха - ниже 15°;
- при скорости ветра - до 1-2 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел - не менее 3-4 км;
- ограничение лета пчел - 48-72 часа.

3 класс опасности - МАЛООПАСНЫЕ ДЛЯ ПЧЕЛ ПЕСТИЦИДЫ: Необходимо соблюдение следующего экологического регламента:

- проводить обработку растений в утренние или вечерние часы;
- при температурах воздуха - ниже 15°;
- при скорости ветра - до 4-5 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел - не менее 3-4 км;
- ограничение лета пчел - 24-48 часов.

4 класс опасности - ПРАКТИЧЕСКИ НЕОПАСНЫЕ ДЛЯ ПЧЕЛ пестициды: Необходимо соблюдение следующего экологического регламента:

- проводить обработку растений
- при ветренности - до 5-6 м/с;
- погранично-защитная зона для пчел - не менее 1-2 км;
- ограничение лета пчел - 6-12 часов

Во всех случаях применение пестицидов требует соблюдения основных положений «Инструкции по профилактике отравления пчел пестицидами» (Москва, Госагропром СССР 1989 г.); в частности - обязательно предварительное (4-5 сут.) оповещение местных общественных и индивидуальных пчеловодов (средствами печати, радио) о характере запланированного к использованию средства защиты растений, сроках и зонах его применения.

Сокращения и условные обозначения

Б - брикет
 ВГ - водорастворимые гранулы
 ВГР - водно-гликолевый раствор
 ВДГ - водно-диспергируемые гранулы
 ВК - водорастворимый концентрат
 ВКВ - водорастворимое кристаллическое вещество
 ВКР - водорастворимый концентрат
 ВКС - водный концентрат суспензии
 ВР - водный раствор
 ВРГ - водорастворимые гранулы
 ВРК - водорастворимый концентрат
 ВРП - водорастворимый порошок
 ВС - водная суспензия
 ВСК - водно-суспензионный концентрат
 ВПС - водная паста
 ВСХ - воздушно-сухая масса
 ВЭ - водная эмульсия
 Г - гранулы
 Д - дуст
 д.в. - действующее вещество
 Ж - жидкость
 К - карандаш
 ККР - концентрат коллоидного раствора
 КОЛ - коллоидный
 КРП - кристаллический порошок
 КС - концентрат суспензии
 КОЛР - коллоидного раствора
 КЭ - концентрат эмульсии
 МБ - мягкие брикеты
 МГ - микрогранулы
 МК - масляный концентрат
 МКС - микрокапсулированная суспензия
 МКЭ - масляный концентрат эмульсии
 ММС - минерально-масляная суспензия

ММЭ - минерально-масляная эмульсия
МС - масляная суспензия
МСК - масляно-суспензионный концентрат
МЭ - микроэмульсия
П - порошок
ПАВ - поверхностно-активное вещество
ПР - приманка
ПС - паста
ПТП - пленкообразующая текучая паста
Р - раствор
РП - растворимый порошок
СК - суспензионный концентрат
СК-М - суспензионно-масляный концентрат
СП - смачивающийся порошок
СТС - сухая текучая суспензия
СЭ - суспензионная эмульсия
СХП - сухой порошок
ТБ - твердые брикеты
ТАБ - таблетки
ТПС - текучая паста
УМО - ультрамалообъемное опрыскивание
ФЛО - суспензионный концентрат
ЭМВ - эмульсия масляно-водная